QH 45
B64o
V.9

Loc.
Cage

1781

WVU – Medical Center Library
Locked Cage QH 45 B64o c.1 v.9 WVMJ
Oeuvres d'histoire naturelle et de / Bonnet, Char
3 0802 000023930 0

RECEIVED
MAY 31 1955
WEST VIRGINIA UNIVERSITY
MEDICAL SCHOOL LIBRARY

OLD BOOKS
QH45
B64o
V.9
1781

DO NOT CIRCULATE

Digitized by the Internet Archive
in 2009 with funding from
Lyrasis Members and Sloan Foundation

http://www.archive.org/details/oeuvresdhistoire09bonn

COLLECTION

COMPLETE

DES ŒUVRES

DE CHARLES BONNET.

TOME IX.

ŒUVRES

D'HISTOIRE NATURELLE

ET DE

PHILOSOPHIE

DE CH. BONNET,

De l'Acad. Imp. Léopold. & de celle de St. Pétersb. des Acad. Roy. des Sci. de Londres, de Montpel. de Lyon, de Gottingue, de Stockolm, de Coppenhague; Honoraire de celle des Beaux-Arts de la même Ville; des Acad. de l'Institut de Bologne, de Harlem, de Munich, de Sienne, de Cassel; des Curieux de la Nature de Berlin; Correspondant de l'Acad. Roy. des Sci. de Paris.

TOME IX.

CONTEMPLATION DE LA NATURE.

A NEUCHATEL,

De l'Imprimerie de Samuel FAUCHE, Libraire du Roi

M. D. CC. LXXXI.

GN 45
B 64o
v. 9

CONTEMPLATION

DE LA

NATURE.

ONZIEME PARTIE.

DE L'INDUSTRIE DES ANIMAUX.

INTRODUCTION.

JUSQU'ICI nous n'avons guere enviſagé les Animaux que du côté de l'organiſation ; & de ſes réſultats les plus immédiats & les plus généraux. Contemplons maintenant leur induſtrie qui nous intéreſſe encore davantage. Nous ne

nous ſervirons pas des yeux du Naturaliſte ou de l'Obſervateur ; ils voyent trop de choſes & dans un trop grand détail : nous n'employerons que ceux du Contemplateur, qui ne ſaiſiſſent dans chaque genre, que les traits les plus frappans, qui les parcourent rapidement, & laiſſent ſans ceſſe échapper les détails.

CHAPITRE PREMIER.

Généralités ſur l'inſtinct des Animaux.

Il eſt des Animaux qui ſemblent réduits au toucher. D'autres ont tous nos ſens, & s'élevent preſque juſqu'à l'intelligence. Du Polype au Singe la diſtance paroît énorme.

L'IMAGINATION & la mémoire ſe font remarquer chez diverſes Eſpeces : l'imagination dans leurs rêves ; la mémoire dans le ſouvenir des choſes qui les ont affectées. Les lieux, les perſonnes, les objets animés & inanimés ſe retracent dans leur cerveau, & elles agiſſent relativement à ces repréſentations.

LE degré de connoiſſance de chaque Eſpece répond à la place qu'elle occupe dans le Plan

général. La ſphere de cette connoiſſance s'étend à tous les cas où l'Animal peut ſe rencontrer naturellement. Et ſi par le fait de l'Homme ou autrement, l'Animal vient à être tiré de ſon cercle naturel, & que néanmoins il n'en ſoit point dérouté, on pourra en conclure que cette nouvelle ſituation a du rapport avec quelqu'un des cas auxquels la ſphere de ſa connoiſſance s'étend. Le plus ou le moins de facilité qu'il montrera alors dans ſon jeu, indiquera ſi ce rapport eſt prochain ou éloigné, direct ou indirect.

La maniere dont les Animaux varient au beſoin leurs procédés, fournit un des plus forts argumens contre l'opinion qui les transforme en pures Machines. Le Philoſophe qui leur attribue une Ame, ſe fonde ſur l'analogie de leurs organes avec les nôtres, & de leurs actions avec pluſieurs des nôtres. Ceux qui font cette Ame matérielle, oublient que la ſimplicité du ſentiment eſt incompatible avec les propriétés de la matiere (1), & que la Foi eſt très-indépendante de nos ſyſtêmes ſur la nature de l'Ame.

(1) †† Quand nous avons à la fois pluſieurs perceptions diſtinctes, nous ne ſentons pas en nous autant de *Moi* que nous avons de perceptions. C'eſt toujours le même *Moi* qui voit, entende, goûte, flaire, touche, agit. Le ſentiment de ce Moi eſt toujours un, ſimple, indiviſible. Si ce Moi étoit matiere, il ſeroit étendu, & il y auroit autant de Moi qu'il y auroit

PLUS le nombre des cas auxquels la connoiſſance d'un Animal s'étend ou peut s'étendre, eſt grand, & plus cet Animal eſt élevé dans l'échelle.

LA conſervation de la vie, la propagation de l'Eſpece & le ſoin des Petits, ſont les trois principales branches du ſavoir des Animaux, mais tous ne ſe ſont pas également admirer à ces trois égards.

L'HUÎTRE, immobile ſur la vaſe, ne ſait qu'ouvrir & fermer ſon écaille.

L'ARAIGNÉE induſtrieuſe tend un filet à ſa proie. Elle attend en Chaſſeur patient, que quelqu'Inſecte vienne donner dans ce piege. A peine l'a-t-il touché, qu'elle s'élance ſur lui. Eſt-il armé ou trop vif? elle lui lie les membres avec une adreſſe merveilleuſe, & le réduit ainſi à ne pouvoir ni ſe défendre ni fuir.

DIVERSES Eſpeces d'Animaux vivent au jour le jour, ſans s'embarraſſer du lendemain.

D'AUTRES, qui ſemblent doués d'une ſorte

de points matériels affectés par les objets. Je ne fais qu'eſquiſſer cette preuve de l'immatérialité de l'Ame : je l'ai plus approfondie dans un autre Ecrit.

de prévoyance, conſtruiſent avec beaucoup d'art des magaſins qu'ils rempliſſent de différentes ſortes de proviſions; tels ſont l'Abeille & le Caſtor.

Parmi les Animaux qui vivent de proie, les uns, comme l'Aigle, le Lion, attaquent à force ouverte. Les autres, comme l'Epervier, le Renard, joignent la ruſe à la force. Les uns mettent leur vie en ſûreté par la fuite; d'autres en ſe cachant ſous terre ou ſous l'eau; d'autres recourent à diverſes ruſes qui aſſurent leur fuite & déroutent leur ennemi. Le Lievre fournit un exemple familier de ceux-ci. D'autres enfin oppoſent la force à la force.

Les Philoſophes qui ſe tourmentent à définir l'*inſtinct*, ne ſongent pas, que pour y parvenir, il faudroit paſſer quelque tems dans la tête d'un Animal ſans devenir Animal. Dire en général, que l'inſtinct eſt le réſultat de l'impreſſion de certains objets ſur la Machine, de la Machine ſur l'Ame, & de l'Ame ſur la Machine; c'eſt ſubſtituer des termes un peu moins obſcurs à un terme très-obſcur; mais l'idée ne ſort point des ténebres épaiſſes qui la couvrent. Nous ſavons bien ce que l'inſtinct n'eſt pas & point du tout ce qu'il eſt. Il n'eſt pas l'Intelligence, la Raiſon. La Brute n'a ni nos notions ni nos idées

moyennes ; c'eſt qu'elle n'a pas nos ſignes (2).

(2) †† Les *ſignes* dont je parlois ici, ſont les mots ou ces expreſſions articulées, qui conſtituent ce qu'on nomme le langage *artificiel* ou la *parole*. Nous impoſons des noms aux différens Êtres ; nous repréſentons par des mots leurs qualités, leurs accidens, leurs actions, & ces repréſentations qui ont reçu le nom de *ſymboliques*, ſont le fondement des notions que nous nous formons des différens Êtres. La ſimple perception ou la ſimple vue de ces Êtres n'eſt pas une notion ; elle n'eſt que le réſultat de l'impreſſion de l'objet ſur l'organe : mais quand nous exprimons par des mots ou par des ſignes d'inſtitution tout ce que cette impreſſion nous fait éprouver, & que nous déſignons ainſi les caracteres ſous leſquels l'objet s'offre à nos yeux, nous acquérons une *notion* de cet objet ; & cette notion, qui eſt l'ouvrage de notre entendement, eſt, comme l'on voit, bien différente de la ſimple perception. La Brute a, comme nous, des perceptions, puiſqu'elle a des ſens qui lui tranſmettent l'impreſſion des objets ; mais elle ne tranſforme pas ces impreſſions en notions, parce qu'elle n'a pas l'uſage de la parole. Elle ne raiſonne donc pas ; car le raiſonnement ſuppoſe des notions pour juger de leur rapport ou de leur oppoſition ; & ces notions dont il ſe ſert alors, ſont ce que les Logiciens nomment des *idées moyennes*. Nous reviendrons ailleurs à la prééminence que la parole donne à l'Homme ſur tous les Animaux.

CHAPITRE II.

Sageſſe dans la conſervation des Eſpeces.

En même tems que la NATURE a appris à divers Animaux la maniere d'attaquer & de pourſuivre leur proie, ELLE a appris à d'autres celle de ſe défendre ou d'échapper. Si nous avions communication des Livres de la Nature, nous y verrions ſans doute, que le profit balance conſtamment la perte. Un Régiſtre des naiſſances & des morts de quelques Eſpeces mettroit cette vérité en évidence (1).

(1) †† Un habile Homme (†), qui s'eſt beaucoup occupé de la population de notre Globe, obſerve que par une diſpenſation particuliere de la SAGESSE, le nombre des naiſſances ſurpaſſe dans l'Eſpece humaine celui des morts; enſorte que le nombre des Hommes va toujours en croiſſant; ce qui rend l'Eſpece ſupérieure aux accidens & aux révolutions qui tendroient à la détruire.

La multiplication exceſſive qu'on obſerve de tems en tems dans certaines Eſpeces & ſur-tout chez celles qui émigrent, a peut-être pour fin de rétablir la balance lorſqu'elle incline trop vers la deſtruction. S'il nous étoit permis de pénétrer ici juſques dans les plus grands détails, nous reconnoîtrions avec autant de ſurpriſe que d'admiration, que rien n'a été abandonné au haſard, & que tout a été calculé dans un rapport exact à la nature & au nombre des Eſpeces, aux accidens divers qui

(†) Mr. SUSSMILCH.

Les Eſpeces qui multiplient le plus ont le plus d'ennemis. Les Chenilles & les Pucerons ſont attaqués tant au-dedans qu'au-dehors par je ne ſais combien d'Inſectes toujours occupés à détruire les Individus, & qui ne parviennent point à détruire l'Eſpece (2).

Beaucoup d'Eſpeces cherchent leur vie ou leur retraite dans l'intérieur de la terre ou dans celui des Plantes & des Animaux.

D'autres ſe conſtruiſent avec un art merveilleux des nids ou des coques, où elles paſſent les tems d'inaction & de foibleſſe.

D'autres, plus habiles encore, ſavent, com-

les menaçoient, à leurs relations réciproques & à la conſtitution générale & particuliere du Globe. Ce ſeroit une ſorte de démonſtration de fait de l'exiſtence d'une Sageſſe Conservatrice : mais combien d'autres preuves n'avons-nous point de cette exiſtence dont l'idée eſt ſi chere au vrai Philoſophe !

(2) †† Je ne pouvois choiſir ici un exemple plus frappant que celui des Chenilles & des Pucerons. Il faut voir dans les beaux Mémoires de leur célebre Hiſtorien, l'hiſtoire intéreſſante de leurs nombreux ennemis. Mais les Chenilles ont d'autres ennemis plus redoutables encore : ce ſont les Oiſeaux. Le curieux Bradley, qui cultivoit avec ſuccès la Botanique, avoit calculé que deux Moineaux apportent par ſemaine à leurs Petits trois mille trois cent ſoixante Chenilles.

me nous, ſe faire des habits, & des matieres mêmes dont elles ſe nourriſſent. Elles dépouillent nos draps & nos fourrures de leurs poils, & en fabriquent avec de la ſoie une eſpece d'étoffe dont elles ſe vêtiſſent. La forme de leur habit eſt très-ſimple, mais très-commode. C'eſt une ſorte de manchon ou de fourreau, qu'elles entendent à alonger & à élargir au beſoin. Elles l'alongent en ajoutant à chaque bout de nouvelles couches de ſoie & de poils; elles l'élargiſſent comme nous élargiſſons une manche, en le fendant par le milieu ſuivant ſa longueur, & en y mettant une piece. Vous devinez que je parle des Teignes domeſtiques; les Teignes champêtres, qui ſe font des habits de feuilles, les ſurpaſſent encore en induſtrie. Nous jetterons ailleurs un coup-d'œil ſur leur travail.

Plusieurs Eſpeces de Poiſſons & d'Oiſeaux changent à tems marqué de demeures ou de climats. On connoît les nombreuſes caravanes des Harengs & des Morues, & les épaiſſes nuées d'Oies, de Cailles, de Corneilles, &c. qui quelquefois obſcurciſſent l'air. C'eſt par de telles émigrations périodiques que ces Eſpeces ſe conſervent, & dans leurs longs pélérinages la Nature eſt leur Pilote & leur Pourvoyeur.

CHAPITRE III.

La propagation de l'Eſpece.

Le Polype, privé de ſexe, ne connoît point les plaiſirs de l'amour. Le Papillon plus heureux, voltige autour de ſa Femelle, & ſollicite par ſes jeux des faveurs, qu'elle ne ſemble d'abord lui refuſer que pour mieux enflammer ſes deſirs. La Reine-abeille, placée au milieu d'un Serrail de Mâles, choiſit celui qui lui plaît le plus, & dompte par ſes agaceries ſa froideur & ſon indolence naturelle (1). Le Crapaud tient ſa Femelle embraſſée pendant quarante jours, & lui ſert d'Accoucheur lorſque le tems de ſa délivrance eſt venu. Le fier Taureau, dédaignant de folâtrer autour de la jeune Geniſſe, s'élance ſur elle avec impétuoſité. Le Pigeon, fidele à ſa Compagne, ne prodigue point à d'autres ſes careſſes. Le Coq, moins réſervé

(1) †† J'admettois ici comme vrai ce que Mr. de Reaumur a raconté ſi en détail des proſtitutions de la Reine-abeille. Il avoit été induit en erreur par des apparences très-propres à en impoſer. Des faits qu'il ne ſoupçonnoit point, paroiſſent prouver que cette prétendue Proſtituée vit, au contraire, dans un célibat perpétuel. (Conſultez la Note 5 du Chapitre VII de la Partie VIII.)

dans ſes amours, partage les ſiennes entre pluſieurs Poules.

Voyez encore les ſoins empreſſés que les Mâles de pluſieurs Eſpeces prennent de leurs Femelles, ſoit en leur faiſant part des nourritures qu'ils découvrent, ſoit en les ſoulageant dans leur travail; ſoit enfin en les défendant contre les inſultes de leurs ſemblables ou de leurs Ennemis (2).

(2) †† Cette petite Eſpece de Perroquet ou de Perruche, connue des Oiſeleurs ſous le nom de *Moineau de Guinée*, nous offre un exemple frappant de ces tendres ſoins que les Mâles prennent de leurs Femelles. Les jolies Perruches dont je veux parler ſont ſur-tout renommées pour leur tendreſſe conjugale; & j'avoue que, quoique je ſois fort éloigné de prêter aux Animaux nos affections morales, je n'ai rien vu qui s'en rapprochât plus que ce qui ſe paſſe dans la ſociété conjugale de nos petites Perruches de Guinée. J'en ai été témoin bien des fois & toujours avec le même intérêt. Il eſt vrai qu'il étoit encore accrû par celui qu'y prenoit une tendre & vertueuſe Épouſe qui ſe plait à contempler avec moi la Nature, & qui ſait charmer ainſi ſa ſolitude champêtre, & adoucir la douloureuſe épreuve à laquelle des maux habituels expoſent ſa patience depuis près de vingt-quatre ans. Parmi les Oiſeaux de différentes Eſpeces qu'elle avoit raſſemblés autour d'elle, étoit une paire de nos petites Perruches. Elle ne perdoit preſque pas de vue ce couple intéreſſant, & chaque jour il lui donnoit lieu de faire quelque nouvelle obſervation. Elle en a écrit elle-même l'hiſtoire, & ce que je vais en rapporter n'en ſera guere que l'extrait.

Les deux Oiſeaux avoient été logés dans une cage quarrée, appropriée à cette Eſpece de Perruche. L'auget qui renfermoit

la nourriture, étoit placé au bas de la cage. Le Mâle étoit presque toujours perché sur le même juchoir à côté de sa Femelle. Ils se tenoient collés & se regardoient fréquemment d'un air tendre. S'ils s'éloignoient l'un de l'autre, ce n'étoit que pour quelques instans, & on les voyoit bientôt se rejoindre & se serrer l'un contre l'autre. Ils alloient ensemble prendre leurs repas, & retournoient bien vîte se percher sur le juchoir le plus élevé de la cage. De tems en tems ils sembloient lier une sorte de conversation à voix basse & se répondre l'un à l'autre : ils faisoient entendre alors de petits sons assez variés, qui haussoient & baissoient alternativement : quelquefois même ils paroissoient se quereller ; mais ces petites querelles n'étoient que passageres & se terminoient toujours par de nouvelles tendresses qu'ils se prodiguoient mutuellement.

L'heureux couple passa ainsi quatre ans dans un Climat bien différent de celui où il étoit né : mais au bout de ce terme, qui étoit apparemment assez long pour cette Espece de Perruche, la Femelle tomba dans une sorte de langueur qui avoit tous les caracteres de la vieillesse : ses jambes enflerent & il y parut des nodosités comme si elles eussent été goutteuses. Il ne lui fut plus possible d'aller prendre sa nourriture comme auparavant : mais le Mâle, toujours officieux & toujours empressé, alloit la prendre pour elle & la lui dégorgeoit dans le bec. Il fut ainsi son vigilant pourvoyeur pendant quatre mois entiers. Les infirmités de sa chere Compagne accroissoient chaque jour & la réduisirent à ne pouvoir plus se percher. Elle se tenoit accroupie au bas de la cage, & faisoit de tems en tems d'inutiles tentatives pour gagner le premier juchoir. Le Mâle qui s'y tenoit perché tout près d'elle, secondoit de tout son pouvoir ses efforts impuissans. Tantôt il saisissoit avec son bec le haut de l'aîle de sa Femelle pour la tirer à lui ; tantôt il la prenoit par le bec & tâchoit de la soulever en réitérant ses efforts à plusieurs reprises. Ses mouvemens, ses gestes, sa contenance, sa sollicitude continuelle ; tout en un mot indiquoit dans l'intéressant Oiseau, le desir ardent d'aider à la foiblesse de sa Compagne & de soulager ses infirmités. Mais le spectacle devint

bien plus touchant encore quand la Femelle fut sur le point d'expirer : jamais on ne vit chez les Oiseaux de scene plus attendrissante : le Mâle infortuné tournoit sans cesse autour de sa Femelle expirante ; il redoubloit ses empressemens & ses tendres soins ; il essayoit de lui ouvrir le bec pour lui dégorger quelque nourriture ; son émotion accroissoit d'instant en instant ; il alloit & venoit de l'air le plus agité & le plus inquiet ; il poussoit par intervalles des cris plaintifs ; d'autrefois, les yeux collés sur la Femelle, il gardoit un morne silence : il étoit impossible de se méprendre sur les expressions de sa douleur ; je dirois presque de son désespoir ; & l'Ame la moins sensible en eût été émue. Sa fidele Compagne expira enfin, & lui-même ne fit plus que languir, & ne lui survécut que quelques mois.

Le Kamichi, grand Oiseau de l'Amérique, demi-aquatique, d'un genre fort singulier & très-réfractaire à la nomenclature, est bien plus remarquable encore par sa fidélité conjugale, que par la corne qu'il porte sur la tête, & par les éperons dont ses aîles sont armées. Le Mâle & la Femelle demeurent unis toute leur vie & ne se séparent presque jamais. Il semble même que la mort qui met fin à tout, ne puisse rompre les doux liens par lesquels l'amour avoit uni les deux sexes : on voit l'individu qui a le malheur de survivre à sa moitié, traîner une vie languissante, errer sans cesse en poussant des cris lugubres, & se consumer près des lieux où il a perdu l'objet de sa tendresse.

CHAPITRE IV.

Réflexions sur la multiplication par le concours des Sexes.

CE concours ne nous frappe point, parce qu'il eſt toujours ſous nos yeux ; mais lorſqu'on vient à l'examiner philoſophiquement, il ſurprend autant qu'il embarraſſe ; ſur-tout quand on ſonge à ce qui ſe paſſe chez les Pucerons (1) & chez les Polypes (2).

DE-LA naît une queſtion : quelle eſt la raiſon métaphyſique du concours des Sexes ? Cette raiſon, comme celle de tous les ſyſtêmes particuliers, eſt dans le ſyſtême général, dont notre foible vue ne peut ſaiſir que quelques portioncules. Bornons-nous donc ici à obſerver le fait & ſes conſéquences immédiates ou médiates.

ON voit d'abord que la diſtinction de Sexes donne lieu à une eſpece de ſociété entre le Mâle & la Femelle, d'où réſultent des avantages communs à l'un & à l'autre, & qui s'étendent

(1) Part. VIII, Chap. VIII.

(2) Ibid. Chap. XI, XII, XIII, XV.

encore aux Individus qui proviennent de leur union.

On obſerve que les Animaux féconds par eux-mêmes vivent ſans paroître former de véritables ſociétés, quoique raſſemblés en grand nombre dans le même lieu. On remarque encore qu'ils ne prennent aucun ſoin de leurs Petits. Il eſt vrai que ces derniers ont été mis en état de ſe paſſer de leur ſecours.

Autre remarque : les Animaux féconds par eux-mêmes multiplient prodigieuſement & avec une extrême facilité. La Terre n'auroit pas ſuffi à contenir & à entretenir les Eſpeces qui la peuplent, ſi toutes avoient été douées d'une pareille fécondité. La dépendance abſolue & mutuelle des deux Sexes rend la propagation moins ſûre, moins abondante, moins facile que chez de tels Androgynes. Ainſi les mêmes moyens qui operent la multiplication de la plupart des Animaux, lui ſervent en même tems de barriere ou de frein.

Enfin, la diſtinction de Sexes répand dans la Nature une agréable variété (3), & donne

(3) †† La diſtinction de Sexe chez les Plantes donne lieu à des variétés analogues, ſur-tout chez celles où les Sexes ſont ſéparés.

plus d'étendue aux divers ſervices que l'Homme tire des Animaux.

C'EST un grand argument en faveur des *fins*, que ce mouvement ſecret qui porte les deux Sexes à ſe chercher & à s'unir. Ce mobile, inhérent à la nature de l'Animal, ne dépend point de cauſes étrangeres. Il agit dans les Animaux élevés en ſolitude comme dans ceux qui vivent en ſociété. La température de l'air, les alimens, l'éducation & d'autres circonſtances peuvent bien modifier ſon jeu; mais non le détruire. Et encore, quelle foule de rapports très-compliqués entre les organes propres à chaque Sexe, & entre les organes correſpondans des deux Sexes? Combien de fins particulieres qui tendent toutes ici vers une fin générale! Que de liaiſons, que de convergence dans les moyens! Que d'utilités dans le but & de conſéquences de tout cela!

LE plus ſouvent il eſt dans les Femelles des tems marqués pour la génération: les Mâles les attaqueroient vainement en d'autres tems: elles les repouſſeroient ou ſe ſouſtrairoient à leurs recherches. La raiſon de cet ordre eſt ſenſible: la génération auroit été troublée ou interrompue

pue ſi les Femelles avoient reçu les Mâles en tout tems (4).

CHAPITRE V.

Le lieu & l'arrangement des œufs & le ſoin des Petits.

La Sauterelle, le Lézard, la Tortue, le Crocodile fourniſſent des exemples d'Animaux qui ne prennent preſque aucun ſoin de leurs œufs, & qui n'en prennent point du tout des Petits qui en écloſent. Ils pondent dans la terre ou dans le ſable, & laiſſent au Soleil le ſoin d'échauffer leurs œufs. Les Poiſſons à écailles en uſent de même: les uns frayent dans l'eau, les autres entre les cailloux ou dans le ſable (1).

(4) †† La plupart des Quadrupedes ont un tems marqué pour la copulation : les Loups & les Renards en Janvier ; les Chevaux, en Été ; les Cerfs, en Septembre & Octobre, les Chevres ſauvages, en Décembre ; les Chats, en Janvier, Mai & Septembre. Le Printems & l'Été ſont les ſaiſons des amours des Oiſeaux, des Poiſſons & des Inſectes.

(1) †† La Sauterelle pond en Automne, à l'aide d'une ſorte de plantoir dont ſon derriere eſt pourvu, & qui eſt formé de deux lames écailleuſes en maniere de petit ſabre : elle introduit ſes œufs dans la terre ; elle les y ſeme en quelque ſorte. Au ſortir du ventre, ils gliſſent entre les deux lames du plantoir

L'INSTINCT de différentes Eſpeces ſe borne à placer les leurs dans des endroits où les Petits

qui les place à une profondeur convenable. Les Petits en éclo-ſent au retour du Printems. C'eſt un petit Animal bien formidable que la Sauterelle : elle eſt un des grands fléaux qui déſolent de tems en tems les Campagnes. Les plus anciennes Hiſtoires ont conſacré ſes ravages. Elles nous peignent les armées innombrables de Sauterelles obſcurciſſant l'air par leurs épaiſſes phalanges, traverſant d'un vol rapide de grandes Contrées, s'abattant ſur les Prairies & les transformant en déſerts.

Le Lézard pond dans les vieilles maſures ou dans le ſable, & toujours dans des lieux où ſes œufs peuvent être échauffés par le Soleil. Leur enveloppe n'eſt que membraneuſe. J'en ai fait couver plus d'une fois dans une terre ſéche & très-pulvériſée, que j'expoſois au Soleil. Le Lézard eſt un petit Quadrupede très-joli, très-agile & qui a beaucoup de grace dans tous ſes mouvemens ; mais il eſt bien plus joli encore au ſortir de l'œuf : il eſt alors une vraie miniature dont on a peine à détacher ſes yeux. Le Lézard ſe rapproche aſſez par ſa forme de la Salamandre aquatique : il s'en rapproche encore par le privilege de reproduire ſa queue lorſqu'il l'a perdue : mais cette reproduction n'a pas été ſuivie avec autant de ſoin que celle de la Salamandre, & mériteroit bien un examen plus approfondi. Ce que divers Auteurs en rapportent eſt bien vague, & prouve trop qu'ils n'avoient pas obſervé cette reproduction avec toute l'attention qu'elle exige. Non-ſeulement il conviendroit de répéter les expériences ſur la reproduction de la queue ; mais il faudroit encore les étendre aux autres membres pour s'aſſurer ſi le Lézard, comme la Salamandre, peut refaire ſes mains, ſes pieds, ſes doigts, &c. Si elles ne réuſſiſſoient pas ſur des Lézards parvenus à leur parfait accroiſſement ou à-peu-près, elles réuſſiroient peut-être ſur les plus jeunes, dont les membres plus mols & plus ſouples ſe prêteroient davantage à l'opération, & en favoriſeroient le ſuccès.

Les Tortues de mer, celles d'eau douce & de terre pondent

trouveront à leur naiſſance des nourritures convenables. Les Meres ne ſe méprennent point également dans le ſable ou dans une terre légere. Lorſque les Tortues de mer ou d'eau douce ſont ſur le point de ſe décharger de leurs œufs, elles abandonnent l'eau, ſe rendent ſur terre, y pratiquent des foſſes dans leſquelles elles placent leurs œufs, & ne les recouvrent que légérement de ſable afin que le Soleil puiſſe mieux les échauffer. Elles creuſent ces foſſes avec leurs mains ou aîlerons, & à une petite diſtance de l'endroit où le flot va battre. Les œufs, qui ſont ſouvent au nombre de deux ou trois cents, de figure ronde & de la groſſeur d'une orange, ne ſont revêtus que d'une enveloppe membraneuſe, de la conſiſtance du parchemin. Les petites Tortues en écloſent au bout de trois ſemaines ou un mois, & inſtruites de bonne heure par la Nature, elles ne manquent point de gagner l'eau qui eſt leur vraie patrie.

Le Crocodile, ce terrible Amphibie, dont la voracité eſt extrême, qui hante les grands fleuves de l'Inde, de l'Afrique & de l'Amérique, & qui reſſemble tant par ſa forme au Lézard, eſt, comme lui, ovipare, & pond comme lui, dans le ſable. Ses œufs, de la groſſeur de ceux d'une d'Oie, & au nombre de cinquante ou ſoixante, multiplieroient trop la race redoutable de cet énorme Amphibie, ſi l'Ichneumon, qui eſt très-friand de ces œufs, n'en détruiſoit un grand nombre. C'eſt donc par ce petit Quadrupede que la ſage Nature prévient les ravages que cauſeroit la trop grande multiplication du Crocodile.

Nous venons de voir les Tortues aquatiques abandonner l'eau pour aller pondre ſur le bord de la mer ou des rivieres : quelques Amphibies, tels que les Crapauds terreſtres & la Grenouille des Arbres, abandonnent au contraire la terre, pour aller pondre dans les eaux. Ils ſemblent ſavoir que ce n'eſt que dans les eaux que leurs Petits peuvent éclorre, & trouver à leur naiſſance les nourritures qui leur conviennent. De petits Inſectes aquatiques ſont la pâture qui leur a été aſſignée ; mais cette pâture ne ſe trouve que dans les eaux croupiſſantes ; auſſi n'eſt-

là-deſſus. Le Papîllon de la Chenille du Chou ne va point pondre ſur la viande, ni la Mouche de la viande ſur le Chou.

Le Couſin (2) qui voltige dans l'air, a d'abord été habitant de l'eau. C'eſt auſſi ſur l'eau qu'il va dépoſer ſes œufs. L'amas qu'ils compoſent a de l'air d'une petite nacelle que l'Inſecte fait conſtruire & mettre à flot. Chaque œuf a la forme d'une quille. Toutes les quilles ſont verticales & adoſſées les unes aux autres. Le Couſin ne pond qu'un œuf à la fois. On ne devine pas comment il parvient à faire tenir ſur l'eau le premier œuf ou la premiere quille. Son procédé eſt pourtant très-ſimple, & n'en eſt que plus ingénieux. Il porte en arriere ſes plus longues jambes; il les croiſe, & c'eſt dans l'angle qu'elles forment alors, qu'il reçoit le premier œuf & qu'il le tient aſſujetti. Un ſecond œuf eſt bientôt dépoſé contre le premier, puis un troiſieme, un quatrieme, &c. La baſe de la pyramide s'élargit ainſi peu-à-peu, & elle ſe ſoutient enfin par elle-même.

ce que dans de ſemblables eaux que nos Amphibies ſe rendent au tems de la ponte: jamais on ne les voit pondre dans les eaux courantes.

(2) *Culex pipiens* Linn. ſyſt. nat. Voyez Reaumur, Inſ. Tome IV

QUELQUES Eſpeces collent leurs œufs avec beaucoup de ſymmétrie & de propreté autour des branches ou des menus jets des Arbres, en maniere de bagues ou d'anneaux. On diroit qu'une main adroite ait pris plaiſir à ajuſter à ces jets, des braſſelets de perles. Une Chenille, que la diſtribution de ſes couleurs a fait nommer *Livrée*, ſe transforme en un Papillon qui arrange ainſi ſes œufs, & qui en compoſe de ces jolis braſſelets.

D'AUTRES Papillons font plus encore; ils ſe dépouillent de leurs poils, & en conſtruiſent à leurs œufs une eſpece de nid où ils repoſent mollement & chaudement. Tel eſt en particulier le procédé induſtrieux du Papillon de la Chenille appellée *commune*, parce qu'elle eſt en effet la plus commune dans nos Contrées.

CERTAINES Eſpeces ſont ſi attachées à leurs œufs, qu'elles les portent par-tout avec elles. L'Araignée-loup renferme les ſiens dans une petite bourſe de ſoie, dont elle charge ſon derriere. Vient-elle à la perdre ou vient-on à la lui enlever? ſa vivacité & ſon agilité naturelles l'abandonnent: elle ſemble tomber dans une ſorte de langueur. Eſt-elle aſſez heureuſe pour recouvrer le précieux dépôt? elle s'en ſaiſit à

l'inſtant, l'emporte & fuit. Dès que les petites Araignées ſont écloſes, elles ſe raſſemblent & s'arrangent adroitement ſur le dos de leur Mere, qui continue encore quelque tems à leur donner ſes ſoins, & à les tranſporter par-tout avec elle.

UNE autre Araignée loge ſes œufs dans une petite poche de ſoie, qu'elle enveloppe d'une feuille. Elle ſe poſe ſur cette poche, & couve ſes œufs avec une aſſiduité merveilleuſe. Une autre enfin, renferme les ſiens dans deux ou trois petites boules de ſoie qu'elle ſuſpend à des fils, mais avec la précaution de ſuſpendre au-devant & à quelque diſtance un petit paquet de feuilles ſeches, qui les dérobe aux regards des Curieux.

DIVERSES Eſpeces de Mouches ſolitaires ne ſe font pas moins admirer par leur prévoyance à amaſſer des proviſions pour leurs Petits, que par l'art qui brille dans les nids qu'elles leur préparent. L'Abeille-maçonne, ainſi nommée parce qu'elle ſait comme nous, l'art de bâtir, exécute en maçonnerie des ouvrages qui ſembleroient devoir ſurpaſſer de beaucoup les forces d'une Mouche. Avec du ſable choiſi grain à grain, & lié avec une ſorte de ciment bien préférable au nôtre, elle conſtruit à ſa Famille

une Maiſon, à la vérité très-ſimple, mais également ſolide & commode. Elle eſt diviſée intérieurement en pluſieurs chambres ou logettes, adoſſées les unes aux autres, & qui ne doivent point communiquer enſemble. Une enveloppe générale qui eſt, pour ainſi dire, un mur de clôture, les renferme toutes & ne laiſſe au-dehors aucune ouverture. Il faut briſer ce mur pour voir les chambres, & on lui trouve la dureté de la pierre. Ces nids ſont très-communs ſur les faces des maiſons: ils y paroiſſent comme des monticules ovales, d'un gris différent de celui de la pierre. La Mouche, qui eſt l'Architecte de ces petits bâtimens, dépoſe dans chaque chambre un œuf, & y renferme en même tems une proviſion de cire ou de pâtée, qui eſt la nourriture appropriée à ſes Petits.

Une autre Mouche, qu'on pourroit appeller l'Abeille-*Charpentiere*, parce qu'elle travaille en bois, conſtruit auſſi des logemens à ſa Famille; mais dans un autre goût que la Maçonne. Tantôt elle diſtribue les chambres par étages, tantôt elle les diſpoſe en enfilade. Des planchers ou des cloiſons artiſtement façonnés, ſéparent tous les étages ou toutes les chambres, & dans tous eſt dépoſé un œuf avec la meſure de pâtée néceſſaire au Petit.

Ces divers ouvrages exigent en général moins d'adreſſe & de génie que de travail & de patience. Il y a bien autrement d'art & d'induſtrie dans le nid qu'une autre Mouche conſtruit avec de ſimples morceaux de feuilles. Ce nid eſt un vrai prodige. Quand on le décompoſe & qu'on en examine de près toutes les pieces, on ne ſauroit comprendre comment une Mouche a pu parvenir à les tailler, à les contourner & à les aſſembler avec tant de propreté & de préciſion. Vu par dehors, ce nid reſſemble très-bien à un étui de cure-dents. L'intérieur eſt diviſé en pluſieurs cellules qui ont la forme d'un dé à coudre, & qui ſont emboîtées les unes dans les autres, comme les dés le ſont chez le Marchand. Chaque dé eſt compoſé de pluſieurs pieces, qui ont été taillées ſéparément ſur une feuille, & dont la figure, les contours & les proportions répondent à la place que chacune doit occuper. Il en eſt de même des pieces qui forment l'étui ou l'enveloppe commune. En un mot, il regne dans ce petit chef-d'œuvre tant de juſteſſe, de ſymmétrie, de rapports & d'habileté, qu'on ne croiroit point qu'il fût l'ouvrage d'une Mouche, ſi l'on ne ſavoit à quelle école elle a appris à le conſtruire. On devine aſſez que chaque dé eſt le logement d'un Petit; mais ce qu'on n'imagine pas, c'eſt que la pâtée que ſa Mere approviſionne

pour lui eſt preſque liquide, & que la cellule, toute compoſée de petits morceaux de feuilles, eſt pourtant un vaſe ſi bien clos, que cette pâtée ne ſe répand point, lors même que le vaſe eſt incliné (3).

C'EST moins pour elles-mêmes que pour leurs Petits, que les Abeilles-*Républicaines* conſtruiſent

(3) †† Ici l'habile Traducteur Italien de l'Ouvrage que je commente, a placé une Note dont je donnerai le précis.

Un autre Inſecte ne montre guere moins d'induſtrie que la Mouche coupeuſe de feuilles. C'eſt dans une ſorte de cornet qu'il dépoſe ſes œufs, & ce cornet eſt fait de feuilles. Pour parvenir à le façonner il commence par courber la feuille, & pour que ſon reſſort ne dérange point la courbure qu'il veut lui donner, il en aſſujettit les bords au moyen de quelques fils de ſoie. Mais comme il eſt fort petit & aſſez foible, il ne parviendroit pas à courber à ſon gré la feuille & à vaincre ſon reſſort naturel, ſi la Nature ne lui avoit enſeigné un moyen auſſi ſimple qu'ingénieux d'en venir à bout. La feuille ne réſiſte que par ſa vigueur: l'Inſecte a donc été inſtruit à l'affoiblir ou à diminuer la quantité de nourriture qu'elle reçoit à chaqu'inſtant de la branche qui la porte. Pour cet effet, il en ronge un peu le pédicule, & intercepte ainſi une partie des ſucs nourriciers. Il en reſte aſſez pour l'entretien de la feuille, & point aſſez pour lui conſerver tout ſon reſſort. L'adroit Inſecte la manie enſuite comme il lui plait. Il la courbe de maniere que la ſurface inférieure eſt à l'intérieur du cornet, & c'eſt contre cette ſurface qu'il colle ſes œufs.

Ce joli Charanſon doré, eſpece de petit Scarabé, connu ſous le nom de *Bêche* ou *Liſette*, roule auſſi avec beaucoup d'art les feuilles de la Vigne, & dépoſe de même ſes œufs dans l'intérieur du rouleau.

ces Gâteaux dont l'ordonnance & les proportions ſont déterminées ſur les regles de la plus fine Géométrie. Une partie des cellules dont ils ſont compoſés ſert de berceaux aux Petits; & comme ceux-ci ſont de trois grandeurs, les Abeilles conſtruiſent auſſi de trois ordres de cellules. Chaque jour elles apportent à manger à leurs nourriſſons, & par une attention ſinguliere, elles proportionnent la nourriture à leur âge & à leurs forces. Elles ont encore ſoin d'entretenir autour d'eux une chaleur toujours à-peu-près égale, en ſe raſſemblant ſur leurs cellules dans les jours froids, & en s'en éloignant dans les jours chauds. Enfin, lorſque le tems eſt venu où les Petits n'ont plus beſoin de nourriture & où ils doivent ſe préparer à la métamorphoſe, elles ferment exactement leurs alvéoles avec un couvercle de cire. L'inſtinct de la Mere-abeille dans le choix des cellules pour y dépoſer ſes œufs eſt auſſi très-remarquable. On ne la voit point loger un œuf de Mâle dans une cellule d'Ouvriere, ni un œuf d'Ouvriere dans une cellule de Mâle (4).

(4) †† Je parlois ici d'après Mr. de REAUMUR; mais des Obſervateurs plus modernes refuſent un tel diſcernement à la Reine-abeille, & prétendent que ce ſont les Ouvrieres qui en ſont douées, & qui ont été chargées de diſtribuer les œufs dans les cellules appropriées aux Petits qui en doivent éclorre. Ils

Les Petits de différentes Eſpeces de Mouches ſont carnaciers, & ne ſe nourriſſent que d'Animaux vivans. Les Meres renferment donc dans leurs nids; les unes, de petites Araignées; les autres, de petites Mouches; d'autres, de petits Vers, qu'elles aſſujettiſſent contre les parois de la cellule, & qu'elles arrangent les uns ſur les autres en maniere de cerceaux. Le Petit dévore ſucceſſivement ces malheureuſes victimes condamnées à lui ſervir de pâture, & lorſqu'il a achevé de dévorer la derniere, le tems eſt arrivé où il n'a plus beſoin de manger & où il a pris ſon parfait accroiſſement.

D'autres Mouches ont été inſtruites à aller dépoſer leurs œufs dans le Corps des Inſectes vivans ou dans leurs nids. Ni l'agilité de ces Inſectes, ni les armes offenſives & défenſives dont ils ſont pourvus, ni la ſolidité ou l'épaiſ-

aſſurent que la Reine pond ſouvent & en grand nombre les trois ſortes d'œufs dans des cellules communes, & que bientôt ces œufs ſont diſtribués dans les alvéoles qui leur conviennent. Ce fait demanderoit à être mieux conſtaté : car les meilleurs Hiſtoriens des Abeilles n'ont rien raconté de ſemblable; ils ont bien remarqué à la vérité, que la Reine pond quelquefois pluſieurs œufs dans la même cellule, & que les Ouvrieres ont toujours ſoin d'enlever les ſurnuméraires; mais ils ne les ont point obſervé replacer ces œufs un à un dans les cellules appropriées.

ſeur des parois de leurs logemens ne ſauroient triompher de l'adreſſe, du courage & de la vigilance des Ichneumons (5).

Les procédés analogues de quelques autres Mouches ſont encore plus frappans. L'une ſe tient à l'entrée de l'anus des Chevaux, & attend le moment où il doit s'ouvrir, pour ſe gliſſer dans les inteſtins & y dépoſer ſes œufs. Une autre entre dans le nez des Moutons, & va pondre dans les ſinus frontaux. Une autre, plus hardie encore, enfile les conduits naſeaux du Cerf, deſcend dans ſon palais, & dépoſe ſes œufs dans deux bourſes charnues placées à la racine de la langue (6).

(5) C'eſt le nom que les Naturaliſtes ont donné aux Mouches qui vont dépoſer leurs œufs dans le corps des Inſectes vivans. Ce nom eſt pris de l'*Ichneumon*, eſpece de Chat d'Egypte, qui détruit les œufs du Crocodile.

(6) †† Ces Mouches courageuſes en rappellent une autre qui donne auſſi ſes œufs à couver & ſes Petits à élever à de grands Animaux vivans. C'eſt ſous le cuir épais des Bêtes à cornes, & juſques dans leur chair, que cette Mouche va dépoſer ſes œufs au moyen d'une tariere bien emmanchée, qu'elle entend à merveille à faire jouer. Dans chaque plaie qu'elle fait au dos d'un Bœuf ou d'une Vache, elle place un œuf. Le Ver qui en éclôt ſe trouve environné à ſa naiſſance, d'une nourriture très-abondante & très-appropriée. Il croît beaucoup, & à meſure qu'il croît, il fait croître la tumeur où il eſt logé. Elle devient une eſpece de galle animale qu'on voit s'élever

Comme il eſt des Eſpeces qui dépoſent leurs œufs dans l'intérieur des Animaux vivans, il en eſt un bien plus grand nombre qui dépoſent les leurs dans l'intérieur des Végétaux. Il n'eſt aucune de leurs parties, qui ne ſerve de retraite & de pâture à un ou pluſieurs Inſectes. Une Mouche pique la feuille d'un Arbre, elle y fait naître une galle au centre de laquelle un œuf eſt logé. Nous avons vu (7) que cet œuf ſingulier croît comme un Animal. En croiſſant, il fait croître la galle; le Petit qui en éclot, trouve ainſi en naiſſant le logement & la nourriture (8).

comme une boſſe ſur le dos de la Bête à cornes, & qui eſt analogue aux galles végétales que d'autres Mouches font naître ſur les Plantes. Mais le Ver renfermé dans la galle animale ne ſauroit ſe paſſer d'une communication libre avec l'air extérieur; il a beſoin de l'inſpirer : la petite ouverture que l'inſtrument de la Mouche a pratiquée dans le cuir du Bœuf ou de la Vache, ne ſe ferme pas; le Ver a même grand ſoin de l'entretenir, & il vient un tems où il lui convient de l'agrandir peu-à-peu; il y réuſſit au mieux en y introduiſant le bout de ſon derriere & en l'y retenant comme une tente. Cette même ouverture a encore un autre uſage : elle donne un écoulement au pus qui abonderoit trop dans la plaie & incommoderoit le Ver.

(7) Partie VIII, Chap. VI.

(8) †† Ce n'eſt pas uniquement à des Mouches que les galles dont je parle ici doivent leur naiſſance; des Papillons & des Scarabés en font naître auſſi. La plupart s'élevent ſur les feuilles. Leurs formes, leurs couleurs, leurs dimenſions, leur conſiſtance préſentent une multitude de variétés que deux grands

Une autre Mouche, à l'aide d'une ſcie admirable (9), pratique dans les branches du Ro-

Obſervateurs (†) ſe ſont attachés à décrire. Beaucoup ſont ſphériques, & parmi celles-ci il en eſt de toute groſſeur depuis celle d'une tête d'épingle juſqu'à celle d'une petite pomme. Quelques-unes ont un ſi beau coloris, qu'on les prendroit pour des fruits auxquels elles reſſemblent encore par leur tiſſu & leur chair. D'autres ſont preſque ligneuſes. Il en eſt qui ſont façonnées en maniere de paraſol : d'autres imitent la forme d'un clou, d'une gondole, d'un rein, d'un artichaut, d'une fleur, &c. Les unes ſont liſſes; les autres ſont hériſſées d'épines ou garnies d'une épaiſſe chevelure. Les unes n'ont dans leur intérieur qu'une ſeule cavité, & ne logent ainſi qu'un ſeul Ver; d'autres, dont l'intérieur eſt diviſé en pluſieurs logettes, renferment autant de Vers. Les Inſectes de différentes claſſes, dont les Petits doivent éclorre & s'élever dans ces diverſes ſortes de tumeurs, ont été pourvus d'inſtrumens admirables, au moyen deſquels ils ſavent percer ou entailler les parties des Plantes auxquelles ils confient leurs œufs. Il y a de ces galles qui ſont très-utiles dans les Arts; & l'on aime à contempler les rapports éloignés qui enchaînent la Mouche d'une galle du Chêne *à l'art ingénieux de peindre la parole & de parler aux yeux.* Enfin; on trouve des galles ſur preſque tous les Arbres & Arbuſtes: le Chêne ſeul en préſente de bien des eſpeces. Il y en a auſſi ſur les Plantes herbacées. Nous ſommes peu éclairés encore ſur leur formation, & nous n'avons là-deſſus que des conjectures qui ne ſuffiſent point à rendre raiſon de la diverſité des formes & des tiſſus.

(9) †† Ce bel inſtrument n'eſt pas ſeulement une ſcie; il eſt encore une rape & une tariere. Je ne dis pas aſſez; car la ſcie n'eſt pas ſimple; elle eſt double; & les deux ſcies, appliquées l'une contre l'autre, jouent alternativement. Avec un ſi excel-

(†) MALPIGHI & REAUMUR.

ſier des cellules qu'elle diſpoſe ſymmétriquement, & dans chacune deſquelles elle pond un œuf (10).

lent inſtrument, la Mouche pratique juſqu'à vingt-quatre logettes dans la même branche, dans chacune deſquelles elle dépoſe un œuf, qu'elle arroſe d'une liqueur viſqueuſe. Ces œufs de la Mouche à ſcie ſont au nombre de ceux dont j'ai parlé ailleurs, & qui offrent une ſingularité remarquable, celle de croître après avoir été pondus. (Partie VIII, Chapitre VI.)

La Cigale, ſi connue par ſon chant, & qui appartient à la claſſe des Mouches à quatre ailes, eſt auſſi pourvue d'un inſtrument admirable qu'elle porte au derriere, & à l'aide duquel elle pratique de longues entailles dans de menues branches de bois ſec. Cet inſtrument eſt une double tariere compoſée de deux pieces terminées en pointe, qui ſont aſſemblées à couliſſe & à languette dans un ſupport commun, & qui jouent alternativement & parallelement ſans s'écarter jamais l'une de l'autre. C'eſt toujours au bois vert ou qui végete encore, que la Mouche à ſcie confie ſes œufs; & c'eſt toujours au bois ſec que la Cigale confie les ſiens. Elle les diſtribue avec beaucoup d'ordre dans les différentes logettes qu'elle creuſe au centre du brin de bois qu'elle a choiſi. Il ſort de ces œufs un Ver à ſix jambes, dont les deux premieres ont une conformation particuliere, qui le met en état de fouiller la terre, & d'aller chercher ſa nourriture ſur les racines de quelque Plante.

(10) †† Les procédés des Eſcarbots *pilulaires* méritent bien que j'en faſſe mention. Ce ſont des Scarabés, & le nom de pilulaires qui leur a été donné par les Anciens, ne rend pas mal l'induſtrie qui les caractériſe. Ils hantent les fumiers & les excrémens, & en forment des pilules ou des boulettes, qu'ils arrondiſſent de plus en plus en les roulant ſur le terrein. Pluſieurs Eſcarbots s'occupent à la fois à promener la boulette. Ils la pouſſent avec leurs jambes de derriere en marchant à reculons; & quand il arrive que les inégalités du terrein

apportent des obſtacles à la marche de la petite boule, ils font effort pour les ſurmonter, & quelquefois d'autres Eſcarbots ſurviennent, qui partagent leurs efforts, & leur aident à pouſſer la boule plus loin. Ils ſont opiniâtres dans leurs manœuvres & ne ſe découragent point : lors même qu'on vient à les manier ou à les interrompre dans leur travail, ils ne manquent point de le reprendre. Souvent ils roulent avec leur balotte dans des foſſes plus ou moins profondes ; mais nos petits Siſyphes, toujours infatigables, ne ſe rebutent point, & redoublant leurs efforts ils parviennent ordinairement à retirer la balotte de la foſſe, & à la conduire plus loin. Ils vont enfin l'enterrer à une aſſez grande profondeur, & cette opération exige de leur part autant de travail que de patience.

Ce n'eſt pas ſans bonne raiſon que nos Eſcarbots ſont ſi attachés à leurs boulettes : elles renferment un dépôt précieux. Un œuf eſt logé au centre de chacune ; & cet œuf demandoit apparemment à être enveloppé d'excrémens & enterré à une certaine profondeur pour que le Petit pût en éclorre. Le ſoin des œufs n'a point été confié par la Nature aux ſeules Meres qui les ont pondus : la Société entiere des Eſcarbots a été chargée de s'en occuper & y prend un égal intérêt. Des Eſcarbots étrangers font rouler les boules avec autant d'activité & de conſtance que ceux qui les ont eux-mêmes façonnées, & que les Meres qui ont pondu les œufs.

Tous les Eſcarbots ne renferment pas leurs œufs dans des boules d'excrémens : il en eſt qui les logent dans les cadavres de petits Animaux, tels que les Taupes, les Grenouilles, les Sauterelles, &c. Quand ces Eſcarbots rencontrent ſur la ſurface de la terre, de pareils cadavres, ils ſe hâtent d'en prendre poſſeſſion ; mais ils n'ont garde de les laiſſer ſur la place : ils s'y deſſécheroient ou s'y conſumeroient inutilement ou leur ſeroient bientôt enlevés par des Animaux rodeurs & carnaciers. Ils travaillent donc à mettre en ſûreté leur capture ; & mon Lecteur n'imagine pas peut-être le moyen auquel ils ont recours. On n'en pouvoit choiſir un meilleur. Ils ſe mettent à enterrer le cadavre, mais on conviendra que c'eſt preſqu'un travail d'Her-

cule

cule pour de ſi petits Inſectes que d'enterrer le cadavre d'une groſſe Taupe. Ils y parviennent néanmoins, & en bien moins de tems qu'on ne le croiroit. Il ne faut quelquefois qu'un jour ou deux à deux paires d'Eſcarbots pour enterrer une Taupe à trois ou quatre doigts de profondeur. Je puis dire plus: Mr. GLEDITSCH s'eſt aſſuré qu'un ſeul Eſcarbot peut enterrer une Taupe en entier dans le court eſpace de vingt-quatre heures. Un pareil travail tient du prodige. C'eſt avec leur tête, leur corcelet & leurs pieds que les Eſcarbots creuſent la foſſe dans laquelle ils veulent enterrer le cadavre. Ils amoncellent autour la terre qu'ils retirent de la foſſe; ils en conſtruiſent une ſorte de couronnement ou de rempart qui trace les contours du tombeau, & dont les dimenſions ſont exactement proportionnelles à celles du cadavre. A meſure qu'ils creuſent la foſſe, le cadavre s'enfonce davantage, & la terre qui étoit amaſſée autour de lui, vient peu-à-peu à le recouvrir. Il ſe forme alors au-deſſus une petite élévation qui indique l'endroit ſous lequel il repoſe. La petite éminence s'affaiſſe inſenſiblement, ſe met au niveau du terrein, & bientôt on ne reconnoît plus l'endroit où le cadavre eſt enterré.

Lorſque la ſépulture eſt achevée, les Eſcarbots vuident le cadavre, & dépoſent leurs œufs dans ſon intérieur. Si on le retire de ſon tombeau au bout de quelques jours, on le verra fourmiller de Vers d'Eſcarbots.

Ce ne ſont pas ſeulement des cadavres entiers de petits Animaux, que les Eſcarbots enſeveliſſent pour fournir une nourriture aſſurée à leurs Petits; ils enſeveliſſent de même pour la même fin, des morceaux de chair des grands Quadrupedes qu'on met à leur portée.

En cinquante jours l'Académicien de Berlin a vu quatre Eſcarbots enterrer complétement deux Taupes, quatre Grenouilles, trois petits Oiſeaux, deux Sauterelles, les entrailles d'un Poiſſon, & deux morceaux de foie de Bœuf.

Nos laborieux enterreurs enſeveliſſent ainſi les cadavres depuis le mois d'Avril juſqu'au mois d'Octobre. On juge bien que ce n'eſt que dans une terre légere & un peu humide qu'ils

CHAPITRE VI.

Continuation du même ſujet.

Les Oiſeaux.

CHEZ les Oiſeaux, la Femelle n'eſt pas chargée ſeule du travail; le Mâle le partage (1).

peuvent pratiquer de ſemblables ſépultures : une terre forte ou graveleuſe réſiſteroit trop à leurs efforts.

(1) †† On dit que les Oiſeaux *parient :* il ſemble qu'on puiſſe dire qu'ils *ſe marient ;* car chez la plupart l'union du Mâle & de la Femelle ſemble être une ſorte de pacte conjugal contracté pour la procréation & l'éducation des Petits. L'amour paroît donc prendre chez les Oiſeaux une teinte de moral qui l'ennoblit & nous retrace l'image touchante de la Société conjugale la plus tendre & la plus parfaite. Appellés à travailler en commun au petit édifice qui logera la poſtérité prête à naître, le Mâle & la Femelle, déja unis par les doux liens d'une ſympathie naturelle, s'attachent d'autant plus fortement l'un à l'autre, qu'ils ont été mis dans une obligation plus étroite de remplir les devoirs de la Société conjugale & de s'entr'aider dans un travail pour lequel la Nature a ſu les intéreſſer tous deux également. Non-ſeulement le Mâle aide ſa Femelle à conſtruire le nid ; aſſez ſouvent encore il partage avec elle les ennuis de l'incubation. Il fait plus ; tandis qu'elle demeure collée ſur ſes œufs, il va lui chercher la nourriture & revient la lui dégorger dans le bec. D'autres fois, placé auprès de ſa compagne, il ſemble vouloir la réjouir par ſon chant & charmer, en quelque ſorte, l'ennui de ſa ſituation. Un

La ſimplicité de leur architecture eſt admirable. Le nid eſt creux, & de forme à-peu-près

tendre attachement a ſuccédé aux feux de l'amour, & la naiſſance des Petits, qui eſt pour l'heureux couple une autre jouiſſance, reſſerre de plus en plus les liens de l'union conjugale en la rendant plus néceſſaire. De nouveaux ſoins appellent alors le Pere & la Mere, & toujours fideles à la voix de la Nature, ils s'y livrent tous deux avec un égal empreſſement. Comme ils ont travaillé de concert à la conſtruction du nid, ils travaillent encore de concert à l'éducation de la Famille. Occupés ſans relâche de cet important ouvrage, ils ne ceſſent point de ſe prêter des ſecours mutuels. Leurs peines, leur ſollicitude, leur vigilance redoublent avec leurs plaiſirs, & l'on croit voir dans l'aimable Société la peinture fidele du ménage le mieux réglé & le plus honnête.

Mais tous les Oiſeaux ne naiſſent pas Architectes; tous n'entendent pas à conſtruire des nids. Divers Oiſeaux nocturnes, tels que le Hibou & la Chouette noire, ſavent néanmoins ſuppléer à leur ignorance dans l'art de bâtir, en profitant adroitement des nids qui ont été conſtruits par des Oiſeaux Architectes. D'autres Oiſeaux nocturnes pondent à crud dans des maſures ou dans des creux d'Arbres. Il en eſt à-peu-près de même de quelques Méſanges, des Pics, des Martin-pêcheurs, &c.

Ces Oiſeaux qui dépoſent leurs œufs dans des nids étrangers, rappellent auſſi-tôt à l'eſprit le fameux Coucou, ſur lequel on a débité tant de fables. Il ne va pas ſeulement pondre ſon œuf dans un nid qu'il n'a pas fait; il abandonne encore le ſoin de ſa progéniture à des Nourrices étrangeres, qui en ont autant de ſoin que de leurs propres nourriſſons. On connoît bien des Eſpeces de petits Oiſeaux que le Coucou charge ainſi de l'éducation de ſa Famille: la Fauvette, le Rouge-gorge, la Méſange, le Roſſignol, &c. ſont de ce nombre. On aſſure que le Coucou ne pond guere que deux œufs, & qu'il a ſoin de les dépoſer toujours un à un dans autant de nids étrangers.

hémiſphérique, pour mieux concentrer la chaleur. Il eſt revêtu de matériaux plus ou moins

L'élégant Hiſtorien (†) du Coucou, qui pour peindre les graces légeres de la Nature, ſemble emprunter le pinceau charmant de ſon illuſtre Ami, a eſſayé de juſtifier les procédés ſinguliers & preſque dénaturés de l'Oiſeau. Il remarque qu'un inſtinct étrange porte le Mâle à chercher les œufs de la Femelle pour les dévorer : il auroit donc plus de facilité à les découvrir s'ils étoient pondus dans un nid qu'elle auroit elle-même conſtruit. C'eſt encore un bon moyen d'en rendre la recherche plus difficile, que de les diſperſer en différens nids étrangers. Notre célebre Naturaliſte obſerve encore, que le Coucou eſt un des Oiſeaux qui muent le plus complétement : il eſt preſque tout nud immédiatement après la mue. Il n'a pas même achevé de s'habiller dans la ſaiſon des amours. La nourriture qui ſe porte en abondance aux nouvelles plumes, eſt en diminution de celle qui ſe porteroit à l'ovaire. Il ne s'y développe guere que deux œufs à la fois, & l'Oiſeau trop foible n'entreprend pas le pénible ouvrage de la conſtruction d'un nid. Mais la Nature, qui veut la conſervation de toutes les Eſpeces, l'a doué d'un inſtinct qui lui enſeigne à aller pondre dans des nids étrangers ; & comme elle n'a point reſſerré l'incubation des Oiſeaux dans les limites étroites de l'Eſpece, l'œuf du Coucou ne manque jamais de Couveuſe ni le Petit de Nourrice.

Les Oiſeaux de baſſe-cour ſont auſſi au nombre des Oiſeaux qui, à proprement parler, ne conſtruiſent pas de nids. C'eſt que l'homme, avec lequel ils vivent depuis ſi long-tems en ſociété, leur en épargne la peine. Ils en conſtruiſoient apparemment dans l'état de nature : mais depuis qu'ils ont paſſé, pour ainſi dire, dans l'état civil, ils ont perdu une partie de leurs facultés naturelles ou primitives. Ils vivent dans une ſi grande abondance de toutes choſes, qu'ils en ſont devenus pareſſeux

(†) Mr. de MONTBEILLARD.

groſſiers, deſtinés à ſervir de baſe & de défenſe au petit édifice. Il eſt garni intérieurement de plumes, de crin, de coton ou d'autres matieres propres à fournir aux Petits un lit chaud & mollet. Que d'attentions à bien aſſeoir le nid (2),

& fainéans. Néanmoins leur changement d'état n'a pas détruit leur affection pour les Petits qu'ils font éclorre dans les nids que la main de l'Homme leur prépare : on ſait qu'ils en prennent le plus grand ſoin.

Au reſte, divers petits Oiſeaux qui ne s'entendent pas mal à bâtir, ſe diſpenſent de ce travail quand ils rencontrent des nids étrangers ou des logemens qui leur conviennent & dont ils peuvent diſpoſer : le Moineau & l'Etourneau en ſont des exemples.

(2) †† L'Hiſtoire des Oiſeaux, ſi enrichie de nos jours par les travaux de MM. de BUFFON & de MONTBEILLARD, nous préſente une foule d'exemples de l'attention que divers Oiſeaux apportent à bien aſſurer leur nid. Je me bornerai ici à un ſeul qui nous eſt fourni par le Loriot. Cet Oiſeau induſtrieux bâtit le plus ſouvent ſon nid dans la bifurcation d'une petite branche. Pour l'y aſſujettir fortement, il enlace autour des deux rameaux qui forment la bifurcation de longs brins de paille ou de chanvre, auxquels il donne différentes directions : les uns vont droit d'un rameau à l'autre, & forment les bords antérieurs du nid, les autres pénetrent dans le tiſſu du nid ou l'embraſſent par-deſſous, & revenant ſe rouler autour du rameau oppoſé, donnent la ſolidité à tout l'ouvrage. Ces longs brins qui embraſſent le nid par-deſſous, en ſont proprement l'enveloppe extérieure, ou ſi l'on veut le fondement : l'intérieur, deſtiné à recevoir les œufs, eſt garni de menues tiges de Gramen, dont les épis ſont adroitement ramenés ſur le dehors du petit édifice. Ces menues tiges forment par leur aſſemblage une ſorte de matelas intérieur. Entre ce matelas & l'enveloppe

& à le mettre à l'abri de la pluie & des inſultes des Animaux ! Quelle aſſiduité ! quelle conſtance dans l'incubation ! Voyez encore la précaution que prend la Femelle de retourner les œufs pour les échauffer par-tout également, & l'inſtinct qui la porte à les piquer, afin d'aider aux Petits à éclorre. Sont-ils éclos ? que de nouveaux ſoins ne ſe donnent point le Pere & la Mere, pour les pourvoir des nourritures qui leur conviennent (3). Avec quelle prudence, avec quelle égalité ne ſavent-ils point diſtribuer cette nourriture ! Quelle vigilance ſur tout ce qui pourroit nuire à la petite Famille ! Quel courage à la défendre (4) ! Quels ſoins, quelle ſollicitude,

extérieure, l'adroit Oiſeau place une eſpece d'ouate faite de Mouſſe & de Lichens qui, en même tems qu'elle rend le nid plus mollet & plus chaud au-dedans, le rend plus impénétrable au-dehors.

(3) †† Les Pigeons, par exemple, ont grand ſoin de ramollir le grain dans leur géſier avant que de le dégorger dans le bec de leurs Petits. Une multitude de petits Oiſeaux vont à la chaſſe des Vers & des Moucherons ; ils en rempliſſent leur bec, & vont diſtribuer cette manne à leurs Nourriſſons. Pluſieurs eſpeces d'Oiſeaux qu'on range parmi les Granivores, & que nous alimentons de menues graines, comme la Linotte & le Verdier, ne laiſſent pas de nourrir leurs Petits d'Inſectes.

(4) †† La Poule nous fournit un exemple familier de ce courage des Oiſeaux à défendre leurs Petits. On a dit agréablement qu'une Poule à la tête de ſes Pouſſins eſt une eſpece

quelle intelligence dans la maniere de la raſſembler ſous leurs aîles, de la conduire, de l'exciter & de la dreſſer au vol (5)!

d'Héroïne qui affronte les plus grands dangers. Le Loriot, dont je parlois dans la Note précédente & qui eſt ſi habile Architecte, n'a pas moins de courage que d'induſtrie : il défend ſes Petits contre l'Homme même avec une intrépidité qu'on ne ſuppoſeroit pas dans un ſi petit Oiſeau. Plus d'une fois on a vu le Pere & la Mere, s'élancer avec un courage égal ſur ceux qui vouloient leur enlever leurs Petits. On a même vu la Mere enlevée avec le nid, continuer à couver dans la captivité, & mourir ſur ſa couvée. Et que dirai-je encore de l'affection des Cigognes pour leurs Nourriſſons ! Avec quelle activité le Pere & la Mere ne vont-ils point chercher la pâture qui leur a été aſſignée ! Jamais ils ne s'éloignent enſemble de l'habitation, & tandis que l'un eſt à la quête, l'autre ſe tient ſur un pied aux environs du nid, & ne perd pas de vue les Petits. Quand ils commencent à voleter & à s'eſſayer dans les airs, leurs tendres Parens les portent ſur leurs aîles, les défendent contre leurs ennemis, & s'ils ne peuvent les ſauver, ils ne refuſent pas de périr avec eux plutôt que de les abandonner.

(5) †† Quand les Petits de la Cigogne commencent à eſſayer leurs aîles, elle ne manque point de veiller ſur eux & de les conduire. Elle les exerce peu-à-peu par de petits vols autour de leur habitation, vers laquelle elle ne tarde pas à les ramener. Elle leur continue long-temps ſes ſoins, & ne les abandonne que lorſque leur éducation eſt entiérement achevée.

L'Aigle dreſſe auſſi ſes Petits au vol; mais bien différente de la Cigogne, elle ne prolonge pas leur éducation. Elle les chaſſe impitoyablement avant même que leur éducation ſoit achevée, & les force de pourvoir par eux-mêmes à leurs beſoins. Tous les Tyrans de l'air en uſent ainſi; & ce procédé qui paroît cruel & choquer le vœu de la Nature, ceſſe de le paroître dès

CHAPITRE VII.

Continuation du même ſujet.

Les Quadrupedes.

Ils allaitent leurs Petits ; ils les léchent, & guériſſent par ce moyen leurs plaies, en particulier celle du cordon ombilical. Ils les tranſ-

qu'on réfléchit ſur le genre de vie de ces Oiſeaux voraces. Appellés à vivre de rapine & de carnage, ils s'affameroient les uns les autres ſi pluſieurs demeuroient raſſemblés dans la même enceinte : ils n'y trouveroient pas aſſez de proie pour ſubſiſter. Ils ſe hâtent donc de chaſſer de cette enceinte leurs Petits dès qu'ils ont pris un certain accroiſſement ; & ſi le Pere & la Mere manquent de pâture, ils les mettent à mort.

L'Hirondelle domeſtique, plus à portée de tous les yeux que la Cigogne & les grands Oiſeaux de proie, donne à ſes Petits une éducation qu'un Amateur de la Nature ſuit avec d'autant plus d'intérêt qu'il eſt plus ſenſible. Tandis que la Femelle couve avec une aſſiduité merveilleuſe, le Mâle paſſe la nuit auprès d'elle ſur le bord du nid. Dès que les Petits ſont éclos, le Pere & la Mere vont à la quête des Inſectes aîlés qu'ils happent en volant ; ils en rempliſſent leur bec & viennent diſtribuer cette manne à leurs Nourriſſons. Ils ont encore l'attention de tenir le logement très-propre juſqu'au temps où les Petits devenus plus forts, puiſſent porter leur derriere hors de l'enceinte pour rejetter leurs excrémens. Mais ce qui attache bien plus le Spectateur, ce ſont les premieres leçons de l'art de voler, que le Pere & la Mere donnent aux Petits. Ils ne ſe bornent pas à les animer de la voix : pour les enhardir davan-

portent au beſoin, d'un lieu dans un autre. Ils les raſſemblent, les protegent, les conduiſent. Chez les Eſpeces carnaſſieres, quels mouvemens ne ſe donnent point les Meres pour fournir leurs Petits de chair! Avec quel art ne les élevent-elles pas à courir ſur leur proie, à s'en jouer, à la dépecer! Que de variétés n'offrent point en ce genre différentes Eſpeces de Quadrupedes! & comment les parcourir toutes (1)!

tage à ſortir du nid & à faire un premier eſſai de leurs aîles, ils ont l'adreſſe de ne leur préſenter plus la nourriture que d'un peu loin, & de s'éloigner par degrés à meſure que les Petits s'avancent pour la recevoir : puis ils tentent, mais non ſans quelqu'inquiétude, de les pouſſer doucement hors du nid, & dès qu'ils ſont parvenus à les en tirer, ils ſe mettent à voltiger devant eux comme pour les former par leur exemple à ce nouvel exercice, & leur offrir un ſecours toujours ſous leurs yeux : ils accompagnent tout cela d'accens ſi expreſſifs, qu'on s'imagine entendre la leçon des ingénieux Inſtituteurs. C'eſt choſe preſqu'incroyable & qui tient du prodige, que la tendreſſe de l'Hirondelle pour ſa géniture; au moins s'il en faut croire ce qu'en raconte un grand Homme (†) qui n'admettoit pas légérement des prodiges. Une Mere Hirondelle revenant au nid chargée de proviſions, & trouvant la maiſon où elle l'avoit bâti, embraſée, ſe précipita au travers des flammes pour nourrir & ſecourir ſes Petits. On pourroit néanmoins douter, ſi ce n'eſt point plutôt au défaut de connoiſſance ou d'expérience qu'il faut attribuer la choſe, qu'à l'excès de la tendreſſe maternelle.

(1) †† L'amour chez la plupart des Quadrupedes n'offre point ce tableau touchant & preſque moral, qui attache tant

(†) BOERHAAVE.

CHAPITRE VIII.

Réflexions sur l'amour des Animaux pour leurs Petits.

CET amour eſt un principe très-actif, qui égale & ſurpaſſe même quelquefois en force, celui qui porte chaque Individu à pourvoir à

chez les Oiſeaux. Plus véhément, plus impétueux chez le Quadrupede, il regne en deſpote ſur toutes ſes affections ; il n'eſt que fureur & jouiſſance, ſans tendreſſe, ſans attachement, ſans conſtance. A peine le Mâle & la Femelle ont-ils joui qu'ils ſe ſéparent, & la Femelle demeure chargée ſeule du ſoin de nourrir & d'élever les Petits. Souvent même elle eſt obligée de ſe receler pour les dérober aux recherches du Mâle.

Il y a pourtant chez les Quadrupedes quelques exemples d'union conjugale, qu'on aime à connoître. Je n'en citerai qu'un ſeul que nous fournit le Chevreuil. Cet Animal ſi propre, ſi vif, ſi éveillé, ſi léger à la courſe, dont la figure eſt ſi gracieuſe & la forme ſi élégante, n'abandonne point ſa Femelle après qu'il en a joui. Il lui demeure fidelement & tendrement attaché, & ſe plaît à vivre en famille avec elle & les Petits qui ſont nés de leur union. Cette douce ſociété, qui n'eſt interrompue que pendant le petit nombre de jours que dure le rut, ne finit que lorſque les Faons ſont appellés à former eux-mêmes une nouvelle famille.

La Louve féroce & cruelle a de quoi nous intéreſſer par le ſoin qu'elle prend de ſes Louveteaux, & l'art avec lequel elle les dreſſe à la chaſſe. Lorſqu'elle eſt ſur le point de mettre bas, elle cherche dans un bois le lieu le plus fourré : elle y applanit un certain eſpace en coupant & en arrachant les épines

ſa propre conſervation. On voit les Peres & les Meres ſoutenir de rudes travaux, & s'expoſer

avec ſes dents. Elle couvre cette eſpace d'un lit épais de mouſſe ou de menues herbes pour que ſes Petits ſoient couchés mollement. Elle les allaite pendant pluſieurs ſemaines, & leur apprend enſuite à manger de la chair qu'elle a ſoin de leur préparer en la mâchant. Bientôt elle leur apporte des proies vivantes, des Mulots, des Levrauts, des Perdrix ou d'autres Volailles. Les Louveteaux jouent avec ces proies & finiſſent par les étrangler: enſuite la Louve ſe met à les déplumer & à les écorcher, & après les avoir dépecées, elle en fait la diſtribution aux Louveteaux. Devenus plus forts, ils commencent à ſuivre leur Mere qui les mene boire à quelque mare voiſine, & les ramene au gîte. Elle les défend avec une intrépidité admirable, s'oublie elle-même, ne ſonge qu'à eux, & s'expoſe à tout pour les délivrer.

La Lionne, moins hardie & moins courageuſe que le Lion, le ſurpaſſe en courage & en intrépidité lorſqu'elle a des Petits. L'amour maternel devient chez elle une paſſion furieuſe. Elle ne redoute aucun danger, quand il s'agit de pourvoir à leur nourriture ou de les défendre. Elle ſe jette alors ſur les Hommes & ſur les Animaux, les met à mort, ſe charge de ſa proie, la porte à ſes Lionceaux, la leur partage, & les accoutume ainſi à ſe repaitre de ſang & de chair. Quand elle eſt près de mettre bas, elle ſe retire dans des lieux écartés & preſqu'inacceſſibles, & pour n'être point découverte elle dérobe ſes traces en retournant pluſieurs fois ſur la paſſée ou en les effaçant avec ſa queue. Mais ſi ſes craintes augmentent, elle prend le parti de tranſporter ailleurs ſes Nourriſſons, & ſi on tente de les lui enlever, elle les défend avec fureur & juſqu'à la derniere extrémité.

Tout le monde connoît les ſouterrains de la Taupe; mais tout le monde ne ſait pas ce que ces ſouterrains renferment de curieux. C'eſt là, qu'à l'abri des inſultes des Animaux carnaſſiers, loin du trouble, du bruit & des regards des curieux,

aux plus grands dangers pour fournir de la nourriture à leurs Petits ou pour les ſecourir

l'induſtrieuſe Taupe éleve ſa nombreuſe famille dans une heureuſe obſcurité qui aſſure ſa tranquillité & ſon bonheur. Il n'eſt pas facile de donner une idée nette de l'habitation de la Taupe. Le nid qu'elle conſtruit à ſes Petits avec tant d'intelligence, eſt un petit édifice d'une conſtruction aſſez recherchée & qui eſt admirablement bien appropriée au genre de vie & aux beſoins de l'Animal. L'habile Ouvriere travaille d'abord à pouſſer, à amaſſer la terre pour en former une ſorte de voûte ou de dôme plus ou moins élevé. Ces dômes ſont très-connus ſous le nom de taupinieres, & on en rencontre par-tout dans les Jardins & dans les Prairies. Ils ne ſont pas tous d'une égale grandeur : les plus grands, les plus élevés ſont ceux qui recelent le logement de la Famille. Après avoir élevé ſa voûte, la Taupe pratique dans l'intérieur, des eſpeces de cloiſon ou de piliers qu'elle eſpace ſuivant certaines proportions. Elle preſſe & bat fortement la terre qui forme les parois de la voûte ; elle la lie encore avec de menues racines & des herbes, & la rend ſi compacte que la voûte en devient impénétrable à l'eau des pluies, qui ne peut même y ſéjourner à cauſe de la convexité de l'édifice. Au-deſſous de la voûte, la Taupe éleve un petit tertre, qu'elle recouvre d'herbe & de feuilles pour ſervir de lit ou de matelas à ſes Petits. Ils ſe trouvent ainſi placés au-deſſus du niveau du terrein voiſin, & par-là à l'abri des petites inondations, en même temps qu'ils ſont à couvert de la pluie par le dôme qui recouvre le nid. Tout autour du tertre, la prudente Taupe perce des boyaux, qui deſcendent plus bas, & ſe prolongent de tous côtés comme des rayons qui partent d'un centre. Ces routes ſouterraines, fermes & bien battues, facilitent le tranſport des proviſions que la Taupe charie pour ſes Petits, & qui conſiſtent ordinairement en des fragmens de racines ou d'oignons. Il paroît au moins que ce ſont les premieres nourritures qu'elle donne à ſa famille ; mais elle la nourrit enſuite de Vers &

dans le beſoin. On ne lit point ſans émotion l'hiſtoire d'une Chienne, qui tandis qu'on la

d'Inſectes. Si l'on entreprend de pénétrer dans ſon ſouterrain, la Taupe attentive au moindre bruit, ſonge auſſi-tôt à mettre ſes Petits en ſûreté, & s'efforce de les tranſporter ailleurs.

Le gentil Écureuil, auſſi vif, auſſi léger, auſſi induſtrieux que l'Oiſeau, ſait, comme lui, conſtruire ſur les Arbres un nid à ſes Petits. Il amaſſe des buchettes, les entrelace avec de la mouſſe, ſerre & foule le tout, & donne au petit logement une capacité & une ſolidité qui lui permet d'y être à l'aiſe & en ſûreté au ſein de ſa famille. Une ſeule ouverture étroite ou très-juſte eſt ménagée vers le haut du nid pour l'entrée & la ſortie. Au-deſſus de cette porte d'Écureuil bâtit un petit toit en maniere de chapiteau conique, qui met l'intérieur à couvert de la pluie & facilite l'écoulement de l'eau.

L'Opoſſum, originaire de l'Amérique, & qui a quelques traits de reſſemblance avec le Singe & le Renard, eſt de tous les Quadrupedes connus le plus remarquable par la maniere ſinguliere dont il allaite, recele & éleve ſes Petits. Ils naiſſent long-temps avant terme; car l'accouchement de la Mere eſt toujours une ſorte d'avortement. Nous ignorons les raiſons d'un arrangement ſi extraordinaire, & qui pourtant ne nuit point ni au bien être des Petits ni à la multiplication de l'Eſpece. Sous le ventre de la Mere eſt placée une poche garnie de poils au-dehors & au-dedans, & qui peut s'ouvrir & ſe fermer au gré de l'Animal. C'eſt dans cette poche que les mamelles ſont logées. Les Petits naiſſent nuds & aveugles. Ce ne ſont que des Embryons, qui ont à peine la groſſeur d'une feve. Avec ſes pieds de devant, comme avec des mains, la Mere les prend adroitement & les met dans ſa poche. Ils ſaiſiſſent auſſi-tôt les mamelles & s'y collent. Ils y demeurent attachés juſques à ce que leurs yeux s'ouvrent & qu'ils aient pris un certain accroiſſement. Bientôt après la Mere ouvre ſa poche, les en fait ſortir pour les expoſer à la chaleur du Soleil & jouer avec eux: mais dès qu'elle entend quelque bruit ou qu'elle a quelqu'in-

diſſéquoit, ſe mit à lécher ſes Petits, comme s'ils euſſent charmé ſes ſouffrances, & qui lorſqu'on les éloignoit, pouſſoit des cris plaintifs.

POUR mieux aſſurer le ſort des Petits, la Nature n'auroit-elle point intéreſſé l'affection des Meres, en diſpoſant les choſes de maniere que les Petits deviennent pour elles une ſource de ſenſations agréables & d'utilités réelles?

quiétude, elle pouſſe un certain cri; auſſi-tôt tous ſes Petits, qui ſe jouoient ſur l'herbe, accourent vers elle, & vont ſe cacher dans la poche, qui ſe referme à l'inſtant; la Mere fuit & les emporte avec elle. Sans être expoſés à aucun danger, les jeunes Opoſſums rentrent de même dans la poche pour ſucer de temps en temps les mameiles, & c'eſt ainſi qu'ils prennent de jour en jour plus d'accroiſſement, & que leur éducation ſe perfectionne. Il ſemble donc que les Petits de cet Animal ſingulier aient, en quelque ſorte, à naître deux fois : la matrice interne ne fournit qu'à la conception & aux premiers développemens : les développemens ultérieurs s'operent dans la poche comme dans une matrice externe.

La Marmoſe, compatriote de l'Opoſſum, & qui lui reſſemble beaucoup par la forme & par le genre de vie, lui reſſemble encore par la précocité de l'accouchement. A leur ſortie de la matrice, les Embryons de la Marmoſe ſont même plus petits proportionnellement que ceux de l'Opoſſum. Cependant la Nature ne leur a pas préparé, comme à ces derniers, une poche pour leur ſervir de ſeconde matrice & de retraite : mais elle y a ſuppléé par des plis longitudinaux & profonds, placés ſous le ventre de la Mere & garnis de mamelles auxquelles les Embryons ne manquent pas de s'attacher en s'enfonçant & ſe cachant dans l'intérieur des plis.

QUELQUES faits ſemblent confirmer cette conjecture. L'action d'allaiter eſt la plus importante de toutes pour les Petits, puiſque leur vie en dépend immédiatement. Les mamelles ont été faites avec un tel art, que la ſuccion & la preſſion des Petits excitent dans les nerfs qui s'y diſtribuent un léger ébranlement, une douce commotion, qui eſt accompagnée d'un ſentiment de plaiſir. Ce ſentiment ſoutient l'affection naturelle des Meres, s'il n'en eſt une des principales cauſes. On en peut dire de même de l'action de lécher, qui d'ailleurs eſt réciproque. Enfin les Meres ſont quelquefois incommodées de l'abondance de leur lait; les Petits les ſoulagent en les tettant.

LA choſe n'eſt pas ſi ſenſible chez les autres Animaux qu'elle l'eſt chez les Quadrupedes; mais c'eſt peut-être parce qu'on ne s'eſt pas encore aviſé de tourner ſes recherches de ce côté-là. On peut cependant obſerver par rapport aux Petits des Oiſeaux, & particuliérement par rapport aux Pouſſins, qu'ils font ſentir à la main qui repoſe ſur eux, une eſpece de petit frémiſſement univerſel, plus ſenſible apparemment à la Poule, dont le ventre alors dépourvu de plumes, eſt doué d'un ſentiment très-délicat. Ce frémiſſement ébranle légérement les papilles ner-

veuſes, y excite de petites vibrations, d'où réſulte un chatouillement modéré, cauſe de plaiſir. La chaleur douce que la Mere & les Petits ſe communiquent réciproquement, doit encore entrer ici en ligne de compte.

L'INCUBATION paroît un myſtere plus difficile à pénétrer. On ne conçoit point ce qui peut retenir des ſemaines entieres ſur ſes œufs, un Oiſeau qui n'a jamais couvé, & qui par conſéquent n'a pu avoir appris de l'expérience, que de ces œufs doivent éclorre des Petits. On pourroit cependant douter s'il n'en eſt point de ceci, comme de la faim & de la ſoif ou du deſir de propager l'Eſpece, dont les cauſes réſident principalement dans la conſtitution de l'Animal ou dans les mouvemens inteſtins de certaines humeurs (1). Un indice que l'incubation pourroit n'être que l'effet d'un beſoin naturel, eſt qu'on voit des Poules couver des morceaux de craie, de petits cailloux, & des œufs d'Eſpece

(1) †† Tout ſemble indiquer dans la Poule qui veut couver, une chaleur interne, extrême à la région du ventre. Le ſang paroît refluer de la circonférence au centre. En ſe poſant ſur les œufs froids qu'on lui donne à couver, la Poule tempere un peu cette chaleur. Elle eſt encore tempérée par le repos & le ſilence. Il eſt ſi vrai que dans cette circonſtance la chaleur interne de la Poule accroît, que ſi on la rafraîchit par le bain ou par certains alimens, on éteindra en elle le deſir de couver.

très-

très-différente de la leur. L'inſtinct eſt, ce ſemble, plus ſûr dans ſon diſcernement (2).

A l'égard de la conſtruction du nid, elle a peut-être une liaiſon ſecrete & phyſique avec

(2) †† Mr. de MONTBEILLARD, qui s'eſt plu à approfondir l'hiſtoire du Coucou & à la purger des erreurs dont elle étoit infectée, (Chap. VI, Note 1.) a fait à ce ſujet diverſes expériences ſur l'incubation des œufs étrangers, dont les réſultats ſont trop remarquables pour que je ne les tranſcrive pas ici dans ſes propres termes.

„ Il réſulte, dit-il, de ces expériences, 1°. que les Femelles „ de pluſieurs Eſpeces de petits Oiſeaux qui ſe chargent de „ couver l'œuf du Coucou, ſe chargent auſſi de couver d'autres „ œufs étrangers, avec les leurs propres; 2°. qu'elles couvent „ quelquefois ces œufs étrangers par préférence aux leurs pro- „ pres, & qu'elles détruiſent quelquefois ceux-ci ſans en garder „ un ſeul; 3°. qu'elles couvent & font éclorre un œuf uni- „ que, autre que celui du Coucou; 4°. qu'elles repouſſent avec „ courage la Femelle Coucou lorſqu'elles la ſurprennent venant „ dépoſer ſon œuf dans leur nid; 5°. enfin, qu'elles mangent „ quelquefois cet œuf privilégié, même dans le cas où il eſt „ unique; mais un réſultat plus important & plus général, „ c'eſt que la paſſion de couver, qui paroît quelquefois ſi forte „ dans les Oiſeaux, ſemble n'être point déterminée à tels ou „ tels œufs, ni à des œufs féconds, puiſque ſouvent ils les „ mangent ou les caſſent, & que plus ſouvent encore ils en „ couvent de clairs; ni à des œufs réels, puiſqu'ils couvent „ des œufs de craie, de bois, &c. ni même à ces vains ſimu- „ lacres, puiſqu'ils couvent quelquefois à vuide; que par con- „ ſéquent une Couveuſe, qui fait éclorre, ſoit un œuf de „ Coucou, ſoit tout autre œuf étranger ſubſtitué aux ſiens, „ ne fait en cela que ſuivre un inſtinct commun à tous les „ Oiſeaux ".

le beſoin de pondre, en vertu de laquelle la Femelle eſt excitée à travailler. Le Mâle peut l'être par quelqu'autre beſoin analogue ou par l'imitation. Et quant à l'architecture, comme elle eſt uniforme dans chaque Eſpece, elle pourroit dépendre en dernier reſſort de la forme du corps de l'Oiſeau, de la ſtucture & des proportions de ſon bec & de ſes pieds, qui ſont les inſtrumens relatifs à cette architecture.

La mépriſe des Poules qui couvent des morceaux de craie ou des œufs d'Eſpece différente de la leur, prouve que la Nature a laiſſé à ſes agens une certaine latitude, entre les limites de laquelle, outre la fin principale, qui ne ſauroit manquer de s'obtenir par ce moyen, ſont encore renfermées des fins particulieres ou ſecondaires.

L'Éducation des Petits eſt la fin principale de l'affection des Meres pour eux. Lorſqu'ils ont été mis en état de gagner leur vie, non-ſeulement cette affection ceſſe, mais elle ſe change encore en haine : les Meres les chaſſent d'auprès d'elles, & les forcent ainſi à faire uſage des moyens qui leur ont été donnés pour ſubſiſter.

C'est peut-être par une raiſon oppoſée,

que certaines Meres ôtent la vie à ceux de leurs Petits qui ne ſont pas bien venans, ou qui ont été mis dans une ſituation incompatible avec celle que requiert la maniere de les élever. Les Petits des Abeilles doivent naître, croître & ſe transformer dans des cellules couchées horiſontalement : cette poſition vient-elle à changer ? les Abeilles arrachent de ces cellules les Petits & les mettent à mort.

Des expériences ſur cette matiere, faites dans l'eſprit de ces réflexions, y répandroient du jour, & feroient naître de nouvelles idées.

CHAPITRE IX.

Du naturel des Animaux.

La Nature a donné à chaque Animal, un caractere qui lui eſt propre, & qui ſe manifeſte au dehors par une diſpoſition particuliere à certains actes, par l'air, par la contenance, par la démarche, en un mot, par toute l'habitude extérieure ou l'enſemble de l'Animal. Ce caractere eſt, pour ainſi dire, au pſychologique, ce que la différence générique ou ſpécifique eſt au phyſique ; mais les rapports ſont tout autrement

faciles à fixer dans ce dernier que dans le premier ; ſans doute parce que nous manquons de ces recherches fines & profondes, néceſſaires pour éclairer un ſujet de cette nature. Le courage du Lion, la férocité du Tigre, la voracité du Loup, la fierté du Courſier, la gloutonnerie du Porc, la ſtupidité de l'Ane, la docilité du Chien, la malice du Singe, la fineſſe du Renard, la ſubtilité du Chat, la douceur de l'Agneau, l'indolence du Pareſſeux (1), la timidité du Lievre,

(1) †† Si l'on ſe preſſoit de juger ſur les apparences, on ſeroit tenté de croire, qu'en formant le *Pareſſeux*, la Nature n'a fait qu'un Monſtre, tant la conformation de ce Quadrupede eſt extraordinaire, ſoit à l'extérieur, ſoit à l'intérieur. Des yeux ternes & ombragés, des mâchoires à demi ébauchées, lourdes, peſantes, dépourvues de dents inciſives & canines ; des cuiſſes preſque hors des hanches, des jambes trop courtes, mal conformées & plus mal terminées encore par un pied ſans aſſiette, privé de pouce, & dont les doigts, qui ne peuvent ſe mouvoir ſéparément, ſont terminés par deux ou trois griffes démeſurément longues, qui nuiſent à la marche & ne ſont faites que pour grimper ; telles ſont les principales défectuoſités qu'on remarque dans l'extérieur du Pareſſeux. Son intérieur en préſente de plus frappantes encore. Il eſt au nombre des Animaux ruminans : pourvu, comme eux, de quatre eſtomacs, il manque néanmoins de tous les autres caracteres qui ſont propres aux Ruminans ; ſes inteſtins, en particulier, ſont très-petits & plus courts que ceux des Animaux carnivores. Enfin, il n'a point d'orifice diſtinct approprié à la génération. Privé d'armes offenſives & défenſives ; gauche & ſtupide à l'excès ; réduit à ne parcourir qu'une toiſe en une heure ; ce triſte Animal ſemble avoir été condamné par la Nature à mener la vie la plus miſérable : mais, toujours

la vivacité de l'Ecureuil, ſont des exemples auxquels on peut rapporter beaucoup d'Eſpeces de différentes Claſſes.

Ces divers caracteres ſont ſuſceptibles de modifications. On apprivoiſe juſqu'à un certain point les plus féroces : l'Ours & le Loup peuvent acquérir une certaine docilité, & ſe ſoumettre à la direction d'une main également adroite & courageuſe. Mais le naturel qui ne ſauroit être détruit, reparoît toujours ; l'Ours demeure Ours, & le Loup ne ceſſe point d'être Loup (2).

Mere & jamais Marâtre, elle lui a accordé des dédommagemens qui compenſent ſa miſere ; elle l'a fait robuſte, très-vivace, fort peu ſenſible & auſſi peu ſoucieux ; elle l'a conſtitué de maniere que, quoiqu'il ne prenne que des nourritures ſechés & peu ſucculentes, il engraiſſe beaucoup. Au reſte, le Pareſſeux eſt propre aux Contrées méridionales du nouveau Monde, & on ne l'a point encore trouvé dans l'ancien.

(2) †† Dans le premier âge, le Loup s'apprivoiſe aſſez facilement, & ſemble ſe rapprocher de la docilité du Chien, avec lequel il a d'ailleurs de grands rapports de conformation : mais le naturel féroce du Loup n'eſt jamais que maſqué par la domeſticité & l'éducation : dès qu'il a pris un certain accroiſſement le fond de ſon être ſe décele, & il mord cruellement la main qui le nourrit ou qui le careſſe.

„ L'Ours, dit M. de Buffon, eſt très-ſuſceptible de colere, „ & ſa colere tient toujours de la fureur, & ſouvent du caprice : „ quoiqu'il paroiſſe doux pour ſon Maître, & même obéiſſant „ lorſqu'il eſt apprivoiſé, il faut toujours s'en défier & le „ traiter avec circonſpection. . . . . Pour lui donner une eſpece

La poſſibilité de ployer ou de modifier juſqu'à un certain point le naturel des Animaux, & de lui faire prendre des impreſſions nouvelles, eſt une ſuite de l'inſtinct qui les porte à rechercher ce qui eſt utile à leur conſervation, & à éviter, au contraire, ce qui peut lui nuire. La faim & la crainte ſont les deux grands mobiles qui les déterminent, & l'Homme ſait mettre en œuvre ces mobiles.

Remarquons ici l'attention de l'Auteur de la Nature à éloigner de nos demeures les Animaux féroces, & à revêtir de qualités ſociales ceux qui doivent vivre auprès de nous (3). Sa

„ d'éducation, il faut le prendre jeune, & le contraindre pen-
„ dant toute ſa vie ".

Le Tigre, toujours altéré de ſang & jamais raſſaſié, qui déchire & dévore tout Être vivant qu'il rencontre; le Tigre, farouche & cruel par eſſence, ne cede ni à la force ni à la violence ni à la contrainte, & ſon naturel ſanguinaire & pervers demeure conſtamment indomptable. L'Ocelot, auſſi altéré de ſang que le Tigre, mais bien moins puiſſant que lui, ne fléchit point non plus ſous la main de l'Homme. La fiere Panthere ne s'apprivoiſe pas proprement; on ne peut que la domter : on la dreſſe même pour la chaſſe; mais ſi dans cet exercice elle manque ſa proie, elle entre en fureur & ſe jetteroit ſur ſon Maître, s'il ne prévenoit le danger en lui jettant de la chair ou quelque Animal vivant.

(3) †† C'eſt principalement le Climat qui décide de l'habitation des Animaux. Les plus redoutables, les plus féroces, le

SAGESSE a caché à ceux-ci leurs forces, & un nombreux troupeau de Bœufs plie ſous la baguette d'un Enfant.

CHAPITRE X.

Des ſociétés animales en général.

C'EST une grande diſtinction des Animaux, que celle en ſolitaires & en ſociables. On peut diſtribuer les ſociétés des Animaux en deux claſſes générales : en ſociétés improprement dites, ou celles dont les Individus ne travaillent point de concert aux mêmes ouvrages ; & en ſociétés proprement ainſi nommées ou celles dont les Individus travaillent en commun.

LE gros & le menu Bétail, les diverſes Eſpeces d'Oiſeaux domeſtiques & de paſſage, les Eſpeces de Poiſſons qui nagent par troupes, pluſieurs Eſpeces d'Inſectes qui ſe tiennent raſſemblés dans le même lieu, tels que les Pucerons, les Gallinſectes, &c. fourniſſent des exemples des ſociétés de la premiere claſſe.

Lion, le Tigre, la Panthere, &c. ne vivent & ne propagent que dans les Contrées brûlantes de la Torride. D'autres Animaux, comme le Renne & l'Ours blanc ne ſauroient ſubſiſter que dans les Régions glacées du Nord. L'Homme, appellé par la ſupériorité de ſon être à dominer ſur toute la Terre, vit & multiplie dans tous les Climats.

Les ſociétés de la ſeconde claſſe s'obſervent chez quelques Eſpeces de Chenilles & de Vers, chez les Abeilles, les Guêpes, les Bourdons, les Fourmis, les Caſtors, &c.

CHAPITRE XI.

Les ſociétés improprement dites.

Ces ſociétés ſont formées de la réunion de pluſieurs Individus que des beſoins ou des avantages communs raſſemblent dans le même lieu. Mais, tandis que dans les ſociétés proprement dites, chaque Individu travaille pour le bien commun, dans les ſociétés improprement dites, chaque Individu agit principalement pour ſoi, & ce n'eſt que dans certaines circonſtances, que tous les Individus concourent pour la défenſe ou l'intérêt commun.

Un troupeau de Bœufs paît dans une prairie : un Loup paroît, le troupeau forme auſſi-tôt un bataillon, & préſente les cornes à l'ennemi. Cette diſpoſition guerriere le déconcerte & l'oblige à ſe retirer.

En hiver, les Biches & les jeunes Cerfs ſe raſ-

ſemblent en hardes, & forment des troupes d'autant plus nombreuſes que la ſaiſon eſt plus âpre. Ils ſe réchauffent de leur haleine. Au printemps ils ſe diviſent, les Biches ſe cachent pour mettre bas. Les jeunes Cerfs demeurent enſemble, ils aiment à marcher de compagnie, & la néceſſité ſeule les ſépare.

Les Moutons, expoſés aux ardeurs de la canicule dans une plaine découverte, ſe rapprochent les uns des autres de maniere que leurs têtes ſe touchent; ils les tiennent inclinées contre terre, & humeut l'air frais qui vient par-deſſous.

Les Canards ſauvages, appellés à changer de climat, ſe rangent de façon que leur vol forme un coin ou un V renverſé, comme pour fendre l'air plus facilement. Le Canard qui eſt à la pointe, conduit le vol & fend l'air le premier. Au bout d'un certain temps, il eſt relevé par un autre, celui-ci l'eſt à ſon tour par un troiſieme, &c. Chacun prend ainſi ſa part de tout ce que cette fonction peut avoir de pénible.

Les Pucerons ſe raſſemblent en grand nombre ſur les Plantes: on ne connoît qu'imparfaitement les avantages qu'ils recueillent de cette eſpece de ſociété; mais on peut conjecturer avec

fondement, que les piquures réitérées d'un plus grand nombre de ces Insectes, attirent proportionnellement plus de sucs nourriciers dans la partie de la Plante, sur laquelle ils se sont établis. Cela paroît avec plus d'évidence dans la formation des vessies de l'Orme. Quand on les ouvre, on les trouve farcies de Pucerons. Ce sont réellement leurs piquures qui occasionent ces tumeurs singulieres. En même temps que chaque Puceron pompe le suc qui doit le faire croître, il contribue à la production de la vessie qui doit fournir à tous la subsistance & le logement.

CHAPITRE XII.

Réflexions.

Les Animaux auxquels la compagnie de leurs semblables étoit utile, ont été rendus propres à cette espece de commerce. Et si l'Auteur de la Nature a eu en ceci l'Homme en vue, comme on peut le penser sans orgueil, on trouvera que les moyens répondent bien à la fin. En effet, combien d'embarras & d'inconvéniens n'auroient pas accompagné les divers services que nous retirons des Animaux domestiques, si les Individus

d'une même Eſpece n'avoient pu cohabiter enſemble ?

Cet eſprit de ſociété n'eſt pas abſolument borné aux Individus d'une même Eſpece, il s'étend auſſi juſqu'à un certain point à ceux d'Eſpeces différentes, & l'Homme y trouve encore ſon avantage. L'habitude de ſe voir, de prendre leurs repas en commun, de coucher ſous le même toît, développe ou fortifie ces diſpoſitions naturelles des Animaux domeſtiques à vivre en ſociété. Les liaiſons qui en réſultent deviennent par conſéquent d'autant plus fortes, qu'elles ont commencé plutôt ou plus près de la naiſſance. C'eſt ainſi que des Animaux qui n'ont pas été appellés à vivre enſemble, peuvent néanmoins former une eſpece de ſociété : la diſpoſition naturelle de chacun d'eux à vivre avec ſes ſemblables, eſt ſuſceptible de modification ou d'extenſion (1).

(1) †† Cette liaiſon qui naît de l'habitude ou de la cohabitation s'étend aux Individus des Eſpeces les plus éloignées. Si l'on donne à couver à une Poule des œufs de Canards & de Dindons, les Petits qui en proviendront vivront enſemble dans une liaiſon auſſi étroite que des Pouſſins, & cette liaiſon ſubſiſtera pluſieurs mois. Quand les Canards s'écarteront on entendra les Dindons les rappeller par des cris plaintifs, qui annonceront leurs peines & leurs deſirs. Ils ſe chercheront mutuellement avec empreſſement, & cet attachement réciproque ſubſiſtera encore dans un âge aſſez avancé.

CHAQUE Individu reconnoît ſon ſemblable; ceux d'une même ſociété le reconnoiſſent auſſi. L'on remarque que s'il s'introduit dans une baſſe-cour des Poules étrangeres, celles du lieu les maltraitent pendant pluſieurs jours, juſques à ce que la cohabitation ait rendu celles-là membres de la ſociété.

L'EXTÉRIEUR du corps offre divers caracteres au moyen deſquels les Individus d'une même ſociété, peuvent ſe reconnoître & diſtinguer les Individus étrangers. Mais entre ces caracteres phyſiques, il peut y en avoir de mixtes ou qui appartiennent autant à l'ame qu'au corps, que les Animaux de la claſſe dont nous parlons, ſont en état de ſaiſir; comme ſont l'air, la contenance, la démarche, &c. Les Individus de cette Eſpece, qui ne ſe ſont pas encore familiariſés avec la nouvelle habitation, paroiſſent craintifs ou embarraſſés: cette crainte ou cet embarras les décele, & excite ou enhardit les autres à les attaquer.

L'ESPECE de ſociété dans laquelle vivent les Animaux domeſtiques, donne lieu à une obſervation remarquable; le jeune Agneau démêle ſa Mere au milieu de pluſieurs centaines de Brebis; quoiqu'il n'y ait pas entr'elles de différences ſenſibles.

EXPLICATION du fait. Les objets qui nous paroiſſent parfaitement ſemblables, ont ſouvent des différences réelles, mais que nous n'appercevons pas, ſoit parce que leur petiteſſe les dérobe à nos yeux, ſoit parce qu'elles ſont d'une nature à ne pas s'attirer l'attention. L'Agneau, plus intéreſſé à découvrir ces différences, les découvre en effet; & voilà qui ſuffit pour la ſolution du cas, ſans qu'il ſoit beſoin de recourir à des principes cachés. Si cependant on vouloit joindre à ce moyen, celui par lequel le Chien reconnoît ſon Maître au milieu d'une grande multitude, je veux dire l'odorat, il n'y auroit rien là que de fort naturel. On pourroit encore admettre des différences entre le bêlement d'une Brebis & celui d'un autre; différences qui, quoiqu'inſenſibles pour nous, frappent néanmoins l'oreille de l'Agneau (2).

(2) †† Un habile Cultivateur a fait ſur ce ſujet une obſervation intéreſſante. Il arrive aſſez ſouvent qu'une Brebis met bas deux Agneaux, quelquefois trois. Si la Mere vient à mourir tandis qu'elle les allaite, on a beaucoup de peine à les faire adopter à d'autres Brebis. On y réuſſit néanmoins en enveloppant l'Agneau adoptif de la peau du vrai Nourriſſon. La Brebis paroît d'abord avoir des doutes & marquer de la répugnance; mais elle adopte enfin l'Agneau qu'on lui donne à nourrir.

CHAPITRE XIII.

Les Oiſeaux de paſſage.

RIEN de plus admirable que ces légions de Volatiles qui à temps marqué, paſſent d'un pays dans d'autres très-éloignés. Quel inſtinct les raſſemble? Quelle bouſſole les dirige? Quelle carte leur trace la route? On conçoit d'abord que le changement de ſaiſon & le manque de nourritures convenables avertiſſent ces différentes Eſpeces d'Oiſeaux de changer de demeure (1).

(1) †† Ceci eſt bien confirmé par les obſervations d'un Naturaliſte célebre, Mr. de MONTBEILLARD. Il regarde le défaut de ſubſiſtance comme une des cauſes générales & déterminantes des migrations des Oiſeaux. Il remarque que ceux qui vivent d'Inſectes voltigeans, partent les premiers, parce que ces Inſectes manquent les premiers. Les Oiſeaux qui ſe nourriſſent d'Inſectes terreſtres, comme de Vers, de Chenilles, de Fourmis, &c. partent plus tard, parce qu'ils trouvent plus long-temps de quoi ſe nourrir. Ceux qui vivent de graines & de fruits qui ne parviennent à leur maturité qu'en Automne, n'arrivent auſſi qu'en Automne & habitent nos Campagnes une partie de l'Hiver. Enfin, les Oiſeaux qui ſe nourriſſent des mêmes choſes que l'Homme & de ſon ſuperflu, reſtent toute l'année aux environs des lieux habités. On a même obſervé, que de nouvelles cultures occaſionent à la longue de nouvelles migrations. Depuis qu'on cultive à la Caroline le Riz, l'Orge, le Froment, on y voit arriver régulièrement chaque année, des volées d'Oiſeaux inconnus auparavant aux Colons, & que

Mais comment ont-ils appris qu'ils trouveront dans d'autres régions la température & les alimens qui leur conviennent? Pour être en état de répondre à ces queſtions & à toutes celles qu'on peut faire ſur ce ſujet intéreſſant, il faudroit avoir examiné ſoigneuſement toutes les circonſtances qui accompagnent les marches de ces Oiſeaux. Le degré de froid ou de chaud qui les accélere ou les retarde, mérite ſur-tout d'être obſervé; car il n'y a pas lieu de douter que ce ne ſoit ce qui influe le plus ici. Il y a peut-être un rapport ſecret entre la température qui convient à certaines Eſpeces, & celle qui eſt néceſ-

cette circonſtance a fait nommer *Oiſeaux de Riz*, *Oiſeaux de Bled*, &c.

Mais, outre les cauſes externes générales que j'aſſignois aux migrations des Oiſeaux, il ſemble qu'il faille y joindre encore une cauſe non moins générale, mais interne, & qui fait ſentir ſon action à tous les Individus de l'Eſpece: je veux parler d'un certain mouvement inteſtin, qui ſurvient à tems marqué à tous les Individus, & qui ſe manifeſte par l'inquiétude qu'ils témoignent alors. Une obſervation très-ſûre & répétée bien des fois ne permet pas de ſe refuſer à cette idée. On a vu de jeunes Oiſeaux de paſſage, des Cailles, par exemple, élevées en cage depuis leur naiſſance, éprouver conſtamment deux fois chaque année une inquiétude & une agitation extraordinaires, préciſément dans le tems du paſſage en Septembre & en Avril. Cette inquiétude duroit environ un mois, & recommençoit tous les jours environ une heure avant le coucher du Soleil. Toute la nuit ſe paſſoit dans ces agitations, & le jour ces Oiſeaux paroiſſoient triſtes, abattus & aſſoupis.

ſaire pour la production des alimens dont elles ſe nourriſſent.

Les vents paroiſſent avoir une grande influence ſur les émigrations des Oiſeaux. L'hiſtoire de ces émigrations eſt eſſentiellement liée aux obſervations météorologiques & les ſuppoſe. Sans doute qu'il ſeroit plus aiſé de dire, pourquoi les Oiſeaux dont il s'agit, volent par nombreux eſcadrons, que ſéparés ou épars. Ils ſont ainſi moins expoſés à devenir le jouet des vents. Mais cet avantage n'eſt pas probablement le ſeul que leur procure l'état de ſociété. (2). Nous

(2) †† Chez les Oiſeaux de paſſage, comme le remarque auſſi Mr. de Buffon, les Peres & les Meres raſſemblent leurs Familles lorſque le tems du départ approche. Pluſieurs Familles ſe raſſemblent pour ne former qu'une même caravane, & ſe mettre par-là plus en état de ſurmonter les réſiſtances & s'oppoſer à leurs ennemis.

Mais tous les Oiſeaux voyageurs ne ſe forment pas en caravanes pour paſſer d'un Pays dans un autre. Il en eſt qui émigrent ſolitaires : d'autres n'émigrent qu'avec leur propre Famille : d'autres émigrent par petites troupes.

On connoît en général les migrations des Cailles, des Étourneaux, des Grives, des Bécaſſes, des Corneilles, des Oies, &c.; mais de toutes les migrations des Oiſeaux il n'en eſt point de plus connues que celles des Hirondelles, & ſur leſquelles les Naturaliſtes aient plus varié. On ſait que les uns ont admis qu'elles émigroient, & que d'autres ont cru qu'elles ſe précipitoient dans des marais où elles demeuroient engourdies & accrochées les unes aux autres juſqu'au retour du Printems.

manquons

manquons de recherches assez approfondies sur ces différentes Especes d'Oiseaux & sur les Poissons de passage.

On s'étonne que des Savans en Anatomie & en Histoire naturelle, & même des Savans d'un grand nom, aient pu admettre une opinion aussi étrange que celle de cette immersion des Hirondelles. Ils ont fait néanmoins de si grands efforts pour la rendre croyable, que le judicieux Mr. de MONTBEILLARD s'est trouvé dans l'obligation de la réfuter sérieusement, & il n'a pas eu beaucoup de peine à y réussir. Comment des Hommes instruits ont-ils pu se persuader un instant, qu'un Animal tout aérien, dont les poumons ont inspiré & expiré l'air pendant six mois, peut vivre sous l'eau ou dans la vase pendant six autres mois sans respirer, & reparoître ensuite avec sa vivacité naturelle ? Les poumons des Hirondelles, comme ceux de tous les Habitans de l'air, ne sont point du tout organisés à la maniere des poumons des Amphibies ; & pourtant l'opinion dont il s'agit transforme gratuitement l'Hirondelle en Amphibie. Mais l'Hirondelle est si peu en état de vivre sous l'eau, qu'elle y périt en peu de temps lorsqu'elle y est plongée. Elle ne sauroit même résister au froid médiocre de cinq degrés au-dessus de la congelation. L'expérience en a été faite par un bon Physicien. D'ailleurs, si la prétendue immersion des Hirondelles étoit chose aussi ordinaire qu'on a tenté de le faire croire, on les verroit chaque Printemps sortir en grandes troupes des marais, comme on voit alors les Loirs & les Marmottes sortir de leurs retraites. C'est néanmoins ce qu'on n'a jamais vu, & que très-sûrement on ne verra jamais. On ne trouve pas même un seul Auteur qui ait rapporté sur l'immersion & l'émersion des Hirondelles aucune observation sur laquelle on puisse tant soit peu compter. Ce sont toujours des oui-dire, & jamais des faits bien constatés. Mais il est une Espece de ces Oiseaux dont les Individus s'assemblent en grand nombre dans les joncs des marais, & qui s'y noyent quelquefois : de pareilles Hirondelles

pêchées peu de temps après leur ſubmerſion, ont pu revenir à la vie & donner naiſſance à la fable de l'immerſion & de l'émerſion de ces Oiſeaux.

C'eſt vers la fin de Septembre, ou au commencement d'Octobre, ſuivant la température de la ſaiſon, que les Hirondelles quittent nos Contrées pour paſſer dans les Pays chauds. Elles ſe raſſemblent alors en grandes troupes ſur les cordons & les faîtes des édifices, & font entendre ſans ceſſe un cri de ralliement. Non-ſeulement toutes les Familles de la même Eſpece ſe réuniſſent pour ſe préparer au départ; mais la caravane s'accroît encore par la jonction d'Hirondelles d'Eſpeces différentes, qui avoient vécu auparavant ſéparées, & qu'un même inſtinct porte à ſe réunir aux autres pour partir & voyager de conſerve. Le Savant ADANSON a vu nos Hirondelles d'Europe arriver au Sénégal dans la ſeconde ſemaine d'Octobre : il les a même rencontrées en mer, ainſi que d'autres Voyageurs : mais elles ne nichent pas au Sénégal. Elles en repartent ſur la fin de Mars. Il eſt donc bien vrai que les Hirondelles de nos Contrées vont paſſer l'Hiver dans les Pays chauds, & point du tout ſe plonger dans les marais. Si mon Lecteur demandoit encore une preuve de la fauſſeté de cette immerſion, je la trouverois dans une expérience de FRISCH. Ce Naturaliſte ayant attaché aux pieds de quelques Hirondelles un fil teint en détrempe, revit l'année ſuivante ces mêmes Oiſeaux garnis de leur fil qui n'étoit point décoloré. Cette ingénieuſe expérience prouve encore que les mêmes Hirondelles reviennent au Printemps dans les mêmes lieux qu'elles avoient quitté en Automne. Mais les Hirondelles domeſtiques ne retournent pas pondre dans le nid de l'année préédente. Elles en conſtruiſent un nouveau au-deſſus de l'ancien, ſi le lieu le permet. On a vu juſqu'à quatre de ces nids placés les uns au-deſſus des autres dans le même canal de cheminée, & conſtruits d'année en année.

Les Grives, les Etourneaux, les Cailles, les Pinſons, les Fauvettes, &c. partent en Automne; & c'eſt alors que les Bécaſſes & les Bécaſſines arrivent dans nos Contrées. Je viens de nommer l'Etourneau parmi les Oiſeaux de paſſage; mais je

dois ajouter qu'il n'eſt proprement Oiſeau de paſſage que dans les Pays froids tels que la Suede. Dès que les Etourneaux ne nichent plus, ils ſe raſſemblent en grandes troupes. Leur maniere de voler eſt ſinguliere, & ne ſe retrouve dans aucune autre Eſpece. On la diroit ſoumiſe à une ſorte de tactique : ils tourbillonnent ſans ceſſe en l'air, & tandis que leur inſtinct les entraîne vers le centre du tourbillon, la rapidité de leur vol les emporte continuellement au-delà. Ils circulent ainſi & ſe croiſent en tout ſens, & la ſphere entiere paroît tourner ſur elle-même, ſans ſuivre de direction conſtante. Ce tournoiement ſingulier n'eſt pas inutile aux Etourneaux : il écarte les Oiſeaux de proie qui ſe trouveroient mal de s'engager dans l'épais tourbillon où ils ſeroient expoſés à mille chocs divers.

Je ne finirois point ſi je voulois parcourir avec nos plus célebres Ornithologiſtes, l'intéreſſante hiſtoire des Oiſeaux émigrans ; mais je m'arrêterai encore quelques momens ſur l'émigration des Grues, qui ſont de tous les Oiſeaux voyageurs ceux qui exécutent les courſes les plus longues & les plus hardies.

Originaires des Contrées ſeptentrionales, les Grues parcourent les Régions tempérées & s'enfoncent dans celles du midi. Elles s'élevent à une grande hauteur dans les airs, & s'y diſpoſent en ordre de bataille : leur phalange forme une eſpece de triangle comme pour diminuer la réſiſtance que l'élément léger apporte à la rapidité de leur vol. Mais quand le vent devient impétueux & qu'il menace de rompre la phalange, elles ſe diſpoſent en cercle en ſe reſſerrant de plus en plus. Elles en uſent de même à la rencontre des grands Oiſeaux de proie dont elles ont à repouſſer les attaques. C'eſt pour l'ordinaire dans les ombres de la nuit qu'elles fendent les airs, & leur voix éclatante annonce au loin leur paſſage. Il ſemble qu'elles aient un Chef qui dirige leur marche, & qui les avertit fréquemment par un cri de reclame de la route qu'il tient : la troupe répete ce cri comme pour faire entendre qu'elle ſuit & garde la direction. Si elles preſſentent l'orage, elles abaiſſent leur vol & ſe rapprochent de la terre. Quand elles s'y raſſemblent pendant la nuit, elles ont ſoin d'établir une garde qui

veille tandis que la troupe dort, & qui l'avertit par un cri du danger qui la menace. De-là ces hiéroglyphes où la prudente Grue eſt repréſentée comme le ſymbole de la vigilance. Ces grands Oiſeaux émigrent dès les premiers froids de l'Automne. On les voit paſſer alors du fond de l'Allemagne en Italie, & pourſuivre leur marche vers le Midi. Elles nichent dans les marais du nord. A peine l'éducation des Petits eſt-elle achevée, que le temps du départ arrive : ils ſe mettent en route avec leurs Parens, & ſont déja aſſez forts pour les accompagner dans leurs longues traverſées.

Les vrais Oiſeaux de paſſage émigrent périodiquement dans une certaine ſaiſon : mais il arrive quelquefois qu'on obſerve de nombreuſes migrations d'Eſpeces ſédentaires, ſoit que des orages violens les chaſſent des lieux qu'elles habitent, ſoit qu'elles viennent à y manquer de ſubſiſtance. Ce ſont là des migrations irrégulieres qui n'ont lieu que trois à quatre fois dans un ſiecle, & dont le Bec-croiſé & le Caſſe-noix fourniſſent des exemples.



CHAPITRE XIV.

Les Harengs.

Les Harengs émigrent par grandes troupes du pôle boréal vers les côtes d'Angleterre & de Hollande. Ces émigrations semblent être occasionées par les Baleines & autres grands Poissons que les mers glaciales renferment dans leur sein, & qui poursuivent les Harengs. Ces Monstres marins en avalent à la fois des tonnes entieres. Ils suivent souvent leur proie jusques sur les côtes d'Angleterre ou d'Ecosse. Les Harengs multiplient excessivement, & ils sont peut-être de tous les Poissons ceux qui multiplient le plus. Ils semblent être une manne préparée par la PROVIDENCE, pour la nourriture d'un grand nombre de Poissons & d'Oiseaux de mer. Pour que l'Espece des Harengs se conservât, il falloit qu'ils fussent se soustraire à la poursuite de leurs Ennemis.

Les Harengs arrivent sur les côtes d'Ecosse & d'Angleterre, vers le commencement de Juin. Leurs nombreuses légions se partagent alors en plusieurs divisions. Les unes dirigent leur course

vers l'eſt, les autres vers l'oueſt. Après avoir navigé quelque temps, les différentes troupes ſe diviſent encore, & parcourent les divers parages des mers Britanniques & de celles d'Allemagne, ſe réuniſſent enſuite, & diſparoiſſent enfin au bout de quelques mois. Pluſieurs milliers de Hollandois ſont occupés annuellement à la pêche du Hareng; on peut juger par ce ſeul trait de l'étonnante multiplication de ce Poiſſon (1).

(1) †† De tous les Poiſſons qui vivent au ſein des mers, il n'en eſt point où la magnificence de la Nature dans la multiplication des Êtres vivans, brille avec plus d'éclat que dans le Hareng; & c'eſt ſur-tout ici qu'il faut admirer le merveilleux équilibre qu'elle entretient ſans ceſſe entre la multiplication & la deſtruction. Malgré le nombre prodigieux d'ennemis qui font aux Harengs une guerre perpétuelle & toujours heureuſe, on voit chaque année des flots de ces Poiſſons s'avancer vers les mers d'Allemagne & d'Angleterre, & fournir conſtamment aux Pêcheurs les récoltes les plus abondantes. En vain les Baleines, les Requins, les Marſouins & une foule d'autres Poiſſons font-ils une énorme conſommation de Harengs; en vain les Oiſeaux de mer en conſomment-ils encore une immenſe quantité; en vain des milliers d'Anglois, de Hollandois, d'Allemands, de François ne ceſſent-ils d'en remplir leurs filets; la pullulation en eſt toujours à-peu-près la même, & l'Eſpece victorieuſe de tous ſes Ennemis, ſe conſerve de ſiecle en ſiecle & envoie chaque année de nouvelles légions dans nos mers. „ Les Ha-
„ rengs, dit l'illuſtre Hiſtorien (†) des Poiſſons, entrent par
„ fois en ſi grande quantité dans la Manche, qu'ils reſſemblent
„ aux flots d'une mer agitée; c'eſt ce que les Pêcheurs nom-

(†) Mr. DUHAMEL.

„ ment des lits ou bouillons de Harengs : quand les filets don-
„ nent dans ces bouillons, il arrive qu'ils ſont tellement char-
„ gés de Poiſſons qu'ils rompent & coulent bas ".

Ce n'eſt pas uniquement pour ſe ſouſtraire aux pourſuites des grands Poiſſons qui hantent les mers du Nord, que les Harengs s'avancent en grandes troupes vers les mers d'Angleterre & d'Allemagne ; c'eſt encore pour y recueillir une abondante nourriture que la Nature leur a préparée dans ces parages : ils fourmillent alors de Vers & de petits Poiſſons dont les Harengs ſont très-avides, & qui les engraiſſent beaucoup. Ils y fraient en même temps. Et peut-être encore que lorſqu'ils abandonnent les mers du Nord, ils n'y trouvent plus aſſez de nourriture pour fournir à leur ſubſiſtance. On peut conjecturer avec fondement, qu'il en eſt à cet égard des Harengs & des autres Poiſſons qui émigrent, comme des Oiſeaux de paſſage. Le même inſtinct & les mêmes beſoins peuvent déterminer les migrations chez les uns & chez les autres ; & ces migrations ſont elles-mêmes le moyen que la ſage Nature emploie pour conſerver ces Eſpeces ſi nombreuſes en Individus.

CHAPITRE XV.

Les Rats de paſſage.

CES Rats, particuliers aux contrées les plus ſeptentrionales de l'Europe, apparoiſſent de temps en temps en ſi grand nombre dans les campagnes de la Norwege & de la Laponie, que les Habitans s'imaginent qu'ils tombent du Ciel. Un Naturaliſte célebre (1) qui leur a donné l'attention qu'ils méritent, a reconnu que ces Rats ont des émigrations périodiques, tous les 18 ou 20 ans. Ils ſortent alors de leurs demeures & ſe mettent en campagne. En chemin faiſant, ils tracent dans la terre des ſentiers ou ſillons de deux doigts de profondeur, & qui occupent quelquefois la largeur de pluſieurs toiſes. Mais ce que ces émigrations offrent de plus ſingulier, eſt que les Rats ſuivent conſtamment dans leur marche la ligne droite, ſans ſe détourner jamais qu'à la rencontre d'un obſtacle impénétrable. Ainſi, quand il leur arrive d'être arrêtés par un rocher, ils eſſaient d'abord de le percer, & comme ils n'en peuvent venir à bout, ils en font le tour, & regagnent au-delà la ligne droite. S'ils rencontrent une maſſe de foin ou de paille, ils la

(1) Mr. LINNEUS.

percent de part en part, toujours en ligne droite. Un lac ne les arrête point : ils le traverſent de même ou entreprennent de le traverſer en ligne droite, & s'ils trouvent ſur leur paſſage une barque ou quelqu'autre bâtiment, ils grimpent deſſus auſſi-tôt, le traverſent & deſcendent de l'autre côté par une ligne parallele à celle qu'ils ont tracée en montant (2).

(2) †† Le petit Quadrupede dont je parle dans ce Chapitre, habite les montagnes de Norwege & de Laponie. Il y a reçu le nom de *Leming*, que Mr. de BUFFON lui a conſervé. C'eſt un des plus terribles fléaux qui déſolent de temps en temps les campagnes de ces Contrées. Ils dévaſtent les jardins, les champs, les prairies, conſument toutes les productions de la terre, & n'épargnent que ce qui eſt ſerré dans les maiſons ou dans les greniers où heureuſement ils n'entrent point. Ils courent avec aſſez de viteſſe, ſe creuſent des ſouterreins, comme la Taupe, & mangent comme elle, des racines. Quoique petits, ils ſont très-courageux, ſe défendent contre leurs ennemis, vont au-devant de ceux qui les menacent, & ne fuient point à l'approche des Hommes. Si on les frappe du bâton, ils ſe jettent deſſus & le ſerrent ſi fortement entre leurs dents, qu'ils ne lâchent point priſe & ſe laiſſent tranſporter ainſi à quelque diſtance. Ils font entendre un aboiement ſemblable à celui des petits Chiens. Quand ils ont émigré en grandes troupes de leur Pays natal, ils n'y retournent plus. On aſſure même qu'ils meurent tous au retour de la verdure ; & comme le nombre de leurs petits cadavres eſt prodigieux, l'air en eſt ſi infecté qu'il en naît des maladies. Ils ſe dévorent auſſi les uns les autres, comme tous les Rats, & de-là vient que leur deſtruction ſemble auſſi prompte que leur multiplication. Un Auteur raconte, que lorſqu'ils ſe font la guerre, ils ſe partagent en deux bandes qui ſe jettent l'une ſur l'autre & s'entredétruiſent.

CHAPITRE XVI.

Les ſociétés proprement dites.

PARMI les ſociétés improprement dites, il en eſt pluſieurs qui dépendent du haſard ou du fait de l'Homme, ſinon en tout, du moins en partie. Il n'en va pas de même des ſociétés proprement dites. Elles ne doivent leur origine à aucun fait humain ni à aucune circonſtance étrangere ; mais elles relevent uniquement de la Nature. Les membres qui les compoſent ne ſont pas ſeulement unis par des beſoins ou des avantages communs, & cela pour un temps ſouvent aſſez court ; ils le ſont encore par un lien plus fort, & qui ſubſiſte juſqu'à la mort de l'Animal ou du moins pendant une grande partie de ſa vie ; je veux dire la propre conſervation de l'Individu ou celle de ſa Famille. L'une & l'autre ſont néceſſairement attachées à l'état de ſociété. C'eſt pour cette grande fin que ces différentes Eſpeces d'Animaux ſociables, ont été inſtruits à travailler en commun à des ouvrages ſi dignes d'être admirés.

LES ſociétés proprement dites pourroient être diviſées en deux claſſes ; la premiere compren-

droit celles dont la fin principale ſe borne à la conſervation des Individus, la ſeconde celles qui ont pour but & la conſervation des Individus & l'éducation des Petits.

PLUSIEURS Eſpeces de Chenilles & quelques Eſpeces de Vers appartiennent à la premiere de ces deux claſſes; les Fourmis, les Guêpes, les Abeilles, les Caſtors, &c. à la ſeconde.

LA premiere claſſe auroit ſous elle deux genres principaux; l'un comprendroit les ſociétés à temps, l'autre, les ſociétés à vie.

CHAPITRE XVII.

Les Chenilles communes (1).

UN Papillon dépoſe ſes œufs vers le milieu de l'Eté ſur une feuille de Prunier; le nombre de ces œufs eſt d'environ trois à quatre cents. Au bout de quelques jours il ſort de chacun d'eux une très-petite Chenille. Loin de ſe diſperſer ſur

(1) †† Ces Chenilles ſont celles qui ſe conſtruiſent ces nids de pure ſoie, qu'on rencontre ſi fréquemment en Hiver ſur les haies & ſur les Arbres fruitiers, & qui ſe font remarquer par leur blancheur. La forme & la grandeur de ces nids varient beaucoup.

les feuilles voiſines, toutes demeurent raſſemblées ſur celle qui les a vu naître : le même eſprit de ſociété les unit. Elles ſe mettent auſſi-tôt à filer de concert une toile, d'abord très-mince, mais qu'elles fortifient enſuite peu-à-peu en y ajoutant de nouveaux fils. Cette toile eſt une vraie tente, dreſſée ſur la feuille, & ſous laquelle les jeunes Chenilles ſe mettent à couvert. A meſure qu'elles groſſiſſent, elles étendent leur logement par de nouvelles couches de feuilles & de ſoie. Les eſpaces compris entre ces couches ſont les appartemens qui ſe communiquent tous par des portes ménagées à deſſein. C'eſt dans ce nid qu'elles paſſent l'Hiver, couchées les unes auprès des autres, ſans mouvement, juſques à ce que le retour du Printemps les ranime, & les invite à aller ronger les feuilles naiſſantes. Enfin, vers le mois de Mai, la ſociété ſe diſſout; chaque Chenille tire de ſon côté, & va paſſer le reſte de ſa vie dans la ſolitude. Alors, devenues plus fortes, l'état de ſociété ne leur eſt plus néceſſaire; elles n'ont plus beſoin d'habitation commune.

Ce léger précis de l'hiſtoire de la Chenille nommée *Commune*, parce qu'elle eſt de celles qu'on rencontre le plus fréquemment, donne une idée des ſociétés à temps, & qui ont pour

fin prochaine & directe la conservation des Individus.

CHAPITRE XVIII.

Les Chenilles processionnaires.

Ces Chenilles, qui vivent sur le Chêne, & dont les sociétés sont beaucoup plus nombreuses que celles des *Communes*, ont des procédés plus singuliers. Elles sortent de leur nid au Soleil couchant, & marchent en procession sous la conduite d'un Chef, dont elles suivent tous les mouvemens. Les rangs ne sont d'abord que d'une Chenille, ensuite de deux, de trois, de quatre & même de plus. Le Chef n'a rien d'ailleurs qui le distingue, que d'être le premier, & il ne l'est pas constamment, parce que chaque Chenille peut à son tour occuper cette place. Après avoir pris leur repas sur les feuilles des environs, elles regagnent leur nid dans le même ordre, & cela continue pendant toute la vie de Chenille. Parvenues enfin à leur dernier accroissement, chacune se construit dans le nid une coque, où elle se change en Chrysalide, & revêt ensuite la forme de Papillon. Ces métamorphoses

font ſuccéder à l'état de ſociété un nouveau genre de vie, tout différent de l'ancien (1).

VOILA un exemple des ſociétés à vie, dont la fin principale eſt la conſervation des Individus (2).

(1) †† Ces curieuſes Républicaines ne doivent être obſervées qu'avec précaution : elles ſont les plus venimeuſes de toutes les Chenilles de nos Contrées. Elles font naître ſur la peau des ampoules lors même qu'on ne les touche point. Il ſuffit quelquefois de ſe trouver couché au pied d'un Chêne où elles ſe ſont établies, pour éprouver bientôt des démangeaiſons très-incommodes. On ſait que les Chenilles ne ſont point venimeuſes par elles-mêmes ; elles ne le ſont que par accident. C'eſt la robe qui eſt venimeuſe & point du tout la Chenille. Les petits poils dont les Chenilles velues ſont fournies, ſe détachent facilement de leur peau & entrent dans la nôtre comme de petites épines. Ce ſont uniquement ces poils qui y font naître des démangeaiſons & des ampoules. Toutes les Chenilles raſes peuvent être maniées impunément. Nos proceſſionnaires du Chêne ſont très-fournies de poils fort courts, qui ſe détachent de leur peau au moindre frottement. L'air qui les environne, en eſt quelquefois rempli. Leur nid en abonde, & quoique les Chenilles ne l'habitent plus, il ne ſauroit être manié ſans riſque. Les poils de ces Chenilles pourroient donc tenir lieu de véſicatoires.

(2) †† On trouve en Hiver & au Printemps ſur les Pins, de très-nombreuſes ſociétés de Chenilles qui vivent auſſi en République pendant toute leur vie. Elles ne ſont pas ſi venimeuſes que les proceſſionnaires du Chêne ; mais on doit néanmoins éviter de les manier. Elles ſe conſtruiſent des nids de pure ſoie d'une grande blancheur, & qui égalent quelquefois en groſſeur la tête d'un Enfant. Les couches de ſoie, plus ou

moins nombreuſes, dont elles enveloppent les jeunes branches & les feuilles de l'Arbre, forment ces nids. Elles y pratiquent une principale ouverture pour l'entrée & la ſortie. Elles ſont de grandes proceſſionnaires : elles marchent toutes une à une & à la file dans le plus grand ordre. La file qui eſt ſouvent très-longue, eſt preſque par-tout continue. La Chenille qui eſt à la tete détermine les évolutions de toute la troupe. Tantôt elles défilent ſur une ligne droite, tantôt elles tracent des courbes plus ou moins irrégulieres, qui imitent quelquefois des guirlandes, d'autant plus agréables à l'œil, que toutes les parties de la guirlande ſont en mouvement & varient ſans ceſſe leurs aſpects. Elles s'éloignent du nid à de grandes diſtances, ſouvent par mille détours, & pourtant elles ſavent toujours le retrouver. On les voit revenir par les mêmes chemins ſans ſe détourner ni à droite ni à gauche. Quand pluſieurs de ces ſociétés s'avoiſinent, les guirlandes ou les cordons ſe multiplient, ſe dirigent en différens ſens, tracent une multitude de figures, & le ſpectacle en devient plus amuſant encore. Leur marche eſt aſſez lente, uniforme & preſque grave. On la diroit aſſujettie à une eſpece de tactique. Lorſque le tems de la métamorphoſe approche, elles ſe conſtruiſent des coques de ſoie ; mais non dans le nid même, comme les proceſſionnaires du Chêne : leur inſtinct eſt différent à cet égard : c'eſt dans la terre qu'elles vont les conſtruire ; & ces coques ne ſont pas auſſi fournies de ſoie proportionnellement, que le ſont les nids.

CHAPITRE XIX.

Procédé remarquable des Chenilles qui vivent en ſociété.

IL y a pluſieurs Eſpeces de ces Chenilles, qui ſont de vraies républicaines, & dont la diſcipline, les mœurs, le génie ſe diverſifient autant que ceux de différens Peuples. Il en eſt qui, comme quelques Sauvages, ſe conſtruiſent des branles ou des hamacs, dans leſquels elles prennent leurs repas, où elles paſſent même toute leur vie & ſe transforment (1). Il en eſt d'au-

(1) †† Ces Chenilles qui ſe tiennent dans des eſpeces de hamacs qu'elles ſavent ſe conſtruire, ſont au nombre des plus communes de nos Contrées. On les trouve au Printemps ſur les Pommiers & ſur divers Arbuſtes qui croiſſent dans les haies; tels que le Prunier ſauvage, le Fuſain, &c. Elles ne mangent que le parenchyme de la ſurface ſupérieure des feuilles; & ce qui eſt aſſez remarquable, leur corps ne touche jamais la feuille qu'elles rongent, comme s'il étoit trop délicat pour ſupporter cet attouchement. Il n'eſt au moins recouvert que d'une peau très-molle & douée d'une grande ſenſibilité. Pour peu qu'on touche ces Chenilles, elles avancent ou reculent en droite ligne dans leur hamac, avec une extrême vîteſſe. On eſt ſurpris de voir qu'elles ne ſe détournent ni à droite ni à gauche tandis qu'elles exécutent des mouvemens ſi prompts: mais on ceſſe de l'être dès qu'on vient à découvrir que chaque Chenille eſt logée dans une ſorte de très-longue gaîne à claire-voie, que l'œil ne

tres

tres qui vivent à la maniere des Arabes ou des Tartares, ſous des tentes qu'elles dreſſent dans les prairies, & quand elles ont conſumé toute l'herbe des environs de la tente, elles levent le piquet & vont camper ailleurs (2).

démêle pas, & qu'elle s'eſt elle-même filée. Tout le nid ou tout le hamac eſt formé d'un aſſemblage de ces gaînes couchées parallelement les unes ſur les autres, dans chacune deſquelles eſt renfermée une Chenille. Le nid enveloppe un certain nombre de menus jets ou de feuilles; & quand le parenchyme de toutes ces feuilles a été conſumé, les Chenilles vont tendre un autre hamac ſur les feuilles voiſines. Elles en tendent ainſi pluſieurs ſucceſſivement dans le cours de leur vie. On les prendroit au premier coup-d'œil pour des toiles d'Araignées. C'eſt dans le dernier que s'opere la métamorphoſe. Chaque Chenille s'y prépare en ſe renfermant dans une coque de pure ſoie. Toutes les coques ſont adoſſées les unes aux autres, & arrangées par paquets en maniere de gâteau. Je ne ſais s'il eſt néceſſaire à ces Chenilles, ou plutôt à leurs Chryſalides, d'avoir toujours la tête tournée en en-bas: mais toutes celles que j'ai examinées dans leurs coques affectoient cette ſituation.

(2) †† Je preſſois un peu trop la comparaiſon entre nos Chenilles & les Arabes. Elles ne levent pas proprement le piquet & n'emportent pas avec elles leur tente, comme les Arabes. Elles laiſſent en place celle qu'elles ont tendue ſur les herbes des prairies, dont elles ont achevé de conſumer les feuilles. Comme elles ſont de bonnes fileuſes, il leur en coûte peu de dreſſer une nouvelle tente ſur d'autres herbes qu'elles dévorent bientôt. Elles ſe conſtruiſent ainſi pendant le cours de l'Automne une ſuite de tentes, qui ſont des logemens ſuffiſans pour la ſaiſon. Mais quand l'Hiver approche, elles ſongent à ſe loger plus chaudement. Elles ſe renferment alors dans une ſorte de bourſe d'une toile forte, épaiſſe & opaque, où elles

Les nids que ſe conſtruiſent les Chenilles républicaines ſont pour elles de véritables retraites ; elles y ſont à l'abri des injures de l'air, & toutes s'y renferment dans les temps d'inaction ou de maladie. Mais elles en ſortent à certaines heures pour aller chercher leur nourriture. Elles vont ronger les feuilles des environs : elles les conſument de proche en proche. Souvent elles s'éloignent beaucoup de leur domicile & par différens détours. Cependant elles ſavent toujours le retrouver & s'y rendre au beſoin. Ce n'eſt pas la vue qui les dirige ſi ſûrement dans leurs marches ; cela eſt très-prouvé. La Nature leur a donné un autre moyen de regagner le gîte, & ce moyen revient préciſément à celui qu'employa Ariadne pour retirer du labyrinthe ſon cher Thésée. Nous pavons nos chemins ; nos Chenilles tapiſſent les leurs. Elles ne marchent jamais que ſur des tapis de ſoie. Tous les chemins qui aboutiſſent à leur nid, ſont couverts de fils de ſoie. Ces fils forment des traces d'un blanc luſtré, qui ont au moins deux à trois lignes de largeur. C'eſt en ſuivant à la file ces traces, qu'elles ne manquent point le gîte, quelque tortueux que ſoient les détours dans leſquels elles

paſſent la mauvaiſe ſaiſon dans un état d'engourdiſſement. Elles en ſortent dès le mois de Mars pour reprendre leur premier genre de vie.

s'engagent. Si l'on paſſe le doigt ſur la trace, l'on rompra le chemin, & on jettera les Chenilles dans le plus grand embarras. On les verra s'arrêter tout-à-coup à cet endroit, & donner toutes les marques de la crainte & de la défiance. La marche demeurera ſuſpendue, juſques à ce qu'une Chenille plus hardie ou plus impatiente que les autres, ait franchi le mauvais pas. Le fil qu'elle tend en le franchiſſant, devient pour une autre un pont ſur lequel elle paſſe. Celle-ci tend en paſſant un autre fil; une troiſieme en tend un autre, &c. & le chemin eſt bientôt réparé (3).

Les procédés induſtrieux des Inſectes, & en général des Animaux, s'emparent facilement de notre imagination. Nous nous plaiſons à leur prêter nos raiſonnemens & nos vues. Il y a bien loin du procédé des Chenilles républicaines, à celui de Thésée. Elles ne tapiſſent pas leurs chemins pour ne point s'égarer; mais elles ne s'égarent point, parce qu'elles tapiſſent leurs che-

(3) †† Ce fut ſur les Chenilles *livrées* que j'obſervai pour la premiere fois, en 1738, ce procédé remarquable, au moyen duquel les Chenilles qui vivent en ſociété, ſavent retrouver le chemin de leur nid. Je l'ai revu depuis dans d'autres Chenilles républicaines, & en particulier dans celles qui vivent ſur les Pins, dont j'ai parlé, Note 2 du Chap. XVIII. Il eſt commun, ſans doute, à toutes les Proceſſionnaires.

mins. Elles filent continuellement, parce qu'elles ont continuellement beſoin d'évacuer la matiere ſoyeuſe que la nourriture reproduit, & que leurs inteſtins renferment. En ſatisfaiſant à ce beſoin, elles aſſurent leur marche, ſans y ſonger, & ne le font que mieux. La conſtruction du nid eſt encore liée à ce beſoin. Son architecture l'eſt à la forme de l'Animal, à la ſtructure & au jeu de ſes organes, & aux circonſtances particulieres où il ſe trouve. Nous effleurons ici un des principes les plus généraux & les plus philoſophiques qu'on puiſſe former ſur les opérations des Brutes : nous y reviendrons.

CHAPITRE XX.

Queſtion.

LES ſociétés que nous venons de parcourir, ne devroient-elles point leur origine à cette circonſtance commune aux Chenilles qui les compoſent, de naître d'œufs dépoſés les uns auprès des autres ?

IL n'y a pas lieu de le ſoupçonner ; puiſque cette circonſtance ſe rencontre dans beaucoup d'Eſpeces de Chenilles, qui cependant ne travail-

lent point de concert aux mêmes ouvrages. Les Vers-à-ſoie en ſont un exemple très-familier. Il eſt vrai qu'ils demeurent volontiers raſſemblés dans le même lieu ; diſpoſition qui nous eſt très-avantageuſe ; mais les Individus de quantité d'autres Eſpeces ſe diſperſent après leur naiſſance pour ne ſe réunir jamais. Les Araignées nouvellement écloſes commencent par filer en commun, & finiſſent bientôt par ſe dévorer les unes les autres.

On eſt donc obligé de recourir ici à ce principe ou à cet inſtinct, en vertu duquel chaque Animal agit de la maniere la plus conforme à ſon bien-être ou à ſa deſtination (1).

(1) †† Mr. de Reaumur avoit déja touché à la queſtion que je propoſe dans ce Chapitre, & l'avoit décidée d'après ſes propres obſervations. Voici comment il s'exprime là-deſſus. „ Nos ſociétés de Chenilles ne ſont qu'une même famille, & „ ſont compoſées des Chenilles ſorties des œufs pondus par un „ même Papillon & dépoſés dans un même tas. On pourroit „ croire que c'eſt une regle générale pour les Chenilles qui „ ſortent d'œufs dépoſés les uns auprès des autres, que toutes „ celles qui naiſſent enſemble continuent d'y vivre. Mais ſi on „ ſuit les hiſtoires des Chenilles de diverſes Eſpeces, on re- „ connoîtra que ce n'eſt pas cette circonſtance qui décide de „ leur façon de vivre, que les unes naiſſent avec un eſprit de „ ſociété que les autres n'ont pas ". Notre Obſervateur le prouve par la comparaiſon de la Chenille nommée *à oreilles* avec la *Commune*. „ Les Papillons femelles des Chenilles de „ l'une & l'autre Eſpece, ajoute-t-il, arrangent leurs œufs avec

Il y auroit néanmoins une expérience curieuſe à tenter ſur ce ſujet : ce ſeroit de diſperſer les œufs du Papillon de la Chenille *commune*, de laiſſer vivre quelque temps en ſolitude les Chenilles qui en éclorroient, & de les raſſembler enſuite : l'on s'aſſureroit par ce moyen de l'influence de la circonſtance dont nous parlons. On pourroit encore tenter de former des ſociétés d'Individus d'Eſpeces différentes, & de réunir en un ſeul Corps pluſieurs ſociétés de même Eſpece, &c.

„ le même art, ils les raſſemblent dans un nid bien rembourré „ de poils, & bien couvert de poils par-deſſus. Les petites „ Chenilles qui ſortent des œufs du Papillon de la Commune, „ travaillant de concert aux mêmes ouvrages pendant la plus „ grande partie de leur vie, elles habitent enſemble ; au lieu „ que dès que les Chenilles à oreilles ſont nées & dès qu'elles „ ſont ſorties de leurs nids, elles ſe diſperſent, chacune de ſon „ côté ; elles ne travaillent en commun à aucun ouvrage ".

Et combien d'Eſpeces de Mouches qui naiſſent les unes auprès des autres, & qui ſe diſperſent au moment qu'elles éclo-ſent, tandis que les Guêpes, les Abeilles, les Fourmis, &c. forment des ſociétés nombreuſes qui travaillent en commun aux mêmes ouvrages !

CHAPITRE XXI.

Les ſociétés qui ont pour fin principale l'éducation des Petits.

COMME les Chenilles n'engendrent point qu'elles ne ſoient parvenues à l'état de Papillon, il ne s'agit point dans leurs ſociétés de l'éducation des Petits. Leur propre conſervation eſt l'unique fin de leur travail. Il regne parmi elles la plus parfaite égalité : nulle diſtinction de ſexes, & preſque nulle diſtinction de grandeur. Toutes ſe reſſemblent ; toutes ont la même part aux travaux : toutes ne compoſent proprement qu'une ſeule famille iſſue de la même Mere.

LES ſociétés des Fourmis, des Guèpes, des Abeilles ſont formées ſur des modeles bien différens. Ce ſont des républiques compoſées de trois ordres de Citoyens, qui ſe diſtinguent par le nombre, la grandeur, la figure & le ſexe. Les Femelles, ordinairement plus grandes & moins nombreuſes, tiennent le premier rang : les Mâles, d'une taille un peu moins avantageuſe, mais en plus grand nombre, forment le ſecond ordre : les *Mulets* ou les *Neutres*, privés de ſexe,

toujours plus petits & toujours plus nombreux, compoſent le troiſieme ordre (1).

(1) †† Mr. de GEER nous a fait connoître une Punaiſe champêtre qui vit en famille avec ſes Petits, & qui les conduit comme une Poule conduit ſes Pouſſins. On la trouve en Été ſur le Bouleau. Une Mere Punaiſe de cette Eſpece conduit trente ou quarante Petits. Elle ne les quitte point; & dès qu'elle ſe met à marcher, tous ſes Petits la ſuivent; & lorſqu'elle ſe fixe ſur quelque feuille de l'Arbre pour en pomper le ſuc, toute ſa Famille ſe raſſemble autour d'elle. Elle la promene ainſi de feuille en feuille, & de branche en branche. Cette Punaiſe, preſqu'auſſi vigilante qu'une Mere Poule, fait la garde auprès de ſes Petits, & leur prodigue ſes ſoins, tandis qu'ils ſont jeunes encore. „ Il m'arriva un jour, dit notre Obſervateur, de couper „ une branche de Bouleau, peuplée d'une telle Famille, & je „ vis d'abord la Mere fort inquiete battre ſans ceſſe des aîles „ avec un mouvement très-rapide, ſans cependant changer de „ place, comme pour écarter l'ennemi qui venoit de l'appro- „ cher, tandis que dans toute autre circonſtance elle ſe ſeroit „ d'abord envolée ou auroit tâché de s'enfuir; ce qui prouve „ qu'elle ne reſtoit là que pour la défenſe de ſes Petits. On „ obſerve que c'eſt principalement contre le Mâle de ſon Eſ- „ pece, que la Punaiſe Mere ſe trouve obligée de défendre ſes „ Petits, parce qu'il cherche à les dévorer par-tout où il les „ rencontre, & c'eſt alors qu'elle ne manque jamais de tâcher „ de les garantir de tout ſon pouvoir contre ſes attaques ".

CHAPITRE. XXII.

Les Fourmis.

QUELLE n'eſt point la merveilleuſe activité de ces Inſectes laborieux à raſſembler les matériaux qui doivent entrer dans la conſtruction de leur nid! Voyez comment ils ſavent ſe réunir & s'entr'aider pour excaver la terre, pour la charrier, pour tranſporter à leur habitation les brins d'herbe, les pailles, les fragmens de bois, & les autres corps de ce genre, qu'ils emploient dans leurs travaux. Ils ſemblent ne faire que les entaſſer pêle-mêle; mais cette ſorte de confuſion cache un art & un deſſein qu'on découvre dès qu'on cherche à le voir. Sous ce monticule qui eſt leur logement, & dont la forme facilite l'écoulement des eaux, ſe trouvent des galeries qui communiquent les unes avec les autres, & qui ſont comme les rues de la petite ville (1).

(1) †† Chez les Fourmis, comme chez les Abeilles, les Guêpes, &c. il y a de trois ſortes d'Individus; des Mâles, des Femelles, & des Neutres ou des Individus privés de ſexe. Ces trois ordres de Fourmis different par divers caracteres & en particulier par la taille. Les Femelles ſont les plus grandes; les Neutres ſont, en général, les plus petits, & les Mâles ſemblent tenir le milieu entre ces deux grandeurs. Les Individus diſtingués de ſexe ont quatre aîles; les Neutres en ſont toujours dé-

ON eſt ſur-tout frappé des ſollicitudes continuelles des Fourmis pour leurs Nourriſſons, des

pourvus. Il eſt ſingulier que vers l'arriere-ſaiſon les Individus aîlés perdent leurs aîles; c'eſt au moins ce qu'un bon Obſervateur (†) a remarqué ſur un grand nombre de ces Individus.

Les Neutres, beaucoup plus nombreux que les Mâles & les Femelles, ont été chargés ſeuls de tous les travaux de la fourmilliere: il en eſt donc encore à cet égard, des Fourmis comme des Abeilles & des Guêpes.

On a vu ci-deſſus (Part. IX, Chap. IX), que les Fourmis appartiennent à la claſſe des Inſectes, qui paſſent par l'état de *Nymphe:* après la derniere transformation, les Mâles & les Femelles ſortent de la fourmilliere, voltigent dans l'air, s'uniſſent de l'union la plus intime, & dès que les Femelles ont été fécondées, elles rentrent dans la fourmilliere pour y faire leur ponte. Les œufs ſont extrêmement petits, liſſes, blanchâtres, oblongs & membraneux. Il en éclot des Vers à tête écailleuſe, ſans jambes, toujours roulés ſur eux-mêmes, & qui ne changent preſque pas de place. Incapables de pourvoir par eux-mêmes à leur ſubſiſtance, ils ſont alimentés journellement par les tendres ſoins des Ouvrieres. Parvenus à leur parfait accroiſſement, ils ſe filent une coque de ſoie blanche, dans laquelle ils ſubiſſent la métamorphoſe. Ce ſont de pareilles coques que le Vulgaire prend pour les œufs des Fourmis, & que les Ouvrieres tranſportent de côté & d'autre au beſoin, & pour leſquelles elles montrent un ſi grand attachement. Elles n'en montrent pas moins pour les véritables œufs: ils ſont diſpoſés par tas, & quand on les diſperſe, elles les raſſemblent de nouveau avec une extrême diligence.

La coque que ſe file le Ver, eſt très-néceſſaire à la conſervation de la Nymphe: elle prévient un trop prompt deſſéchement qui expoſeroit la vie de celle-ci. Ce n'eſt point la Nymphe elle-même qui perce cette coque pour venir au jour: le

(†) Mr. de GEER.

ſoins qu'elles prennent de les tranſporter à propos d'une place dans une autre, de les nourrir, & de leur faire éviter tout ce qui pourroit leur

ſoin de la percer a été encore confié aux laborieuſes Ouvrieres. Si on la perce avant le temps, la Nymphe périt : les Ouvrieres connoiſſent donc le moment où il convient d'ouvrir la coque. Mais les Nymphes de toutes les Eſpeces de Fourmis, n'ont pas beſoin pour venir à bien, d'être renfermées dans des coques : il en eſt dont les Nymphes demeurent toujours à découvert, parce que les Vers ne ſe filent jamais d'enveloppes.

Les Vers & les Nymphes demandent à être tenus dans une température qui ne ſoit ni trop ſeche ni trop humide : les Ouvrieres, qui paroiſſent le ſavoir, ſe conduiſent en conſéquence. Tantôt elles apportent leurs Nourriſſons à la ſurface de la fourmilliere pour les expoſer au ſoleil ou au grand air, tantôt elles les rapportent dans l'intérieur, toujours un peu humide, ſoit pour prévenir leur deſſéchement, ſoit pour les mettre à l'abri du froid. Elles les élevent ou les abaiſſent ainſi dans leurs ſouterreins, ſuivant que les circonſtances l'exigent.

Il paroit que les Fourmis alimentent leurs Petits à la maniere des Guêpes, en leur dégorgeant la nourriture qu'elles ont elles-mêmes digérée, & qui ſe montre au-dehors ſous l'aſpect d'une liqueur viſqueuſe. Mais lorſqu'elles demeurent privées d'alimens, leur affection pour les Petits ſe change en cruauté, & elles les dévorent.

J'ai dit qu'il eſt des Fourmis dont les Vers ne ſe conſtruiſent point de coques & ſe transforment à nud. M. de GEER nous fait connoître une Eſpece de ces Inſectes laborieux, qui nous offre en ce genre une ſingularité bien remarquable : une partie des Individus ſe renferme dans des coques pour y ſubir la métamorphoſe, tandis qu'une autre partie néglige cette précaution & ſe transforme à découvert. L'enveloppe de ſoie n'eſt donc pas auſſi néceſſaire aux Nymphes de cette Eſpece, qu'elle paroît l'être à celles de quelques autres.

nuire. On admire la promptitude avec laquelle elles les ſouſtraiſent au danger, & le courage avec lequel elles les défendent. On a vu une Fourmi partagée par le milieu du Corps, tranſporter les uns après les autres huit ou dix de ſes Nourriſſons. Enfin, elles ont ſoin encore d'entretenir autour d'eux le degré de chaleur qui leur convient.

Elles vont chercher au loin leurs alimens & leurs proviſions. Différens chemins, aſſez ſouvent fort tortueux, aboutiſſent à la fourmilliere. Les Fourmis les ſuivent à la file, & ne s'égarent point, non plus que les Chenilles républicaines. Comme ces dernieres, elles laiſſent des traces par tout où elles paſſent. Ces traces ne ſont pas ſenſibles aux yeux; elles le ſeroient plutôt à l'odorat: on ſait que les Fourmis ont une odeur pénétrante. Quoi qu'il en ſoit, ſi l'on paſſe le doigt à pluſieurs repriſes ſur un mur le long duquel des Fourmis montent & deſcendent à la file, on les arrêtera tout court, & on s'amuſera quelque temps de leur embarras. Il en ſera de ces proceſſions de Fourmis comme je l'ai raconté de celles des Chenilles.

La prévoyance des Fourmis a été fort célébrée. L'on répete depuis près de trois mille ans,

qu'elles amaſſent des proviſions pour l'Hiver; qu'elles ſavent ſe conſtruire des magaſins où elles renferment les grains qu'elles ont recueillis pendant la belle ſaiſon. Ils leur ſeroient très-inutiles, ces magaſins; elles dorment tout l'Hiver, comme les Marmottes, les Loirs, & bien d'autres Animaux. Un degré de froid aſſez médiocre ſuffit pour les engourdir. Que feroient-elles donc de ces prétendus magaſins? auſſi n'en conſtruiſent-elles point. Les grains qu'elles charrient avec tant d'activité à leur domicile, ne ſont point du tout pour elles des proviſions de bouche; ce ſont de ſimples matériaux qu'elles font entrer dans la conſtruction de leur édifice, comme elles y font entrer des brins de bois, des pailles, &c. Les faits atteſtés par l'antiquité la plus vénérable, ont donc encore beſoin de l'œil de l'Obſervateur, & de la Logique du Philoſophe (2).

(2) †† Mr. de GEER nous apprend, qu'ayant interrogé par Lettre Mr. de REAUMUR ſur cette multitude de petits corps légers que les Fourmis charrient avec tant d'activité, ce grand Obſervateur lui avoit fait la réponſe ſuivante: *Je ne crois pas qu'il y faille entendre aucun myſtere. Il n'eſt point de petit corps que quelques Eſpeces de Fourmis ne mettent en œuvre: petits fragmens de bois, petits fragmens de feuilles & de tiges de Plantes, graines de divers fruits, petites pierres, tout ce qu'elles peuvent tranſporter leur eſt bon lorſqu'il eſt ſous leur main. J'ai vu de petites fourmillieres conſtruites entiérement de*

grains d'orge, dont les Fourmis n'avoient pas envie de tâter pour ſe nourrir.

Le célebre Obſervateur Suédois tranſcrivoit ce fragment de ſon illuſtre Correſpondant, à l'occaſion d'une récolte de réſine que certaines groſſes Fourmis vont faire ſur les Pins de la Suede, & qu'elles tranſportent par petits morceaux dans leur habitation avec des brins d'écorce & des feuilles ſeches, pour en épaiſſir de plus en plus la couverture hémiſphérique. Il s'étoit bien aſſuré de ſon côté, que cette réſine ne leur ſervoit point de nourriture. „ Les véritables alimens, dit-il, que je „ leur ai vu ramaſſer, & avec leſquels je les ai vu deſcendre „ le long des Arbres & porter dans leurs nids, c'étoient de „ petits Inſectes, comme des Mouches, des Vers, de petites „ Chenilles qu'elles avoient pu attraper. Je les ai vu auſſi „ avaler avec avidité les gouttes d'eau que je mettois à leur „ portée ".

On ſait que les Fourmis diſſequent avec toute l'adreſſe d'un Anatomiſte, les cadavres qu'elles viennent à rencontrer : elles en enlevent toutes les parties molles ou charnues, & n'y laiſſent que les parties tendineuſes & oſſeuſes. Mais les Fourmis ne ſont pas ſeulement carnivores, elles ſont encore frugivores ; & l'on n'ignore pas combien elles ſont avides de fruits & de liqueurs ſucrées.

Ainſi que les Abeilles, les Fourmis ont eu bien plus de Romanciers que d'Hiſtoriens, & l'hiſtoire des unes & des autres a été également gâtée par l'amour du merveilleux. Les Voyageurs & les Écrivains d'Hiſtoire naturelle, qui les ont copiés & qui ſe ſont copiés les uns les autres, nous ont repréſenté les marches ou les expéditions des Fourmis comme celles des armées les mieux diſciplinées. Il leur ont donné des Généraux, des Maréchaux des Logis, des Pourvoyeurs, des Coureurs, &c. Ils nous ont débité que ces Coureurs étoient chargés d'aller à la découverte, & que lorſqu'ils avoient fait rencontre de quelques groſſes victuailles qu'ils ne pouvoient tranſporter eux-mêmes à la fourmilliere, ils revenoient auſſi-tôt en donner avis à la troupe, qui envoyoit ſur-le-champ des détachemens pour

s'emparer du butin. Je n'acheve pas ce petit roman ; il vaut mieux que je diſe tout ſimplement à quoi tout cela ſe réduit. Pour l'ordinaire les Fourmis ſuivent aſſez conſtamment les ſentiers qui conduiſent à leur habitation ; mais il arrive ſouvent, qu'attirées par certaines odeurs ou par d'autres ſenſations à nous inconnues, elles quittent les routes battues pour s'en frayer de nouvelles de côté & d'autre. Si une Fourmi qui enfile une de ces nouvelles routes, eſt conduite par haſard à quelques victuailles, elle en détachera un fragment qu'elle emportera dans la fourmilliere. Mais la Fourmi qui a fait cette heureuſe découverte, laiſſe des traces ſur ſon paſſage, qui indiquent ſa route : ces traces ſont bientôt reconnues par d'autres Fourmis qui ne manquent point de les ſuivre : la nouvelle route eſt de plus en plus fréquentée, & en peu de temps de nombreuſes troupes arrivent au lieu de la découverte & ſe jettent ſur le butin. C'eſt ainſi qu'une ſeule Fourmi peut déterminer un grand nombre de ſes Compagnes à ſe rendre dans un certain lieu, ſans qu'il ſoit beſoin de lui prêter un langage particulier, au moyen duquel elle leur annonce la découverte qu'elle vient de faire. Il ſuffit d'admettre qu'un inſtinct naturel porte tous les Individus de la même Société à ſuivre les traces que tous laiſſent ſur leur paſſage. Il y a une foule de pareils faits que nous préſente l'hiſtoire des Animaux, qui s'expliquent heureuſement par des moyens analogues & auſſi ſimples, & qu'on ſemble vouloir rendre inexplicables par le faux merveilleux dont on ſe plaît à les ſurcharger. Il y a aſſez de vrai merveilleux dans les procédés induſtrieux des Animaux, pour qu'un Écrivain ſoit très-ſûr d'intéreſſer les Lecteurs judicieux en les peignant au naturel.

Nous avons à regretter que le célebre LYONET n'ait pas été lui-même témoin des curieux procédés de certaines Fourmis des Indes orientales, qu'il ne nous raconte que ſur le témoignage de Perſonnes qu'il aſſure *être dignes de foi*. Je tranſcrirai le fait dans ſes propres termes. „ Ces Fourmis, dit-il, ne marchent jamais à découvert ; mais elles ſe font toujours des „ chemins en galerie pour parvenir là où elles veulent être.

„ Lorſqu'occupées à ce travail elles rencontrent quelque corps
„ ſolide qui n'eſt pas pour elles d'une dureté impénétrable,
„ elles le percent & ſe font jour au travers. Elles font plus:
„ par exemple, pour monter au haut d'un pilier, elles ne cou-
„ rent pas le long de ſa ſuperficie extérieure; elles y font un
„ trou par le bas, elles entrent dans le pilier même, & le
„ creuſent juſqu'à ce qu'elles ſoient parvenues au haut. Quand
„ la matiere, au travers de laquelle il faudroit ſe faire jour,
„ eſt trop dure, comme le ſeroient une muraille, un pavé de
„ marbre, &c. elles s'y prennent d'une autre maniere. Elles
„ ſe font le long de cette muraille ou ſur ce pavé, un chemin
„ voûté, compoſé de terre, liée par le moyen d'une humeur
„ viſqueuſe, & ce chemin les conduit où elles veulent aller.
„ La choſe eſt plus difficile lorſqu'il s'agit de paſſer ſous un
„ amas de corps détachés. Un chemin qui ne ſeroit que voûté
„ par-deſſus, laiſſeroit par-deſſous trop d'intervalles ouverts,
„ & formeroit une route trop raboteuſe, cela ne les accom-
„ moderoit pas; auſſi y pourvoient-elles, mais c'eſt par un plus
„ grand travail. Elles ſe conſtruiſent alors une eſpece de tube,
„ un conduit en forme de tuyau, qui les fait paſſer par-deſſus
„ cet amas en les couvrant de toutes parts. Une Perſonne qui
„ m'a confirmé tous ces faits, m'a dit avoir vu elle-même,
„ que des Fourmis de cette Eſpece ayant pénétré dans un
„ Magaſin de la Compagnie des Indes orientales, au bas duquel
„ il y avoit un tas de cloux de Giroffle qui alloit juſqu'au
„ plancher, elles s'étoient fait un chemin creux & couvert qui
„ les avoit conduites par-deſſus ce tas, ſans le toucher, au
„ ſecond étage, où elles avoient percé le plancher & gâté en
„ peu d'heures pour pluſieurs milliers en étoffes des Indes, au
„ travers deſquelles elles s'étoient fait jour. Des chemins d'une
„ conſtruction ſi pénible, ſembient devoir coûter un temps ex-
„ ceſſif aux Fourmis qui les font. Il leur en coûte pourtant
„ beaucoup moins qu'on ne croiroit. L'ordre avec lequel une
„ grande multitude y travaille, fait avancer la beſogne. Deux
„ grandes Fourmis, qui ſont apparemment deux Femelles, ou
„ peut-être deux Mâles, puiſque les Mâles & les Femelles ſont

„ ordinairement

„ ordinairement plus grandes que les Fourmis du troiſieme ordre ;
„ deux grandes Fourmis, dis-je, conduiſent le travail & mar-
„ quent la route. Elles ſont ſuivies de deux files de Fourmis
„ ouvrieres, dont les Fourmis d'une file portent de la terre, &
„ celles de l'autre une eau viſqueuſe. De ces deux Fourmis les
„ plus avancées, l'une poſe ſon morceau de terre contre le
„ bord de la voûte ou du tuyau du chemin commencé : l'autre
„ détrempe ce morceau, & toutes deux le pêtriſſent & l'atta-
„ chent contre le bord du chemin. Cela fait, ces deux ren-
„ trent, vont ſe pourvoir d'autres matériaux & prennent en-
„ ſuite leur place à l'extrémité poſtérieure des deux files.
„ Celles qui après celles-ci étoient les premieres en rang,
„ auſſi-tôt que les premieres ſont rentrées, dépoſent pareille-
„ ment leur terre, la détrempent, l'attachent contre le bord
„ du chemin, & rentrent pour chercher de quoi continuer
„ l'ouvrage. Toutes les Fourmis qui ſuivent à la file, en font
„ de même, & c'eſt ainſi que pluſieurs centaines de Fourmis
„ trouvent toutes moyen de travailler dans un eſpace fort étroit,
„ ſans s'embarraſſer, & d'avancer leur ouvrage avec une vîteſſe
„ ſurprenante ".

Ce ne ſont que les Fourmis des grandes Eſpeces qui élevent au-deſſus de leurs ſouterreins un monticule arrondi, dont la baſe a quelquefois deux à trois pieds de diametre, & qui eſt formé de l'entaſſement d'une multitude preſqu'infinie de petits corps légers, qu'elles charrient continuellement avec une adreſſe & une activité ſurprenantes. En même temps que cette couverture en maniere de dôme facilite l'écoulement des eaux, elle entretient une certaine chaleur dans les galeries, & procure aux Fourmis une terraſſe commode & agréable, où elles aiment à ſe raſſembler, & où elles expoſent leurs Nourriſſons aux douces influences du Soleil & du plein air. De petites ouvertures ménagées çà & là ſur cette ſorte de terraſſe, ſont autant de portes qui communiquant avec les galeries ſouterreines, permettent aux Fourmis d'y rentrer & d'en reſſortir à volonté. Si l'on renverſe le monticule & qu'on en diſperſe au loin les matériaux, les laborieuſes & diligentes Ouvrieres s'empreſſeront

à les raſſembler de nouveau & à en former un monticule pareil au premier.

Mais les Fourmis des petites Eſpeces ne ſe logent pas à ſi grands frais : le deſſous d'une pierre, un trou d'Arbre, l'intérieur d'un fruit deſſéché ou tout autre corps caverneux leur fournit un domicile convenable & dont elles ſavent profiter. Il en eſt néanmoins qui s'établiſſent dans la terre, & que la Nature a condamnées à un aſſez grand travail. Elles ont à creuſer des ſouterreins de pluſieurs pouces de profondeur, ou des eſpeces de boyaux, ſouvent fort tortueux, qui vont aboutir à la ſurface du terrein. Elles ont donc beaucoup à excaver ; & elles s'occupent de ce travail pénible avec un ſoin, une diligence & une aſſiduité qui attachent fortement le Spectateur.

Je ferai encore remarquer, qu'il eſt dans nos Contrées une très-groſſe Fourmi noire, qui n'amaſſe point de matériaux pour en former un monticule ; mais qui ſe niche dans l'intérieur des vieux arbres, ou dans les bois pourris, qui les creuſe ſans relâche avec ſes fortes pinces, en détache des tas de ſciure, & s'y pratique des logemens ſpacieux.

Je prolongerois beaucoup cette Note ſi je touchois à ce que divers Écrivains nous racontent des fameuſes Fourmis *de viſite* de Surinam ; des Fourmis de Guinée, qui ſe conſtruiſent avec une terre maſtiquée des huttes de pluſieurs pieds d'élévation, & à pluſieurs logemens ; des Fourmis du Pégu qu'on aſſure produire la Lacque, &c. &c. La plupart de ces faits demanderoient à être vérifiés par de meilleurs Obſervateurs que ceux auxquels nous les devons. Il n'eſt pas même bien ſûr que tous les Inſectes que les Voyageurs ont pris pour des Fourmis & dont ils nous rapportent les procédés, en fuſſent réellement. Il eſt des Mouches qui reſſemblent beaucoup aux Fourmis, & qui ont pu quelquefois les induire en erreur.

CHAPITRE XXIII.

Les Guêpes ſouterraines.

UNE république de Guêpes, quelque nombreuſe qu'elle ſoit, doit ſa naiſſance à une ſeule Mere. Celle-ci ſans aucune aide, perce la terre au Printemps, & y pratique une cavité, dans laquelle elle conſtruit un petit gâteau, qui eſt un aſſemblage de cellules héxagones, dont les ouvertures ſont tournées verticalement en en-bas. Dans chaque cellule, elle pond un œuf de *Neutres*, c'eſt-à-dire, de Guêpes-ouvrieres; car chez les Guêpes, comme chez les Abeilles, les Neutres ſont chargés du gros des ouvrages: il convenoit donc ici qu'ils nâquiſſent les premiers, afin de ſoulager la Mere dans ſes travaux. Ils le font en effet, dès que par ſes ſoins infatigables ils ſont parvenus de l'état de Ver à l'état de Mouche. Ils ſe mettent à conſtruire de nouveaux gâteaux attachés au premier & les uns aux autres par de petits ſupports en maniere de colonnes (1).

(1) †† Les Petits des Guêpes ſouterreines demandoient à avoir toujours la tête tournée en en-bas: les cellules qui leur ſervent de berceaux, ſont diſpoſées en conſéquence. Tous les gâteaux du guêpier ſont donc paralleles à l'horiſon, & toutes

DES œufs de Femelles, de Mâles & de Neutres ſont dépoſés dans les cellules de ces gâteaux par la Mere-Guêpe, & les Petits qui en éclo-ſent, ſont élevés par les Neutres (2). Deve-

les cellules ont leur ouverture tournée en en-bas. Le guêpier eſt ainſi un petit édifice à pluſieurs étages; & comme ſa forme eſt ovale, on comprend que les étages du milieu ont plus d'étendue que ceux des extrémités. Le nombre de ces étages eſt d'environ douze à quinze dans les grands guêpiers. Entre chaque étage regne une colonnade qui lie le gâteau inférieur au ſupérieur. La hauteur des étages eſt proportionnée à la taille des Habitans. La partie ſupérieure de chaque gâteau eſt un plancher ſur lequel ils marchent commodément; car les cellules n'ont pas un fond pyramidal comme celles des Abeilles; le leur n'eſt que légérement arrondi. L'ouvrage de nos Guêpes n'eſt donc pas ſi géométrique que celui des Abeilles, & ne devoit pas l'être. Chaque gâteau ne devoit porter qu'un ſeul rang de cellules, pour qu'elles euſſent toutes leur ouverture tournée en en-bas. Le nombre des cellules d'un guêpier va à plus de ſeize mille. Il y en a de trois grandeurs qui répondent à la diverſité de taille des trois ordres d'Individus. Les plus grandes ſont deſtinées aux Vers qui doivent devenir des Guêpes-femelles: les plus petites ſont deſtinées aux Vers qui deviendront des Neutres. Celles-ci ne ſe trouvent jamais mêlées dans le même gâteau avec des cellules de Mâles ou de Femelles; mais elles occupent en entier un même gâteau. Il n'en va pas ainſi des autres; on les trouve ſouvent diſtribuées enſemble dans le même gâteau.

(2) †† Ce ne ſont pas les ſeuls Neutres qui ont été chargés de l'éducation des Petits, un bon nombre de Femelles partagent auſſi ces ſoins. Il n'en eſt donc pas à cet égard de la république des Guêpes comme de celle des Abeilles, où il n'y a qu'une ſeule Femelle uniquement occupée à pondre. Chez les

nus Mouches dans leur temps, les Femelles & les Neutres s'occupent à étendre la ville naiſſante : les Mâles ne prennent point de part à ce

Guêpes il y a pluſieurs centaines de Femelles & à-peu-près autant de Mâles. Ces Mâles ne ſont pas non plus auſſi pareſſeux que ceux des Abeilles : ils ont de petites fonctions dont ils s'acquittent très-bien : ils aident aux Ouvrieres à nettoyer les gâteaux & à tranſporter les cadavres hors de l'habitation : ſi ceux-ci ſont trop gros, ils les partagent & les charrient par morceaux.

On ſait que les Guêpes ſont frugivores & carnivores : elles recherchent avec avidité les fruits qui abondent en liqueurs ſucrées, elles font une guerre cruelle aux Mouches & ſur-tout aux laborieuſes Abeilles, dont elles emportent le ventre pour ſe ſaiſir du miel qu'il recele. Elles ſavent auſſi ſe pourvoir de chair dans nos boucheries & dans nos offices. Elles en coupent des morceaux quelquefois auſſi gros qu'elles, & les tranſportent dans leur guêpier, où ils ſont diſtribués à leurs Compagnes & à leurs Petits.

Il y a lieu de penſer que les Femelles & les Ouvrieres proportionnent la qualité de la nourriture à l'âge des Petits. On obſerve qu'elles n'adminiſtrent qu'une ſorte de liqueur aux plus jeunes, & qu'elles donnent des nourritures ſolides aux plus âgés. Elles leur diſtribuent la béquée à la maniere des Oiſeaux, en la leur dégorgeant dans la bouche, après l'avoir digérée en partie. On voit les Petits s'avancer hors de la cellule & ouvrir la bouche pour la recevoir. On peut même les élever, pour ainſi dire, à la brochette comme les Oiſeaux. Quand ils n'ont plus à croître, ils ferment eux-mêmes leur cellule avec un couvercle de ſoie, & s'y transforment bientôt en Nymphes.

Mais ces mêmes Guêpes qui montrent en Été tant d'affection pour leurs Nourriſſons, & qui en prennent un ſi grand ſoin, les maſſacrent tous impitoyablement à l'approche des premiers froids. On s'étonneroit d'une telle barbarie ſi l'on ne ſavoit

travail ; leur principale fonction eſt de féconder les jeunes Femelles. Ils ſont pourtant encore chargés, juſqu'à un certain point, de pourvoir à la ſubſiſtance des jeunes Nourriſſons. La petite république augmente ainſi de jour en jour ; & vers la fin de l'Eté elle eſt déja une grande ville peuplée de pluſieurs milliers d'Habitans. Le guêpier a communément alors 15 à 16 pouces de longueur, ſur 12 à 13 de largeur. Les gâteaux ſont recouverts d'une épaiſſe enveloppe de la même matiere que celle dont ils ſont eux-mêmes compoſés ; ſavoir, d'une eſpece de papier, fait

que ces premiers froids qui tuent le plus grand nombre des Guêpes, tueroient infailliblement les Petits beaucoup plus délicats que leurs Meres-nourrices. Elles abregent donc leurs ſouffrances en les mettant à mort.

Ainſi le guêpier n'eſt plus qu'un cimetiere à la fin de l'Automne : quelques Femelles ſeulement échappent à la mortalité générale. Elles demeurent engourdies tout l'Hiver ſans prendre aucune nourriture, & au retour du Printemps chacune d'elles peut devenir la fondatrice d'une nouvelle république. Elle jette ſous terre les fondemens d'un nouveau gâteau, & les œufs qu'elle ne tarde pas à y pondre, ſont tous prolifiques, parce qu'elle a été fécondée par un Mâle à la fin de l'Été ; car les amours des Guêpes ne ſont pas équivoques comme ceux des Abeilles, & il eſt bien prouvé par les obſervations de leur plus illuſtre Hiſtorien (†), qu'elles s'accouplent comme la plupart des Mouches.

(†) Mr. de REAUMUR.

de vieux bois; & cette enveloppe eſt comme l'enceinte de la ville (3).

(3) †† Ce ſont de grandes Mineuſes que les Guêpes dont j'eſquiſſe l'hiſtoire; elles entendent à merveille à excaver la terre & à y pratiquer un ſouterrein ſpacieux pour y loger commodément leur guêpier. Quelquefois néanmoins elles trouvent le moyen de retrancher beaucoup de ce rude travail en profitant habilement des ſouterreins que ſe creuſe la Taupe. Une galerie plus ou moins longue & plus ou moins tortueuſe conduit à la porte de la petite ville ſouterreine; c'eſt un chemin battu que les Habitans ſavent toujours retrouver & dont l'entrée imite celle d'un clapier de Lapin.

Cette grande cavité que les Guêpes ſe creuſent à un pied ou un pied & demi ſous terre, eſt très-propre à les mettre à couvert des inſultes de leurs ennemis, & à les dérober aux regards des Curieux; mais elle n'eſt pas la vraie enveloppe des gâteaux; je veux dire, qu'ils ne ſont pas appuyés immédiatement contre les parois de la cavité. L'architecture de nos Guêpes n'eſt point auſſi ſimple, & ſuppoſe des vues qui, pour être remplies, exigent un travail d'un tout autre genre & qu'on admire dès qu'on vient à le découvrir. L'eau des pluies, qui perce peu-à-peu la terre, pénétreroit enfin juſqu'aux gâteaux, & les Guêpes ont un grand intérêt à prévenir cet accident. Elles ont donc été inſtruites à donner à leurs gâteaux une enveloppe particuliere qui les préſerve de l'humidité. Elle eſt compoſée d'une multitude de petites voûtes poſées les unes au-deſſus des autres & les unes à côté des autres, & qui forment enſemble une enceinte d'environ un pouce & demi d'épaiſſeur. Quoique toutes les petites voûtes ne ſoient que d'un papier gris aſſez fin, elles ne laiſſent pas de répondre très-bien au but par leur ingénieuſe conſtruction. On ſent d'abord que l'humidité qui pénétreroit quelques-unes des voûtes ſupérieures ſeroit arrêtée par les voûtes inférieures bien mieux qu'elle ne le ſeroit par un ſimple maſſif de même épaiſſeur; & cela préciſément parce que les

couches de papier n'étant pas appliquées immédiatement les unes aux autres, les intervalles qui reſtent entr'elles s'oppoſent aux progrès de l'humidité & en facilitent encore l'évaporation.

Les cellules & les colonnes ſont faites de la même matiere que les voûtes. Les Guêpes ne bâtiſſent qu'en papier. Elles ont poſſédé de tout temps l'art de le fabriquer, & les Hommes auroient pu apprendre d'elles, il y a bien des ſiecles, ces procédés ſi utiles dont nos Modernes ſe glorifient. C'eſt ſur les vieux bois qui ont été long-temps expoſés à l'action du Soleil & de la pluie, & qui ont été, en quelque ſorte, rouis, que nos induſtrieuſes Mouches vont ſe pourvoir de la matiere dont elles fabriquent leur papier. Avec leurs dents tranchantes elles en détachent de menus filamens, qu'elles mettent en charpie, & qu'elles réduiſent peu-à-peu en pâte molle en les broyant & les humectant dans leur bouche. Elles en forment des pelotes arrondies, qu'elles tranſportent dans leur habitation. Elles les étendent en lames minces en s'aidant de leurs dents & de leurs jambes, & c'eſt d'un nombre prodigieux de ces lames qu'elles conſtruiſent ces jolis ouvrages où brille tant d'induſtrie. Je riſquerai peut-être de paſſer moi-même pour un Romancier ſi j'ajoute, que nos ingénieux Architectes ont attention de donner aux colonnes beaucoup plus de ſolidité qu'au reſte de l'ouvrage, & qu'elles ont ſoin d'en élargir la baſe & le chapiteau pour qu'elles puiſſent mieux embraſſer les parties de l'édifice qu'elles ont à ſoutenir.

CHAPITRE XXIV.

Les Frêlons & quelques autres Eſpeces de Guêpes.

†LES Frêlons, qui appartiennent au genre des Guêpes & qui les ſurpaſſent toutes en grandeur, ne poſſedent pas au même degré que les Guêpes ſouterraines, l'art de fabriquer du papier avec des fragmens de vieux bois. Le leur eſt groſſier, épais & fort caſſant. Il n'eſt fait que de ſciure de bois pourri, dont il retient la couleur. L'architecture des Frêlons reſſemble d'ailleurs beaucoup à celle des Guêpes qui bâtiſſent ſous terre; mais les colonnes qui ſoutiennent les gâteaux ſont plus hautes & plus maſſives, & celle du milieu ſurpaſſe toutes les autres en groſſeur. Les Frêlons recouvrent auſſi leurs gâteaux d'une enveloppe de papier, à laquelle ils donnent d'abord la forme d'une cloche ou d'un chapiteau arrondi. Ils ſuſpendent leur guêpier dans des greniers, dans de vieilles maſures, & le plus ſouvent dans de vieux troncs d'Arbres dont ils agrandiſſent la cavité à l'aide de leurs fortes tenailles, auxquelles le bois ne ſauroit réſiſter.

MAIS toutes les Guêpes ne cachent pas leur nid comme les Guêpes ſouterraines & les Frêlons : il eſt de petites Eſpeces de ces Mouches induſtrieuſes, qui bâtiſſent à découvert. Toutes ne forment que des Sociétés peu nombreuſes, qu'il eſt facile d'obſerver. Elles attachent leur nid à une menue branche d'Arbre ou d'Arbuſte ; & le papier dont il eſt fait n'eſt pas moins fin que celui des Guêpes ſouterraines : il en a auſſi la couleur : la pluie pénétreroit donc facilement dans ſon intérieur, ſi nos adroites Ouvrieres ne prenoient point de précautions pour l'en garantir. Les procédés de toutes les Eſpeces ne ſont pas les mêmes à cet égard ; mais tous répondent bien à la fin. Les unes recouvrent leur guêpier d'un très-grand nombre de feuilles de papier, qui laiſſent entr'elles des intervalles, & qui imiteroient parfaitement les pétales d'une roſe ſi elles en avoient les belles couleurs. Ce ſont les plus jolis ouvrages que ces petits guêpiers qui imitent ſi bien une roſe à cent feuilles. D'autres Guêpes, qui ne ſavent pas donner une enveloppe à leurs guêpiers, y ſuppléent très-bien en les attachant à la branche, de maniere que le plan du gâteau eſt à-peu-près vertical : l'axe des cellules eſt ainſi horiſontal & la pluie ne pénetre pas dans leurs ouvertures. Mais nos petits Architectes ne ſe bornent pas à

cette ſeule précaution : ils ont ſoin encore de tourner vers le nord ou vers l'eſt la face du gâteau où ſe trouvent les ouvertures des cellules ; & ce qui eſt plus conſtant & plus remarquable, ils enduiſent le guêpier d'un vernis impénétrable à l'eau.

CHAPITRE XXV.

Les Guêpes cartonnieres.

† LES Guêpes de nos Contrées, qui excellent le plus dans l'art de fabriquer le papier, ne nous paroîtront que des Apprentiſſes ſi nous les comparons aux Guêpes *cartonnieres* du nouveau Monde, dont les ouvrages en ce genre ne le cedent point en beauté à ceux de nos plus habiles Ouvriers. Le nom qui a été donné à ces Guêpes ſi ſinguliérement induſtrieuſes, indique déja qu'elles ne travaillent qu'en carton (1). Il faut que je le répete ; celui qu'elles ſavent fabriquer a une blancheur, une force & un poli qu'on ne ſe laſſe point d'admirer. Nos habiles Ouvrieres n'excellent pas moins dans l'art de bâtir ou d'employer leur carton, que dans celui

(1) Ces Mouches portent auſſi le nom de *Guêpes de Cayenne.*

de le fabriquer. Elles conſtruiſent elles-mêmes la ruche où elles logent leurs gâteaux ; & cette ruche eſt une ſorte de boîte de carton en forme de cloche, plus ou moins alongée ou plus ou moins évaſée, qu'elles ſuſpendent ſolidement par ſon extrémité ſupérieure à une branche d'Arbre. Il eſt de ces cloches qui ont plus d'un pied & demi de longueur. L'ouverture de la cloche eſt fermée par un couvercle convexe du même carton ; mais les Guêpes ménagent ſur un des côtés du couvercle, une petite ouverture ronde qui eſt la ſeule porte de la ruche. Les gâteaux qui en occupent l'intérieur ſont diſtribués par étages comme ceux de nos Guêpes ſouterraines : mais ils ne ſont point ſoutenus par des colonnes : ils ſont corps avec la boîte & tiennent immédiatement à ſes parois. Ce n'eſt point ſimplement le fond des cellules qui forme le plancher ou la partie ſupérieure du gâteau ſur laquelle les Guêpes ſe promenent ; elles conſtruiſent un vrai plancher très-uni, ſous lequel elles bâtiſſent les cellules, dont les ouvertures ſont ainſi tournées en en-bas. Les planchers ou les gâteaux ne ſont pas plans ; ils ont en deſſous la même convexité que le couvercle qui ferme la boîte. On aime à découvrir la raiſon de cette convexité : chaque plancher ou chaque gâteau a été lui-même un couvercle ; car nos prudentes Cartonnieres

veulent que la boîte ſoit toujours fermée quand elles travaillent à la conſtruction des cellules. Repréſentez-vous cette boîte lorſqu'elle ne contient encore que deux gâteaux : elle eſt fort courte, & les Guêpes vont travailler à la prolonger & à augmenter le nombre des gâteaux. Pour y parvenir, elles prolongent les bords de la boîte ; là font deſcendre par de-là le couvercle, & contre le bord inférieur de la partie prolongée, elles conſtruiſent un nouveau couvercle convexe par-deſſous, comme le précédent qui n'eſt plus à préſent un couvercle ; mais qui eſt devenu un nouveau plancher ſous lequel les Guêpes vont bâtir de nouvelles cellules. Ce plancher conſerve l'ouverture ronde qui étoit auparavant la porte de la ruche, & qui ſert maintenant de porte de communication d'un étage à l'autre. Chaque étage a ainſi ſa porte, parce que tous les étages ont été dans leur origine un couvercle ou un fond de ruche.

Les cellules des Cartonnieres ſont héxagones comme celles de toutes les autres Guêpes, & ſervent aux mêmes uſages. Lorſque les Vers qu'elles y élevent ont atteint leur parfait accroiſſement, ils tapiſſent de ſoie la cellule & y mettent un couvercle du même tiſſu. Il y a auſſi chez les Cartonnieres de trois ſortes d'Individus ; mais

on ne ſait pas encore quelle part chaque ſorte prend aux travaux de la ruche. Il y a apparence que les bois qu'emploient nos Cartonnieres influent ſur la beauté de leur carton, & les leçons qu'elles nous donnent en ce genre pourroient nous devenir d'autant plus utiles, que nos chiffons fourniſſent à peine à la prodigieuſe conſommation que nous faiſons journellement des cartons & des papiers. Ces Mouches & les autres Guêpes qui vivent en ſociété ſemblent nous inviter à imiter leurs procédés en eſſayant de fabriquer des papiers avec des bois & des écorces. Il eſt bien d'autres pratiques des Animaux, qui nous donnent des inſtructions importantes auxquelles nous ne prêtons pas l'attention qu'elles méritent (2).

(2) Un bon Obſervateur, M. SCHÆFFER, s'eſt empreſſé à entrer dans les vues vraiment utiles que Mr. de REAUMUR avoit propoſées dans ſon intéreſſante hiſtoire des Guêpes, & il a très-bien réuſſi à faire diverſes ſortes de papiers avec des bois ou des écorces de différentes eſpeces de Plantes. Il m'en a envoyé des échantillons, qui montrent aſſez tout ce qu'on peut ſe promettre des procédés auxquels il a eu recours.

CHAPITRE XXVI.

Les Abeilles.

LE gouvernement des Abeilles tient plus du monarchique que du républicain. Une ſeule Mouche y dirige tout. Cette Mouche eſt non-ſeulement la Reine du peuple, elle en eſt encore la Mere au ſens le plus étroit, Des 30 à 35 mille Mouches, dont une ruche eſt ſouvent fournie, la Reine eſt la ſeule qui engendre. C'eſt à cette prérogative, plus réelle que beaucoup de celles qui diſtinguent les Souverains, qu'elle doit l'extrême affection que ſon Peuple lui porte. Elle eſt preſque toujours environnée d'un cercle d'Abeilles, uniquement occupées du ſoin de lui être utiles. Les unes lui préſentent du miel, les autres paſſent légérement leur trompe ſur ſon corps à diverſes repriſes, afin d'en détacher tout ce qui pourroit le ſalir. Lorſqu'elle marche, toutes celles qui ſont ſur ſon paſſage ſe rangent pour lui faire place. Elles ſavent ou paroiſſent ſavoir que cette marche a un objet important, celui d'augmenter le nombre des Citoyens

EN effet, elle cherche alors des cellules pro-

pres à recevoir ſes œufs. Ces cellules ſont, comme celles des Guèpes, de figure héxagone, mais leur fond a une forme beaucoup plus recherchée : au lieu d'être à-peu-près plat, il eſt pyramidal, & compoſé de trois lozanges égales & ſemblables, dont les proportions ſont telles, qu'elles réuniſſent ces deux conditions très-remarquables; la premiere, de donner à la cellule la plus grande capacité; la ſeconde, d'exiger le moins de matiere pour ſa conſtruction.

L'ARCHITECTURE des Abeilles ſurpaſſe encore celle des Guèpes dans l'ordonnance des gâteaux; ils n'ont chez celles-ci qu'un ſeul rang de cellules : chez celles-là, le terrein eſt mieux ménagé; chaque gâteau porte un double rang d'alvéoles. Ils ſont appuyés les uns contre les autres par leur fond, de maniere que l'ouverture de ceux d'un rang regarde du côté oppoſé à celui vers lequel ceux de l'autre rang ſont tournés (1).

(1) †† Ce que je dis ici de la conſtruction des cellules eſt bien imparfait. Les cellules qui occupent les deux faces d'un même gâteau, ſont bien appuyées les unes contre les autres par leurs fonds; mais ces fonds ne ſont pas plats ou un peu arrondis, comme dans les gâteaux des Guêpes; ils ſont pyramidaux & formés de trois petites pieces en lozanges, égales & ſemblables. C'eſt cette figure pyramidale qui permet aux fonds des cellules des deux faces oppoſées du gâteau, de s'ajuſter les uns contre les autres de maniere qu'ils ne laiſſent entr'eux aucun

Leur

Leur axe eſt parallele à l'horiſon, & le gâteau qu'elles compoſent lui eſt perpendiculaire. Cette poſition, directement contraire à celle des gâteaux de Guêpes, eſt déterminée par des circonſtances particulieres, & dont la conſervation des Petits dépend (2).

vuide. Il en eſt de même du corps des cellules : ſa figure hexagone leur permet auſſi de s'appliquer immédiatement les unes aux autres, ſans qu'il reſte entr'elles aucun intervalle.

(2) †† Les trois ordres d'Individus qui compoſent la ſociété des Abeilles different en grandeur. Les Mâles ſont les plus gros & reſſemblent aſſez aux Bourdons ; ce qui a porté les Naturaliſtes à leur donner le nom de *Faux-bourdons*. Les Femelles, moins groſſes que les Mâles, ont le ventre plus alongé & les aîles plus courtes proportionnellement au corps. Les Neutres ſont moins longs que les Femelles, moins gros & moins velus que les Mâles, & on ne leur découvre point de parties ſexuelles.

Les Vers dont proviennent ces trois ordres d'Individus, different auſſi par leur taille, & demandoient à être élevés dans des cellules de capacité différente. Les Ouvrieres conſtruiſent donc des cellules de trois ordres. Les cellules deſtinées aux Mâles & aux Neutres ſont toujours hexagones ; mais celles des Mâles ſont plus grandes que celles des Neutres, dans un rapport déterminé à la différence de taille de ces deux ordres d'Individus. Mais les cellules deſtinées aux Vers qui doivent devenir des Reines, ne different pas ſeulement des autres par la grandeur ; elles en different encore par la forme, par la poſition & par la quantité de matiere qui entre dans leur conſtruction. Quand les Ouvrieres bâtiſſent ces cellules, elles ne ſuivent point les regles ordinaires de leur architecture : ce ne ſont plus des tubes hexagones qu'elles conſtruiſent ; ce ſont des eſpeces de bouteilles ou de matras, dont le ventre aſſez renflé

Ce ſont les Neutres ou les Abeilles ouvrieres qui conſtruiſent ces gâteaux où brille une ſi fine Géométrie. Elles en vont recueillir la matiere ſur les fleurs : la cire eſt faite des pouſſieres des étamines. Elles préparent ces pouſſieres ; elles les digerent. Elles en font des amas dans leurs ruches, ſoit pour fournir à la conſtruction de

eſt tourné en en-haut. Ces ſingulieres cellules pendent du bord inférieur d'un gâteau, comme les ſtalactites pendent de la voûte d'une caverne. Elles ſont ſi maſſives, que la quantité de matiere employée à bâtir une ſeule de ces cellules ſuffiroit à la conſtruction de cent ou cent cinquante cellules ordinaires. Les Ouvrieres n'uſent donc point ici de cette épargne qui ſe fait tant admirer dans leurs autres ouvrages. Je viens de dire que les cellules royales ſont verticales : leur ouverture eſt toujours tournée en en-bas comme dans les cellules des Guêpes : le Ver qui y eſt logé a auſſi la tête conſtamment dirigée en en-bas dès qu'il a pris la plus grande partie de ſon accroiſſement ; mais dans les premiers temps il eſt roulé ſur lui-même en maniere de cerceau, comme les Vers communs.

Voilà ce que Mr. de Reaumur nous avoit appris touchant les trois ordres de cellules que conſtruiſent les Abeilles. Mais un Cultivateur de Lauter dans le Palatinat, Mr. Riem, m'a communiqué ſur ce ſujet des faits nouveaux qu'il m'a aſſuré avoir bien vus, & qui avoient échappé au principal Hiſtorien des Abeilles. Il a vu que les Ouvrieres élevent des Vers communs dans de vieilles cellules royales, & que jamais elles n'en élevent dans des cellules royales nouvellement conſtruites. Il affirme encore, qu'elles élevent auſſi des Vers de Faux-bourdons dans des cellules communes, qu'elles ont ſoin d'agrandir pour les proportionner à la taille des Faux-bourdons : mais que les Vers qui doivent devenir des Reines, ne ſauroient être élevés que dans des cellules royales.

nouveaux gâteaux, ſoit pour ſervir à leur nourriture.

PENDANT qu'une partie des Abeilles s'emploie à recueillir la matiere de la cire, à la préparer & à en remplir les magaſins, d'autres s'occupent de différens travaux. Les unes mettent cette cire en œuvre & en conſtruiſent des cellules: d'autres poliſſent l'ouvrage & le perfectionnent: d'autres vont faire ſur les fleurs une autre ſorte de récolte, celle du miel, qu'elles dépoſent enſuite dans les cellules, pour les beſoins de chaque jour & pour ceux de la mauvaiſe ſaiſon: d'autres ferment avec un couvercle de cire les cellules qui contiennent le miel qui doit être conſervé pour l'Hiver; précaution qui en prévient l'altération: d'autres donnent à manger aux Petits: d'autres mettent un couvercle de cire aux cellules de ceux qui ſont prêts à ſe métamorphoſer, afin qu'ils puiſſent le faire ſûrement: d'autres bouchent avec une ſorte de poix les moindres ouvertures de la ruche par leſquelles l'air ou de petits Inſectes pourroient s'introduire: d'autres enfin portent dehors les cadavres dont la corruption infecteroit la ruche: les cadavres qui ſont trop gros pour être tranſportés, elles les recouvrent d'une épaiſſe enveloppe de cire ou d'une ſorte de gomme ou de réſine, ſous

laquelle ils peuvent ſe corrompre ſans cauſer aucune incommodité.

POUR faciliter tous ces différens travaux, les Ouvrieres ont ſoin de laiſſer entre les gâteaux des eſpaces qui ſont comme des eſpeces de rues dont la largeur eſt proportionnée à la taille des Abeilles : elles ſavent encore ménager des portes dans les gâteaux, au moyen deſquelles elles évitent les détours.

LA Reine anime les Ouvrieres par ſa préſence ; & cela eſt plus à la lettre qu'on ne l'imagineroit. Si l'on partage un eſſaim, la partie qui demeurera privée de Mere, périra, ſans conſtruire la moindre cellule ; tandis que la partie ſur laquelle la Mere régnera, remplira la ruche de gâteaux & de proviſions de tout genre (3).

LE travail des Ouvrieres eſt ordinairement

(3) †† Cela n'eſt vrai que d'un eſſaim qu'on partage à ſa ſortie de la mere ruche, ou d'un eſſaim qui n'a point encore travaillé. Mr. de REAUMUR a bien prouvé que dans ce cas, la partie de l'eſſaim qui demeure privée de Reine, ne conſtruit point de gâteau. Mais il n'en iroit pas de même d'un eſſaim qu'on priveroit de ſa Reine, mais auquel on laiſſeroit des gâteaux où ſe trouveroient des œufs & des Vers. Un Eſſaim traité de la ſorte ne tomberoit pas dans l'inaction & parviendroit bientôt à ſe procurer une nouvelle Reine.

proportionné au nombre d'œufs que la Mere doit pondre. Ainſi, plus ſa fécondité eſt grande, & plus les Abeilles conſtruiſent de gâteaux.

Ce ſeroit pourtant en vain qu'on tenteroit de faire conſtruire aux Neutres plus de gâteaux en introduiſant dans la ruche pluſieurs Meres : les Meres ſurnuméraires ſeroient bientôt miſes à mort. La conſtitution de la ſociété n'en permet qu'une ſeule.

Les Mâles, incomparablement moins nombreux que les Neutres, mais pourtant très-nombreux pour une ſeule Femelle, ne prennent aucune part à ce qui ſe fait dans la ruche ; toute leur occupation ſe borne à la fécondation, & encore ne s'y livrent-ils qu'avec peine : il faut que la Reine faſſe les avances, & qu'elle mette en mouvement par des careſſes réitérées celui ſur lequel ſon choix eſt tombé. Nous avons vu ailleurs (4), que ce renverſement de l'ordre général eſt fondé ſur des raiſons très-ſages. Les Mâles ſont nourris & ſoignés juſques vers le mois d'Août, temps auquel, devenus inutiles & même

(4) Part. VIII, Chap. VII. †† Conſultez en particulier la Note 5, où j'indique la nouvelle découverte qui a été faite ſur ce ſujet, & qui rend cette incontinence de la Reine-abeille plus que douteuſe.

nuiſibles, les Neutres les exterminent entiérement. Ils auroient à craindre en les conſervant qu'ils n'en fuſſent affamés pendant l'Hiver (5).

Au retour du Printemps, on voit cependant reparoître des Mâles dans la ruche ; on y découvre même pluſieurs Femelles (6) & le nom-

(5) †† Les plus célebres Hiſtoriens des Abeilles aſſurent unanimement, que les Ouvrieres tuent les Mâles ou Faux-bourdons. Mr. de REAUMUR, en particulier, parle de ces exécutions des Neutres comme d'un *maſſacre*, d'un *carnage affreux*, d'une *horrible tuerie*. Je puis pourtant affirmer, qu'ayant examiné avec la plus grande attention les cadavres de ces Mâles qui avoient été ainſi ſacrifiés, je n'ai pu y découvrir le moindre indice de bleſſure : ils étoient tous bien entiers. J'ai vu & revu bien des fois deux à trois Neutres qui montoient ſur le corps d'un Mâle, ſembloient vouloir l'exterminer, & qui néanmoins ne lui faiſoient aucun mal. Il ne paroiſſoit pas même s'en mettre fort en peine, & ne laiſſoit pas de marcher d'un pas tranquille ſur les gâteaux en entraînant avec lui ces Neutres incommodes. Quelquefois même on auroit pu préſumer, à la maniere dont ceux-ci s'y prenoient, que c'étoient plutôt des careſſes que des violences qu'ils faiſoient aux Mâles. Cependant j'obſervois, que tous les Mâles étoient chaſſés peu-à-peu de deſſus les gâteaux, & réduits à ſe retirer dans un coin de la ruche où ils mouroient de faim.

(6) †† Si l'on jugeoit du nombre des Reines qui naiſſent au Printemps, par celui des cellules royales que les Ouvrieres conſtruiſent, ce nombre ſeroit aſſez conſidérable, quoique fort inférieur à celui des deux autres ordres d'Individus. Mr. de REAUMUR a compté juſqu'à quarante cellules royales dans certaines ruches. Mais en général on ne compte guere que trois à quatre cellules royales dans une ruche.

bre des Neutres augmente auſſi de jour en jour. L'extrême fécondité de la Mere fournit à cette nombreuſe génération.

Enfin, il ſort de la ruche un ou pluſieurs eſſaims qui ont chacun une Reine à leur tête. Ce ſont des colonies qui vont chercher ailleurs un établiſſement qu'elles ne ſauroient trouver dans la métropole ſurchargée d'habitans.

CHAPITRE XXVII.

Continuation du même ſujet.

Idées ſur la police des Abeilles.

Le ſpectacle d'une ruche d'Abeilles eſt, ſans contredit, un des plus beaux qui puiſſe s'offrir aux yeux d'un Obſervateur : il y regne un air de grandeur qui étonne. On ne ſe laſſe point de contempler ces atteliers où des milliers d'Ouvriers ſont ſans ceſſe occupés de travaux différens. On eſt ſur-tout frappé de la régularité & de la préciſion géométrique de leur ouvrage. On l'eſt auſſi beaucoup à la vue de ces magaſins remplis de tout ce qui eſt néceſſaire pour fournir à l'entretien de la ſociété pendant la

mauvaiſe ſaiſon. On s'arrête encore avec plaiſir à conſidérer les Petits dans leurs berceaux, & à obſerver les tendres ſoins des Meres-nourrices à leur égard (1).

Mais ce qui fixe tous les yeux, c'eſt la Reine : la lenteur, j'ai preſque dit la gravité de ſa démarche, ſa taille plus avantageuſe que celle des autres Abeilles, & ſur-tout les eſpeces d'hommages que lui rendent celles-ci, la font aiſément reconnoître. On a peine à en croire ſes propres yeux, quand on obſerve les attentions & les empreſſemens des Neutres pour cette Reine chérie. Mais l'étonnement augmente beaucoup quand on voit ces Mouches ſi laborieuſes & ſi actives, ceſſer abſolument de travailler & ſe laiſſer périr, dès qu'on les prive de leur Reine (2).

(1) †† Les Ouvrieres ont ſoin d'approprier la nourriture à l'âge du Ver : elles l'approprient même au ſexe. Cette nourriture eſt toujours une liqueur épaiſſie ou une ſorte de bouillie blanchâtre, dont le Ver eſt environné & ſur laquelle il repoſe mollement. La bouillie qui eſt adminiſtrée aux Vers communs eſt à-peu-près inſipide ; celle, au contraire, qui eſt adminiſtrée aux Vers qui doivent devenir des Femelles ou des Reines a un goût un peu ſucré, mêlé à du poivré & de l'aigre : on diroit que les Pourvoyeuſes veulent qu'elle ſoit une ſorte de ragoût aſſaiſonné. Une découverte imprévue & très-moderne rend cette remarque importante comme on le verra bientôt.

(2) †† Conſultez la Note 2 du Chapitre précédent.

PAR quel lien ſecret, par quelle loi ſupérieure à celle en vertu de laquelle chaque Individu pourvoit à ſa propre conſervation, les Abeilles ſont-elles attachées à leur Reine au point de négliger abſolument le ſoin de leur propre vie, lorſqu'elles viennent à en être ſéparées? Ce lien, cette loi paroît n'être autre choſe que le grand principe de la conſervation de l'Eſpece: les Neutres n'engendrent point (3);

(3) †† Divers Cultivateurs Allemands aſſurent fort, que les Neutres ne ſont point de vrais *Neutres*; qu'ils appartiennent tous au ſexe féminin; qu'ils pondent des œufs, & ce qui n'eſt pas moins étrange, que de ces œufs il ne ſort jamais que des Faux-bourdons. Mr. RIEM eſt un de ceux qui croient s'être le mieux aſſurés du fait. Il m'écrivoit même, qu'il avoit découvert un ovaire dans deux Neutres. Mais les faits ſur leſquels ces Cultivateurs s'appuient ne me paroiſſent point aſſez déciſifs ni avoir été vus aſſez bien & aſſez ſouvent pour qu'on puiſſe y compter en bonne Logique. SWAMMERDAM, ce grand Anatomiſte, qui avoit diſſéqué avec tant de dextérité & de patience les trois ſortes d'Abeilles, regardoit les Ouvrieres comme de *vrais Neutres*, parce qu'elles lui avoient toujours paru totalement privées des organes relatifs à la génération. Mr. de REAUMUR en avoit porté le même jugement. On ſurprend facilement la Reine dans des ruches vitrées, tandis qu'elle eſt occupée du travail de la ponte: on la voit pondre ſucceſſivement pendant pluſieurs ſemaines, des centaines d'œufs dans autant de cellules différentes; & jamais aucun Obſervateur n'eſt parvenu à ſurprendre une ſeule Ouvriere dans le même travail, quoique les Mouches de cette ſorte ſoient au nombre de pluſieurs mille. D'ailleurs, pourquoi les ovaires des Ouvrieres ne contiendroient-ils que des œufs de Males, puiſque, ſuivant l'opinion des Cultivateurs dont il s'agit, elles ſont toutes,

mais ils ſavent que la Reine poſſede cette faculté ; c'eſt pour recevoir les œufs qu'elle eſt prête à dépoſer, qu'ils conſtruiſent ces cellules dont nous admirons les proportions. La Nature les a autant intéreſſés pour les Petits qui en doivent éclorre, qu'elle a intéreſſé les Meres des autres Animaux en faveur des leurs propres.

MAIS, demandera-t-on encore, comment la ſeule préſence de la Reine excite-t-elle les Abeilles au travail, engage-t-elle les unes à élever des cellules, les autres à amaſſer de la cire, les autres à recueillir du miel, &c. ?

NE ſeroit-ce point ici l'effet de quelque impreſſion purement phyſique ? Les œufs dont le corps de la Mere eſt rempli, n'affecteroient-ils point les Abeilles au moyen de l'odorat ou de quelqu'autre ſens à nous inconnu ?

comme les Reines, de vraies Femelles ? Pourquoi encore le nombre des Faux-bourdons ſeroit-il ſi inférieur à celui des Ouvrieres ? Mais s'il eſt vrai, comme l'aſſure un Obſervateur Anglois (†), qu'il y ait dans les ruches des Reines d'une auſſi petite taille que les Abeilles ouvrieres, ce ſeroient apparemment ces petites Reines, inconnues à nos Cultivateurs, qui les auroient trompés, & qui auroient engendré ces Faux-bourdons qu'ils ont cru provenir des Ouvrieres.

(†) Mr. NEEDHAM.

Quoi qu'il en ſoit de cette conjecture, il paroît qu'on ne doit pas ſuppoſer que la préſence de la Reine faſſe différentes impreſſions ſur différentes Abeilles, détermine les unes à conſtruire des cellules, les autres à amaſſer de la cire, les autres, du miel, &c. L'impreſſion dont il s'agit eſt une; elle détermine les Abeilles au travail; mais ce travail eſt différent ſuivant les circonſtances particulieres où chaque Abeille ſe trouve placée; par exemple, quand une Abeille ſort de ſa ruche, il n'y a pas lieu de croire que ce ſoit avec un deſſein déterminé de recueillir de la cire plutôt que du miel, mais elle rencontre une fleur qui abonde en pouſſieres d'étamines & qui n'offre que peu de miel: elle ſe charge donc de matiere à cire. Auſſi remarque-t on, que c'eſt principalement le matin que ſe fait cette récolte. Alors les pouſſieres n'ont pas encore été deſſéchées par la chaleur du Soleil; elles conſervent une certaine humidité qui en lie les grains, & qui en rend ainſi la récolte & le tranſport plus faciles. Le miel, au contraire, étant un ſuc qui exſude des fleurs par l'action du Soleil, elles en rendent peu le matin; le milieu du jour eſt un temps plus favorable à cette eſpece de récolte; auſſi voit-on alors peu d'Abeilles qui reviennent à la ruche chargées de cire; le plus grand nombre y apporte du miel.

Mais, d'où vient que les Abeilles privées de Mere ſe laiſſent périr faute de nourriture? comment oublient-elles à ce point le ſoin de leur propre vie? A la bonne heure qu'elles ne conſtruiſent pas des gâteaux: on entrevoit des raiſons de ce procédé: mais, au moins pourroient-elles aller recueillir ſur les fleurs le miel & la cire néceſſaires à leur ſubſiſtance actuelle.

Ici la cauſe finale eſt aſſez évidente: la conſervation de l'Eſpece importoit plus à la Nature que celle des Individus: dans le cas dont il s'agit, celle-là ne pouvant avoir lieu, celle-ci devenoit inutile. A l'égard de la cauſe efficiente, il n'eſt pas facile de la pénétrer. Les Neutres ſeroient-ils abſolument privés du ſentiment de la faim? Ne ſeroient-ils portés à recueillir de la cire & du miel & à en manger, que par l'impreſſion agréable que la préſence de ces matieres ſur les fleurs produiroit dans l'organe? Cela ſeroit fort ſingulier; car la faim eſt un ſentiment commun à tous les Animaux, ou qui paroît l'être. Il eſt un moyen ſagement établi pour prévenir la deſtruction des Individus, & qui les excite à réparer les pertes continuelles que les différentes évacuations occaſionent. Mais, dans le choix du moyen dont il s'agit, la Nature pourroit ne s'être pas propoſé pour principal objet la conſervation

des Individus, comme Individus; mais plutôt comme auteurs de la génération ou conſervateurs de l'Eſpece. En effet, chez les Quadrupedes, chez les Oiſeaux, les Poiſſons, les Reptiles, & chez preſque tous les Inſectes, chaque Individu eſt Mâle ou Femelle, ou tous les deux enſemble, comme chez les Vers-de-terre, la Limace, &c. Là, comme l'on voit, la conſervation de l'Eſpece dépend immédiatement de celle des Individus. Il n'en eſt pas ainſi chez les Abeilles: le plus grand nombre de celles qui compoſent la même ſociété eſt dépourvu de ſexe, & ne concourt à la conſervation de l'Eſpece qu'en qualité de cauſe ſecondaire. Il ne devroit donc pas paroître improbable que les Neutres fuſſent privés du ſentiment de la faim. On voit bien que la Reine & les Mâles ne ſauroient en être privés: auſſi mangent-ils ſouvent.

Mais, ſi les Neutres n'ont pas le ſentiment de la faim, comment ſont-ils avertis de réparer leurs forces abattues par le travail & par la tranſpiration? Les Neutres qui ont à leur tête une Reine, ſont excités au travail par ſa préſence. Ils ne ſauroient vaquer aux divers travaux dont ils ont été chargés, ſans avoir de fréquentes occaſions de prendre de la nourriture. La raiſon en eſt, qu'indépendamment de la

ſenſation agréable qui peut réſulter de l'action de la cire & du miel ſur l'organe des Neutres, ces matieres doivent néceſſairement paſſer par leur eſtomac, s'y digérer & s'y préparer avant que d'être dépoſées dans la ruche pour ſervir aux uſages auxquels elles ſont deſtinées.

On objectera peut-être, qu'il ſeroit étrange, que parmi les Individus d'une même Eſpece, il y en eût qui fuſſent doués d'un ſentiment tout-à-fait inconnu aux autres. Mais n'eſt-il pas auſſi étrange que parmi ces mêmes Individus, il y en ait qui ſont pourvu d'organes qu'on ne trouve point dans les autres? Les Abeilles ouvrieres ont diverſes parties qu'on ne voit point à la Reine & aux Mâles; & ceux-ci en ont pareillement qu'on ne rencontre point chez les Ouvrieres. La deſtination n'étant pas la même pour tous les Individus, les moyens qui y répondent doivent néceſſairement différer.

Une autre réflexion vient à l'appui de la conjecture que je haſarde; la faim eſt un ſentiment preſſant, actif, inquiet; or les Neutres, privés de leur Reine, tombent dans une ſorte d'aſſoupiſſement qui ne finit qu'avec la vie. Si dans cet état de léthargie, on leur donne une Reine, ils ſe réveillent auſſi-tôt & ſe mettent au travail.

Dans la vue de découvrir la loi fondamentale du gouvernement de nos Mouches républicaines, on avoit partagé un eſſaim en deux parties à-peu-près égales, & l'on avoit toujours obſervé que les Abeilles qui n'avoient point de Reine ne conſtruiſoient point de gâteaux (4). C'étoit déja une expérience très-déciſive : mais il y en avoit une autre à tenter : c'étoit de partager une ruche bien fournie de gâteaux, d'Habitans & de Petits, & de ſuivre avec ſoin tout ce qui arriveroit dans la partie de cette ruche où la Reine ne ſeroit point. On pourroit conjecturer probablement que les Neutres continueroient à s'occuper de l'éducation des Petits, & qu'ils ne ceſſeroient de travailler que lorſque ces derniers ſeroient devenus Mouches (5).

(4) †† Conſultez la Note 3 du Chap. XXVI.

(5) †† L'expérience que je propoſois ici ou une expérience très-analogue a été répétée une multitude de fois par un habile Cultivateur de Luſace, & elle lui a valu une découverte qui a fait bruit parmi les Naturaliſtes : on voit que je veux parler de celle de feu Mr. Schirach, dont j'ai donné ailleurs le détail, d'après les Lettres qu'il m'avoit adreſſées. Il réſulte de ſes nombreuſes expériences répétées en différentes ſaiſons, & qui l'ont été depuis par d'autres Cultivateurs, que ſi l'on renferme dans une ruche vuide quelques centaines d'Abeilles ouvrieres avec un petit gâteau qui contienne des Vers communs, âgés de trois à quatre jours, les Ouvrieres ſauront ſe donner une ou pluſieurs Reines, en transformant, pour ainſi dire, ces Vers communs en Vers royaux. Elles y parviendront en détruiſant

PAR un moyen très-ſimple on oblige deux eſſaims à faire un échange réciproque de leur ruche & de leurs gâteaux : ils ſe font à ce chan-

les cellules communes où ils ſont logés, en bâtiſſant à leur place des cellules royales, & en adminiſtrant aux Vers la nourriture appropriée à ceux qui doivent devenir des Reines. (Note 1.) Comme cette curieuſe expérience ſe répete journellement en Luſace & en Saxe par des Cultivateurs de tout ordre & même par de ſimples Villageois, qui s'en ſervent comme d'un nouveau moyen très-facile de multiplier à volonté les eſſaims, il ſemble qu'on ne puiſſe plus douter de l'eſpece de converſion des Vers communs en Vers royaux : au moins le fait paroît-il ſolidement établi au jugement des plus aſſidus Cultivateurs de l'Allemagne. Il a encore été confirmé par un Obſervateur Anglois, qui a enrichi l'hiſtoire des Abeilles d'une autre découverte dont je parlerai dans quelques momens. Cependant, un Naturaliſte célebre (†), qui n'avoit point fait difficulté d'admettre la transformation d'un Végétal en Animal & d'un Animal en Végétal, s'eſt élevé avec chaleur contre la découverte de l'induſtrieux SCHIRACH, qu'il compare à celle de la dent d'or. La converſion d'un Ver commun en Ver royal lui paroît le renverſement de la ſaine Phyſique. Il préfere donc d'admettre que la Reine pond indifféremment les trois ſortes d'œufs dans des cellules communes, & que ce ſont les Ouvrieres qui les diſtribuent un à un dans les cellules appropriées aux Vers qui doivent en éclorre. Le meilleur Hiſtorien (††) des Abeilles avoit dit pourtant, d'après ſes propres obſervations : „ que la „ Reine ne manque jamais de loger dans une petite cellule, „ l'œuf qui donnera une Abeille ouvriere ; dans une cellule „ hexagone plus grande, l'œuf qui doit donner un Mâle ; &

(†) Mr. NEEDHAM.

(††) Mr. de REAUMUR.

gement

gement, & les Neutres de chaque eſſaim prennent autant de ſoin des Petits qu'ils trouvent dans leur nouvelle habitation, que s'ils étoient

„ dans une cellule royale, l'œuf plus précieux dont ſortira un „ Ver qui deviendra une Reine ". Mais, quand l'opinion du Naturaliſte dont je parle ſeroit vraie, on pourroit toujours lui objecter qu'il ſeroit bien ſingulier que dans les expériences ſi fréquemment répétées des Cultivateurs de Luſace, il ſe fût toujours trouvé à point nommé un Ver royal parmi le petit nombre de Vers de trois à quatre jours, qu'on avoit renfermés avec des Abeilles ouvrieres. Le haſard offre-t-il jamais une telle conſtance? Il y a plus; l'expérience ne réuſſit point, ſi le petit gâteau qu'on renferme avec les Abeilles ouvrieres, ne contient que des œufs. L'Inventeur l'affirme de la maniere la plus poſitive. Il faut toujours pour que l'expérience réuſſiſſe, que le gâteau renferme des Vers qui n'aient que trois à quatre jours. Ces Vers ſont donc des Vers communs, puiſqu'ils ſont tous logés dans des cellules communes, & que ſuivant le Détracteur de la nouvelle découverte, les Ouvrieres ne laiſſent pas ordinairement des œufs royaux dans des cellules communes. Il eſt au moins très-ſûr, que tous ces Vers de trois à quatre jours ne donneroient que des Abeilles ouvrieres, s'ils reſtoient tous dans leur propre cellule, & s'ils étoient nourris de l'aliment ordinaire. Si donc il arrive conſtamment que lorſque les Abeilles ouvrieres conſtruiſent à un, deux ou trois de ces mêmes Vers, des cellules royales & qu'elles leur adminiſtrent un aliment particulier, ils donnent des Reines, comment pourroit-on refuſer d'admettre la concluſion que l'Inventeur tiroit de ſes nombreuſes expériences, & qui a été adoptée par tous ſes ſucceſſeurs?

Mais il ne faut pas s'imaginer qu'il y ait ici une vraie tranſformation d'un Ver d'une ſorte en un Ver d'une autre ſorte. En ſuppoſant que le fait ſingulier affirmé par tous les Cultivateurs de Luſace, eſt auſſi vrai qu'ils le croient, il n'y auroit point proprement ici de tranſformation. La Reine ne pondroit

leurs Nourriſſons naturels. L'affection des Neutres s'étend donc indifféremment à tout ce qui eſt Ver d'Abeille. Cet inſtinct a donc un rapport direct à la conſervation de l'Eſpece. Il faudroit

que de deux ſortes d'œufs, des œufs de Mâles & des œufs de Femelles : il n'y auroit donc réellement dans une ruche que de deux ſortes d'Individus, comme dans la plupart des Eſpeces d'Inſectes, & les Abeilles ouvrieres qui ont reçu le nom de *Neutres*, ne ſeroient point de vrais Neutres : elles ſeroient des Femelles d'origine, mais des Femelles qui n'auroient pu acquérir la grandeur propre aux Reines, & dont les ovaires ſeroient demeurés oblitérés, parce que leurs Vers ſeroient demeurés renfermés dans de petites cellules, & qu'ils auroient été nourris d'un aliment inférieur en qualité à celui qui eſt dépoſé dans les cellules royales. Il ne doit pas paroître improbable, qu'un logement plus ſpacieux, une ſituation différente, & une nourriture plus abondante & plus élaborée operent un plus grand développement de certains organes : rien de tout cela ne choque les notions de la ſaine Phyſique.

Les Abeilles ouvrieres auroient donc été inſtruites par la Nature à ſe donner au beſoin une ou pluſieurs Reines, & la conſervation de la ſociété entiere ne tiendroit plus, comme le croyoit Mr. de REAUMUR, à la vie d'une ſeule Mouche. Mais comment les Ouvrieres viennent-elles à découvrir que les beſoins de la ruche exigent qu'elles travaillent à ſe donner une nouvelle Reine ? Comment ſont-elles déterminées dans le choix qu'elles font de tel ou tel Ver commun pour l'élever à la dignité royale ? Pourquoi le nombre des nouvelles Reines qu'elles font naître eſt-il toujours variable ? Nous ne ſaurions encore ſatisfaire à ces queſtions ni à une foule d'autres que nous préſente l'hiſtoire de ces Républicaines ſi induſtrieuſes, car malgré le nombre & la groſſeur des Volumes dont elles ont fourni la matiere, nous tenons à peine les premiers élémens de leur ſcience.

varier un peu cette expérience, pour ſonder le diſcernement des Neutres, & ſubſtituer adroitement aux Nourriſſons de leur Eſpece, des Nourriſſons d'Eſpece différente.

Les Neutres n'ont point de ſexe; ils n'engendrent point: comment leur ſuppoſer pour les Petits de leur Reine préciſément le même amour qui meut les Meres des autres Animaux? Ils agiſſent pourtant comme elles dans les mêmes circonſtances. Si donc la Nature a ſu intéreſſer l'attachement des Meres par les ſenſations agréables que les Petits leur font éprouver, ou par les ſervices qu'elles en retirent, il y a bien de l'apparence qu'elle en a uſé à-peu-près de même à l'égard des Abeilles ouvrieres, & qu'elle a placé pour elles dans les Petits une cauſe ſecrete de ſenſations agréables, qui les attachent à eux & les déterminent à dégorger dans leurs berceaux l'eſpece de bouillie dont ils ſe nourriſſent (6).

(6) †† Toutes les expériences qu'on a tentées ſur les Abeilles pour tâcher de découvrir le principe fondamental de leur gouvernement, concourent à établir, que c'eſt l'amour qu'elles portent à leur Reine, ou ſi l'on aime mieux, l'amour de leur poſtérité, qui détermine tous leurs travaux. Si l'on donne une Reine à un eſſaim qui demeure dans l'inaction, il ſe mettra auſſi-tôt au travail, recueillira du miel & de la cire, les emmagaſinera & conſtruira de nouveaux gâteaux, &c.

Nous avons vu, que ſi l'on introduit dans une ruche pluſieurs Reines, il n'y en aura jamais qu'une ſeule qui conſervera l'empire : toutes les autres ſeront miſes à mort. On ne ſait point encore ſi l'empire demeure toujours à la Reine légitime, & comment & par qui les Reines ſurnuméraires ſont ſacrifiées (7). Il n'eſt pas pro-

(7) †† Les Membres de la Société économique de Luſace ont décidé ce point, & ſe ſont aſſurés que les Reines ſurnuméraires ſont miſes à mort par les Abeilles ouvrieres. Mr. de REAUMUR ne l'avoit pas ſoupçonné; lui qui avoit vu bien des fois ces mêmes Abeilles ouvrieres accueillir des Reines étrangeres comme leur propre Reine. Il avoit conjecturé que les Reines ſe livroient des combats ſinguliers, & que l'empire demeuroit à la plus forte ou à la plus heureuſe. On ſait que les Reines ſont armées d'un aiguillon comme les Ouvrieres : les Mâles ſeuls en ſont dépourvus. Il en eſt de même chez les Fourmis, les Guêpes & les Bourdons.

Mr. RIEM a été auſſi témoin des combats que les Ouvrieres livrent aux Reines. Il m'a raconté, qu'un jour qu'il ſe tenoit en ſentinelle auprès d'une ruche où il ſe trouvoit pluſieurs Reines, il vit paroître au-dehors une de ces Reines que deux Ouvrieres ſerroient de très-près, & dont elle parvint néanmoins à ſe débarraſſer : mais qu'au bout d'un quart d'heure, trois autres Ouvrieres ſurvinrent, qui ſe jetterent ſur la Reine, & qu'elle obligea encore à ſe retirer : que bientôt après accoururent quatre autres Ouvrieres, qui s'efforcerent d'arracher la malheureuſe Reine de deſſus l'appui auquel elle ſe tenoit cramponnée; & que touché de ſon triſte ſort, il l'avoit dérobée aux pourſuites de ſes ennemies acharnées, en la renfermant dans une boîte. Les Cultivateurs de Luſace ont encore remarqué, que les Ouvrieres ſe défont quelquefois de leur propre Reine.

bable que les Neutres ſoient chargés de ces cruelles exécutions : ils rendent aux Reines étrangeres les mêmes hommages qu'à leur Souveraine légitime. Mais les Reines ſont armées d'un fort aiguillon, & l'on ne voit pas trop de quelle utilité leur ſeroit cette arme offenſive, ſi elles ne s'en ſervoient point pour défendre ou conquérir le trône. Quoi qu'il en ſoit, on comprend aſſez pourquoi il a été ordonné qu'il n'y auroit jamais qu'une ſeule Reine dans chaque ruche. Un eſſaim, quelque nombreux qu'il ſoit, ne l'eſt pas ordinairement trop pour une ſeule Mere ; celle-ci peut fort bien pondre dans l'année quarante mille œufs. Il faut pour ces œufs un nombre de cellules proportionné, & toutes ne ſont pas employées à loger des Petits. Auſſi arrive-t-il que lorſque l'eſſaim eſt un peu foible, la Mere eſt obligée de dépoſer juſqu'à trois, quatre & cinq œufs dans une même cellule, & comme il n'y a de la place dans chacune que pour un ſeul Ver, les œufs ſurnuméraires ſont toujours ſacrifiés, & c'eſt une perte pour la république.

Ce ſont certainement les Neutres qui font périr les Mâles quand ils ſont devenus inutiles à la communauté. Mais les Neutres ſavent-ils qu'ils l'affameroient ſi on les conſervoit ? Il eſt

plus que probable que leurs connoiſſances ne s'étendent pas juſques-là. Il ſuffiroit d'admettre, qu'il vient un temps où les Mâles font ſur les ſens des Neutres une impreſſion qui les irrite, & qui les porte à s'en défaire (8).

(8) †† Les Mâles ne prennent aucune part aux travaux de la ruche : toute leur occupation ſe borne à féconder les œufs que la Reine pond journellement au Printems & en Été. Cette fécondation a été long-temps un myſtere. Dès le ſiecle d'ARISTOTE on penſoit que les œufs des Abeilles étoient fécondés à la maniere de ceux des Poiſſons à écailles & de quelques Amphibies, par une liqueur vivifiante dont ils étoient arroſés après avoir été pondus. Un Obſervateur exact, l'illuſtre MARALDI, avoit reſſuſcité cette opinion : mais Mr. de REAUMUR ne l'avoit point adoptée. Il avoit obſervé des faits intéreſſans qui le portoient à penſer que la Reine s'unit aux Mâles par une vraie copulation ; & il s'étoit plu à nous raconter ſes amours ou plutôt ſes proſtitutions. Cependant ce grand Obſervateur n'avoit rien vu d'aſſez déciſif pour qu'on pût être aſſuré que la fécondation s'opere chez les Abeilles comme chez la plupart des Animaux, & il reſtoit encore des doutes ſur ce point eſſentiel de leur hiſtoire. Ces doutes étoient ſur-tout entretenus par la conſidération de ce grand nombre de Mâles qui ont été accordés chez les Abeilles à une ſeule Femelle, ou au moins à un très-petit nombre de Femelles, & dont on ne pouvoit rendre de raiſon ſatisfaiſante. Mais, aujourd'hui ces doutes ſemblent ſe diſſiper, & l'opinion des Anciens, reproduite par MARALDI, paroît être la vraie. C'eſt à un Cultivateur Anglois, M. DEBRAW, que nous devons de nouvelles lumieres ſur un ſujet qui piquoit beaucoup la curioſité des Naturaliſtes. Des obſervations faites avec ſoin & répétées plus d'une fois, lui ont appris que les œufs que pond la Reine ſont fécondés dans les cellules par la liqueur prolifique qu'y répandent les Mâles. Il les a vus & revus introduire leur derriere dans la cellule où un œuf venoit d'être

TANT que la saison est favorable à la récolte du miel & de la cire, les Neutres ne cessent point d'en recueillir & d'en remplir les magasins. Ce

déposé & l'arroser de leur liqueur. Tous les œufs qui avoient été ainsi arrosés devenoient féconds ; & tous ceux qui ne l'avoient point été demeuroient stériles. Mais ces Mâles que l'Observateur voyoit introduire leur derriere dans les cellules, n'étoient pas ces gros Faux-bourdons qui sont les plus connus : c'étoient de petits Faux-bourdons dont la taille n'excédoit pas celle des Abeilles communes. MARALDI avoit parlé de ces petits Faux-bourdons, & Mr. de REAUMUR les connoissoit aussi : mais ils lui avoient toujours paru en très-petit nombre, & il pensoit que la petitesse de leur taille étoit due au peu de capacité des cellules dans lesquelles leurs Vers avoient été élevés. La découverte de l'Observateur Anglois indiqueroit qu'ils ne doivent pas être rares dans les ruches. Il resteroit néanmoins à découvrir quel est l'usage des grands Faux-bourdons, dont le nombre va communément à plusieurs centaines. Leur derriere est trop gros pour pouvoir être introduit dans les cellules communes ; mais il pourroit l'être dans les grandes cellules héxagones ou dans les cellules de l'ordre de celles où ils ont pris eux-mêmes naissance & où ils ont été élevés.

Je ne sais pourtant si les grands Faux-bourdons ne parviennent pas à féconder les œufs déposés dans les plus petites cellules ; une observation que je n'ai faite encore qu'une fois, & que je desirerois fort de répéter, me porteroit à le croire. On sait que pour bien observer les Abeilles, il faut les loger dans des ruches vitrées de forme très-applatie : là, elles sont forcées de s'étaler aux yeux de l'Observateur, parce qu'elles ne peuvent y construire de front que deux grands gâteaux. Un jour que j'observois un essaim nouvellement établi dans une semblable ruche, & qui y avoit déja construit des gâteaux assez étendus, j'apperçus sur un de ces gâteaux, entiérement composé de cellules communes, un grand Faux-bourdon qui se mit

n'eſt pas non plus qu'ils prévoyent de loin qu'il arrivera une ſaiſon où ces récoltes leur ſeront interdites. Il ſeroit peu philoſophique d'attribuer

à marcher lentement ſur les cellules, & qui en paſſant donnoit de petits coups de ſon derriere, preſtement réitérés, ſur l'ouverture des cellules. Un œuf venoit d'être dépoſé dans ces mêmes cellules; elles étoient bien à découvert; mais leur fond étoit trop hors de la portée de mes yeux pour que je puſſe m'aſſurer que le Faux-bourdon y avoit répandu quelques gouttelettes de ſa liqueur. Je ne pus néanmoins me refuſer à l'idée bien naturelle, que les petits mouvemens ſi preſtement répétés, que je venois d'obſerver & que je n'avois point encore vus dans aucun Faux-bourdon, n'euſſent pour fin la fécondation. Je jugeai que la conformation ſinguliere des parties ſexuelles du Mâle, que SWAMMERDAM & REAUMUR nous ont fait admirer, pouvoient le mettre en état de ſeringuer ſa liqueur juſqu'au fond de la cellule.

Les ténebres qui couvroient la fécondation chez les Abeilles, ont donc commencé à s'éclaircir, mais elles ne ſont pas entiérement diſſipées. Mr. de REAUMUR avoit prouvé rigoureuſement, que depuis le mois d'Août juſqu'au mois d'Avril, il n'y a pas à l'ordinaire dans les ruches un ſeul Faux-bourdon: & pourtant les œufs que la Reine pond dès les mois de Février & de Mars ne laiſſent pas d'être féconds. Comment donc ſont-ils fécondés? La Reine s'uniroit-elle aux Mâles pendant l'Été, & demeureroit-elle ainſi féconde juſqu'à l'approche du Printemps? ou les petits Faux-bourdons dont j'ai parlé auroient-ils échappé à l'Obſervateur, & ſeroit-ce ces petits Mâles, que les Neutres n'auroient pas fait périr, qui féconderoient dans les cellules les œufs que la Reine y pond à la fin de l'Hiver? Mais ces petits Mâles qui auroient échappé à l'œil perçant de l'Obſervateur, auroient-ils échappé auſſi à l'inſtinct des Ouvrieres qui déclarent en Juillet & Août une ſi cruelle guerre à tout ce qui eſt Faux-bourdon? Car elles ne ſe contentent pas de faire périr les

une telle prévoyance à des Mouches. Des Etres qui n'ont & ne peuvent avoir que de pures ſenſations, porteroient-ils des jugemens ſur l'avenir ? Tout a été ſi bien arrangé, que les Abeilles ſont approviſionnées, ſans avoir ſongé ni pu ſonger à faire des proviſions. Elles ont été inſtruites à récolter la cire & le miel : elles s'occupent de ce travail pendant toute la belle ſaiſon, & quand l'Hiver arrive, les gâteaux ſe trouvent pleins de cire & de miel (9).

Mâles eux-mêmes ; elles arrachent encore des cellules les Vers & les Nymphes appellés à donner des Faux-bourdons.

Mr. SCHIRACH avoit ſouvent expérimenté, que les jeunes Reines qu'il obtenoit au moyen du Ver commun, pondoient des œufs féconds, quoiqu'il n'eût renfermé dans ſes caiſſes que des Ouvrieres. Il ſembleroit donc qu'on pût inférer de ces expériences, que la Reine eſt féconde par elle-même à la maniere des Pucerons ; ſi toutefois il n'y avoit pas lieu de ſoupçonner que quelques Mâles de la petite taille avoient échappé à l'Obſervateur.

(9) †† Je n'ai rien dit de la maniere dont les Abeilles recueillent le miel & la cire, ni de l'art avec lequel elles emploient celle-ci dans la conſtruction de leurs beaux Ouvrages. Je dois ſuppléer ici à cette omiſſion, puiſque l'induſtrie des Animaux eſt actuellement mon principal objet. Je parcourois trop rapidement la curieuſe hiſtoire de nos Mouches.

Les dents, la trompe & les ſix jambes ſont les principaux inſtrumens qui ont été accordés aux Ouvrieres pour exécuter leurs différens travaux. Les dents ſont deux petites écailles tranchantes, qui jouent horizontalement, & non de bas en haut comme les nôtres. La trompe, que l'Abeille déplie & alonge à

Des gâteaux où brille une ſi profonde géométrie, ſeroient-ils encore l'ouvrage d'Inſectes Géometres? Qui ne voit que plus l'ouvrage eſt

ſon gré, n'agit point à la maniere d'une pompe; je veux dire, que l'Abeille ne s'en ſert pas pour ſucer: elle eſt une ſorte de langue très-longue & garnie de poils; & c'eſt en léchant les fleurs, qu'elle ſe charge d'une liqueur qu'elle fait paſſer dans la bouche, pour deſcendre par l'œſophage dans un premier eſtomac, qui en eſt comme le réſervoir. On voit bien que cette liqueur eſt le miel: les Abeilles connoiſſent les petites glandes nectarifères, ſituées au fond du calice des fleurs & qui le contiennent. Quand elles en ont rempli leur réſervoir, elles vont le dégorger dans les cellules. Elles les en rempliſſent: elles l'y mettent en réſerve, en prenant la précaution de boucher les cellules avec un couvercle de cire. Mais il eſt d'autres cellules à miel, qu'elles ne bouchent point, parce que ce ſont des magaſins qui doivent reſter ouverts pour les beſoins journaliers de la communauté.

C'eſt encore ſur les fleurs que les Ouvrieres vont recueillir la matiere à cire ou la cire brute. Les pouſſieres des étamines ſont cette matiere. L'induſtrieuſe Abeille ſe plonge dans l'intérieur des fleurs qui abondent le plus en pouſſieres. Les petits poils branchus dont ſon corps eſt garni, ſe chargent de ces pouſſieres: l'Ouvriere les en détache enſuite à l'aide des broſſes dont ſes jambes ſont pourvues. Elle les raſſemble, & en forme deux pelotes que les jambes de la ſeconde paire vont placer dans une cavité en maniere de corbeille, qui ſe trouve à chaque jambe de la troiſieme paire. Chargée de ſes deux pelotes de matiere à cire, la diligente Abeille retourne à la ruche, & va les dépoſer dans une cellule deſtinée à les recevoir. Cette cellule devient ainſi un magaſin à cire, qui demeure ouvert. Mais l'Abeille ne ſe contente pas de ſe décharger ainſi de ſon fardeau: elle entre dans la cellule la tête la premiere, étend les deux pelotes, les pétrit & y diſtille un peu d'une liqueur ſucrée,

géométrique, & moins il ſuppoſe de géométrie dans l'Ouvrier? Il ſaute aux yeux que le Géometre eſt ici l'AUTEUR de l'Inſecte. Celui-ci exé-

Si la peine qu'elle a priſe à faire ſa récolte l'a trop fatiguée, une autre Abeille ſurvient qui ſe charge d'étendre & de pêtrir les pelotes; car tous les Ilotes de la petite Sparte ſont également inſtruits de tout ce qui ſe préſente à faire dans chaque cas particulier, & s'en acquittent également bien. Mais il n'arrive pas toujours que l'Abeille n'ait qu'à ſe plonger dans les fleurs pour en recueillir les pouſſieres au moyen de ſa toiſon: il eſt des circonſtances où cette récolte n'eſt point auſſi facile, & où elle exige de la part de l'Ouvriere d'autres manœuvres. Avant leur parfaite maturité, les pouſſieres ſont renfermées dans ces ſortes de capſules que les Botaniſtes ont nommées les *ſommets* des étamines: l'Ouvriere qui veut s'emparer des pouſſieres que les capſules n'ont point encore laiſſé échapper, eſt donc obligée d'ouvrir ces capſules, & elle le fait avec ſes dents: puis elle ſaiſit avec ſes premieres jambes les grains qui ſe préſentent à l'ouverture; les articulations qui terminent la jambe, font ici l'office de main. Les grains qu'elles ont ſaiſi, elles les donnent aux jambes de la ſeconde paire, qui après les avoir dépoſées dans la petite corbeille des jambes de la troiſieme paire, les y aſſujettiſſent en frappant deſſus à pluſieurs repriſes. La légere humidité des grains aide encore à les y retenir & à les lier les uns aux autres. L'Ouvriere répete les mêmes manœuvres, acheve de remplir ſes deux corbeilles, & ſe hâte de regagner ſa ruche, chargée de ſon butin.

Ces pouſſieres que les Abeilles recueillent ſur les fleurs, ne ſont pas cette même cire qu'elles mettent en œuvre avec tant d'induſtrie; elles n'en ſont que la matiere premiere; & cette matiere demande à être préparée ou digérée dans un eſtomac particulier, dans un ſecond eſtomac. C'eſt-là qu'elle devient de la véritable cire. L'Abeille la rejette enſuite par la bouche ſous la forme d'une bouillie ou d'une écume blanche, qui ſe fige

cute par une ſorte de méchanique un travail dont les KOENIG & les CRAMER calculent avec étonnement les admirables proportions, & dont

promptement à l'air. Tandis que cette ſorte de pâte eſt encore ductile, elle ſe prête facilement à toutes les formes que l'Abeille veut lui donner : elle eſt pour elle ce que l'argille eſt pour le Potier. Un grand Phyſicien qui a beaucoup philoſophé ſur le travail géométrique des Abeilles, a cru le réduire à ſa juſte valeur en le faiſant enviſager comme le ſimple réſultat d'une méchanique aſſez groſſiere. Il a penſé, que les Abeilles preſſées les unes contre les autres, faiſoient prendre naturellement à la cire une figure héxagone, & qu'il en étoit à cet égard des cellules des Abeilles, comme des boules d'une matiere molle, qui preſſées les unes contre les autres, revêtent la figure de dez à jouer. Je ſais gré à ce Phyſicien de s'être tenu en garde contre les ſéductions du merveilleux : je voudrois avoir à le louer encore ſur la juſteſſe de ſa comparaiſon ; mais on va voir qu'il s'en faut bien que le travail des Abeilles réſulte d'une méchanique auſſi ſimple que celle qu'il lui a plu d'imaginer.

On n'a pas oublié que les cellules des Abeilles ne ſont pas ſimplement des tubes héxagones : ces tubes ont un fond pyramidal, formé de trois pieces en loſanges ou de trois rhombes. Or, les Abeilles commencent par façonner un de ces rhombes ; & c'eſt de la ſorte qu'elles jettent les premiers fondemens de la cellule. Sur deux des côtés extérieurs de ce rhombe, elles élevent deux des pans de la cellule. Elles façonnent enſuite un ſecond rhombe, qu'elles lient avec le premier, en lui donnant l'inclinaiſon qu'il doit avoir, & ſur ces deux côtés extérieurs elles élevent deux nouveaux pans de l'héxagone. Enfin, elles conſtruiſent le troiſieme rhombe & les deux derniers pans. Tout cet ouvrage eſt d'abord aſſez maſſif & ne doit point demeurer tel. Les habiles Ouvrieres s'occupent enſuite à le perfectionner, à l'amincir, à le polir, à le dreſſer. Leurs dents leur tiennent lieu de rabot & de lime. Une vraie langue charnue, placée à

ils ignorent le ſecret. L'Intelligence qui connoîtroit à fond la ſtructure du corps de l'Abeille, y verroit, ſans doute, la petite Machine qui conſtruit ces cellules ſi régulieres & ſi économiquement régulieres. Elle jugeroit des effets que cette machine doit opérer, comme un Méchanicien juge de ceux d'un métier ou de toute autre machine.

Jugeons par ce trait ſi déciſif, des autres opérations des Abeilles. Penſerons-nous qu'elles ſoient moins méchaniques? N'avançons pas que les Abeilles, ainſi que tous les Animaux, ſont de pures machines, des horloges, des métiers, &c. Une Ame tient probablement à la machine : elle en ſent les mouvemens ; elle ſe plaît à ces mouvemens ; elle reçoit par la machine des impreſſions agréables ou déplaiſantes, & c'eſt cette *ſenſibilité* qui eſt le grand & l'unique mobile de l'Animal.

Cet exemple ſuffiroit ſeul pour faire ſentir à tout Lecteur judicieux, combien nous nous mé-

l'origine de la trompe, aide encore au travail des dents. Un bon nombre d'Ouvrieres ſe ſuccedent dans ce travail ; ce que l'une n'a qu'ébauché, une autre le finit un peu plus, une troiſieme le perfectionne, &c. ; & quoiqu'il ait paſſé ainſi par tant de mains, on le diroit jetté au moule.

prenons, quand nous prêtons ſi libéralement aux Animaux notre maniere de penſer, de raiſonner, & preſque notre génie. L'on n'a, pour s'en convaincre, qu'à appliquer à la conſtruction des gâteaux des Abeilles ces idées de raiſonnement que nous adoptons avec ſi peu de réflexion en faveur des Animaux, & l'on transformera tout d'un coup les Abeilles en Géometres ſublimes. Elles ſauront donc auſſi la Botanique; car elles connoiſſent très-bien, & peut-être mieux que nous, les parties ſexuelles des Plantes.

Malgré toute l'attention que les plus grands Obſervateurs ont donné aux Abeilles, elles ont encore plus de choſes intéreſſantes à nous montrer, qu'on n'en a découvert. Il faudroit ſurtout imaginer quelque moyen de les épier de plus près, lorſqu'elles travaillent à former ces petites lozanges qui ſont la baſe des cellules & la partie la plus recherchée de l'ouvrage. A force d'obſerver, on découvrira enfin des particularités qui décéleront le ſecret de la méchanique dont j'ai parlé. Les Abeilles ſont toujours attroupées en ſi grand nombre quand elles commencent à conſtruire un gâteau, qu'il n'eſt preſque pas poſſible d'appercevoir leur travail. Un point bien eſſentiel ſeroit de parvenir à ne faire travailler qu'un petit nombre d'Ouvrie-

res (10). L'Obſervateur ſait ſe retourner, inventer, & tirer des obſtacles mêmes, de nouvelles inſtructions & de nouvelles vues. L'étude de l'hiſtoire naturelle ſemble être celle qui perfectionne le plus la ſagacité de l'Eſprit.

REMARQUONS en finiſſant, la ſingularité des moyens que l'AUTEUR de la Nature a choiſis pour conſerver l'eſpece des Abeilles. Elle préſente trois ſortes d'Individus, qu'on diroit être eux-mêmes trois Eſpeces diſtinctes. Les Meres, preſque par-tout ſi occupées du ſoin de leurs Petits, ne ſont ici que leur donner le jour. D'autres Meres, des Meres nourrices les élevent, & ont pour eux autant d'attachement que ſi elles leur avoient donné naiſſance. Non-ſeulement elles les ſoignent, les nourriſſent, les défendent; mais elles conſtruiſent encore les nids ou les berceaux dans leſquels ils doivent croître; & la conſtruction de ces nids eſt ſi ſavante, le

(10) †† C'eſt ce que Mr. SCHIRACH avoit pratiqué bien des fois à l'occaſion de ſa nouvelle découverte ſur l'origine de la Reine-abeille. Il renfermoit une poignée d'Ouvrieres dans de petites caiſſes de bois avec un gâteau de trois à quatre pouces en quarré, qui ne contenoit que de jeunes Vers communs. Les Ouvrieres travailloient dans ces caiſſes à conſtruire des celules royales, & elles s'occupoient enſuite à approviſionner les Petits. Si au lieu de faire cette expérience dans des caiſſes de bois, on la faiſoit dans de petites ruches vitrées, on auroit une grande facilité à ſuivre toutes les manœuvres des Ouvrieres.

terrein & la matiere y ſont ſi habilement ménagés, qu'il n'y a qu'une géométrie tranſcendante qui puiſſe bien apprécier tout cela (11).

(11) On vient de voir dans la Note neuvieme, que le fond de chaque cellule eſt pyramidal, & que la pyramide eſt formée de trois rhombes égaux & ſemblables. Les angles de ces rhombes pouvoient varier à l'infini; c'eſt-à-dire, que la pyramide pouvoit être plus ou moins élevée ou plus ou moins écraſée. Le Savant MARALDI, qui avoit meſuré les angles des rhombes avec une extrême préciſion, avoit trouvé que les grands angles étoient en général de 109 degrés 28 minutes, & les petits de 70 degrés 32 minutes. Mr. de REAUMUR, qui ſavoit méditer ſur les procédés des Inſectes, avoit ingénieuſement ſoupçonné, que le choix de ces angles, entre tant d'autres qui auroient pu être également choiſis, avoit pour raiſon ſecrete l'épargne de la cire; & qu'entre les cellules de même capacité & à fond pyramidal, celle qui pouvoit être faite avec le moins de matiere, étoit celle dont les angles avoient les dimenſions que donnoient les meſures actuelles. Il propoſa donc à un habile Géometre, Mr. KŒNIG, qui ne ſavoit rien de ces dimenſions, de déterminer par le calcul, quelles devoient être les angles d'une cellule héxagone à fond pyramidal, pour qu'il entrât le moins de matiere poſſible dans ſa conſtruction. Le Géometre eut recours pour la ſolution de ce beau problême, à l'analyſe des infiniment petits, & trouva que les grands angles des rhombes devoient avoir 109 degrés 26 minutes, & les petits 70 degrés 34 minutes: accord ſurprenant entre la ſolution & les meſures actuelles! Mr. KŒNIG démontra encore, qu'en préférant le fond pyramidal au fond plat, les Abeilles ménagent en entier la quantité de cire qui ſeroit néceſſaire pour conſtruire un fond applati.

En raiſonnant d'après l'Hiſtorien des Inſectes ſur la forme géométrique des cellules des Guêpes & des Abeilles, l'illuſtre MAIRAN s'exprimoit ainſi: „ Que les Bêtes penſent ou ne „ penſent pas, il eſt toujours certain qu'elles ſe conduiſent en „ mille

„ mille occaſions comme ſi elles penſoient ; l'illuſion en cela, „ ſi c'en eſt une, nous avoit été bien préparée. Mais ſans pré- „ tendre toucher à cette grande queſtion, & quelle que ſoit la „ cauſe ; livrons-nous un moment aux apparences, & parlons „ le langage ordinaire.

„ Des Géometres, & il faut compter parmi eux Mr. de „ REAUMUR, ſe ſont exercés à faire ſentir tout l'art qu'il y „ avoit dans les gâteaux de cire, & dans ces guêpiers de papier, „ ſi ingénieuſement diviſés par étages ſoutenus de colonnes, „ & ces étages ou tranches par une infinité de cellules ſexan- „ gulaires. Ce n'eſt pas ſans fondement qu'on a obſervé que „ cette figure étoit entre tous les polygones poſſibles, le plus „ convenable ou même le ſeul convenable aux intentions qu'on „ eſt en droit d'attribuer aux Abeilles & aux Guêpes qui ſavent „ les conſtruire. Il eſt vrai que l'héxagone régulier ſuit néceſ- „ ſairement de l'appoſition des corps ronds, mous & flexibles, „ lorſqu'ils ſont preſſés les uns contre les autres, & que c'eſt „ apparemment pour cette raiſon qu'on le rencontre ſi ſou- „ vent dans la Nature, comme dans les capſules des graines „ de certaines Plantes, ſur les écailles de divers Animaux, & „ quelquefois dans les particules de neige, à cauſe des petites „ gouttes ou bulles d'eau ſphériques ou circulaires, qui ſe ſont „ applaties les unes contre les autres en ſe gelant. Mais il y a „ tant d'autres conditions à remplir dans la conſtruction des „ cellules héxagones des Abeilles & des Guêpes, & qui ſe trou- „ vent ſi admirablement remplies, que quand on leur diſpute- „ roit une partie de l'honneur qui leur revient de celle-ci, il „ n'eſt preſque plus poſſible de leur refuſer qu'elles n'y aient „ beaucoup ajouté par choix, & qu'elles n'aient habilement „ tourné à leur avantage cette eſpece de néceſſité que leur „ impoſoit la Nature ".

CHAPITRE XXVIII.

Les Bourdons.

†† Les Bourdons, qui ſont de vraies Abeilles républicaines, mais plus groſſes & plus velues que les Abeilles domeſtiques, leur ſont bien inférieurs dans l'art de bâtir : ils le ſont encore par leurs mœurs, par leur police & par leur population. Les Bourdons ſont de ſimples villageois qui logent ſous un humble toit de mouſſe, n'habitent que des hameaux, & ne s'occupent que d'ouvrages groſſiers, aſſortis à leur condition. Les Abeilles domeſtiques, au contraire, ſont des Citoyennes d'un grand Etat, bien policé, où les arts & les fabriques ſont en honneur.

Les ſociétés les plus nombreuſes de nos groſſes Mouches velues, ne ſont guere que de ſoixante à quatre-vingts membres. Il s'y trouve auſſi de trois ſortes d'Individus, des Mâles, des Femelles & des Neutres. Ceux-ci ſont communément les plus petits. Tous les Individus prennent une part à-peu-près égale aux travaux de la communauté.

Les Bourdons conſtruiſent leur nid dans les prairies. Ils ſavent carder avec leurs dents & leurs jambes la mouſſe dont ils le recouvrent. Ils donnent à la couverture la forme d'un petit dôme à-peu-près hémiſphérique, qu'ils plafonnent proprement avec de la cire. Quand on enleve cette couverture, on trouve au-deſſous deux ou trois gâteaux. Ils ne ſont pas faits de cire, & leurs cellules ne ſont pas héxagones: ce ſont des coques de ſoie, de figure ovale, & que ſe filent les Vers des Bourdons. Les unes ſont fermées, les autres ſont ouvertes & reſſemblent mieux à des cellules. Celles-là logent une Nymphe, celles-ci ont été ouvertes par la Mouche qui a pris l'eſſor.

Çà & là, entre les coques, on voit des amas de pâtée, de forme irréguliere, au centre deſquels repoſent des œufs ou des Vers. Parvenus à l'âge de maturité, ces Vers ne tardent pas à ſe conſtruire des coques qui augmentent l'étendue du gâteau. Mais il n'eſt pas entiérement compoſé de pareilles coques: on y obſerve en divers endroits, de petits vaſes de cire, façonnés par les Bourdons, & qu'ils rempliſſent de miel. C'eſt de ce miel dont ils ſe ſervent pour détremper la pâtée deſtinée à nourrir leurs Petits. Ils ſe nourriſſent eux-mêmes de ce miel

qui eſt toujours à leur portée dans les magaſins.

La maniere dont nos Abeilles ſauvages charient la mouſſe qu'elles emploient dans leur édifice, eſt tout-à-fait ingénieuſe. Un premier Bourdon, tournant le dos au nid, ſaiſit avec ſes dents & ſes premieres jambes quelques filamens de mouſſe : les premieres jambes donnent les filamens aux jambes poſtérieures, qui, les faiſant paſſer par-delà le derriere, les donnent à un ſecond Bourdon placé à la ſuite du premier : celui-ci tranſmet de même les filamens à un troiſieme Bourdon, qui les fait paſſer à un quatrieme, qui les pouſſe vers un cinquieme, &c. & c'eſt ainſi que la petite proviſion de mouſſe eſt conduite par une chaîne de Bourdons du lieu où elle eſt recueillie, juſqu'à celui où elle eſt miſe en œuvre.

Au bas du logement eſt une porte, à laquelle aboutiſſent des galeries en berceau, recouvertes de mouſſe comme le toit.

Lorsque la mouſſe vient à manquer dans les environs de la demeure, & que le logement exige des réparations, les Bourdons n'héſitent pas à ſe ſervir d'une partie de la mouſſe des

galeries pour fournir à la réparation. Ils montrent une grande ardeur dans ce travail, & la préſence de l'Obſervateur ne les arrête point.

Les Mâles & les Neutres périſſent en Automne, & il n'y a que les Femelles qui ſe conſervent pendant l'Hiver & bâtiſſent au retour du Printemps de nouveaux nids (1).

(1) On remarque chez les Bourdons deux ſortes de Neutres : les uns ſont auſſi grands que les Mâles; les autres ſont plus petits : mais tous travaillent également à la conſtruction ou aux réparations du nid. Voilà donc des Neutres dans un genre d'Abeilles, qui ſont bien tels d'origine, & qui ne doivent point leur état de Neutres à des cauſes accidentelles comme les Neutres des Abeilles domeſtiques. Ceci jetteroit quelque doute ſur l'opinion de Mr. Schirach, ſi elle n'étoit confirmée par un très-grand nombre d'expériences.



CHAPITRE XXIX.

Les Caſtors.

DE tous les Animaux qui vivent en ſociété, il n'en eſt point qui approchent plus de l'intelligence humaine, que les Caſtors (1). On eſt frappé d'étonnement & comme ſtupéfié à la vue de leurs ouvrages, & peu s'en faut qu'en liſant leur hiſtoire, l'on ne s'imagine lire celle d'une Eſpece d'Hommes. L'on ne ſait ce qu'on doit admirer le plus dans leurs travaux, de la grandeur & de la ſolidité de l'entrepriſe ou de l'art prodigieux, des vues fines & du deſſein général qui brillent de toutes parts dans l'exécution. Une ſociété de Caſtors ſemble être une Académie d'Ingénieurs, qui travaillent ſur des plans raiſonnés, qui les rectifient ou les modifient au beſoin, qui les ſuivent avec autant de conſtance que de préciſion, qui ſont tous animés du même eſprit, & qui réuniſſent leurs volontés & leurs forces pour un but commun, qui eſt toujours le bien général de la ſociété. En un mot, il falloit

(1) †† Mr. SARRASIN, Médecin du Roi de France à Quebec, eſt le Naturaliſte qui nous a donné les meilleures obſervations ſur les Caſtors.

découvrir les Caſtors pour les juger poſſibles. Un Voyageur qui les ignoreroit, & qui viendroit à rencontrer leurs habitations, croiroit être chez un Peuple de Sauvages très-induſtrieux.

C'EST vers les mois de Juin ou de Juillet que les Caſtors ſe forment en corps de ſociété, au nombre de deux à trois cents. Ils s'aſſemblent aux bords des lacs ou des rivieres. On ſait qu'ils ſont amphibies. Il leur importe ſur-tout de ſe rendre maîtres des eaux au milieu deſquelles ils bâtiſſent, & de prévenir les effets de leurs crues & de leurs baiſſes. Ils y parviennent, comme nous, par des digues & par des écluſes. Le niveau des eaux d'un lac varie peu & lentement: ſi donc ils s'établiſſent ſur un lac, ils ſe diſpenſent des frais d'une digue; mais ils ne manquent point d'en élever une s'ils s'établiſſent ſur une riviere.

CETTE digue eſt quelquefois un ouvrage immenſe, & qu'on ne comprend point que des Brutes ayent pu projetter, commencer & finir. Repréſentez-vous une riviere de quatre-vingts ou cent pieds de largeur; il s'agit de rompre l'effort de ſon courant. Les Caſtors conſtruiſent donc une digue ou une chauſſée de quatre-vingts ou cent pieds de longueur, ſur dix à douze

d'épaiſſeur à ſa baſe. Rien de plus vrai ni de moins vraiſemblable, & quand on l'a vu & revu, on veut le revoir encore pour le croire.

Les Caſtors n'ont reçu pour tous inſtrumens que quatre fortes dents inciſives, quatre pieds, dont les deux antérieurs ſont garnis d'eſpeces de doigts, & une queue écailleuſe faite en maniere de pelle ovale. C'eſt pourtant avec de pareils inſtrumens qu'ils maîtriſent les eaux, & qu'ils oſent défier nos Maçons & nos Charpentiers, munis de leur truelle, de leur plomb & de leur hache.

S'ils trouvent ſur le bord de la riviere un grand arbre, ils le coupent par le pied; ils l'ébranchent pour le coucher ſuivant ſa longueur & en faire la principale piece de la digue. Tandis qu'une partie des Caſtors s'occupent à ce travail, d'autres vont chercher de plus petits arbres, qu'ils coupent & taillent en forme de pieux, & qu'ils voiturent d'abord par terre, enſuite par eau, juſqu'au lieu où ils doivent être employés. Ils conſtruiſent avec ces pieux un pilotis, qu'ils fortifient en entrelaçant entre les pieux des branches d'arbres. En même temps d'autres Caſtors apportent une ſorte de mortier qu'ils ont pêtri avec leurs pieds. Ils le font entrer dans les vuides

du pilotis, & le battent enſuite avec leur queue. Ils plantent ainſi pluſieurs rangs de pilotis dont tout l'intérieur eſt ſolidement maçonné. Sur le haut de la digue ils pratiquent deux à trois ouvertures pour ménager des décharges à l'eau, & ils ſavent les élargir ou les rétrécir ſelon que la riviere hauſſe ou baiſſe. Si par l'impétuoſité de ſon courant elle fait une breche à la digue, ils ſe mettent auſſi-tôt à la réparer.

La digue eſt proprement un ouvrage public auquel tous les Caſtors travaillent de concert. Dès qu'il eſt achevé, la grande ſociété ſe partage en pluſieurs ſociétés particulieres, qui prennent chacune leur quartier & s'y conſtruiſent une habitation commode. Cette habitation eſt une maniere de hutte ou de cabane, ovale ou ronde, à un ou pluſieurs étages, bâtie ſur un pilotis plein & qui ſert à la fois de fondement & de plancher. Les murs ont environ deux pieds d'épaiſſeur, & ſont très-bien maçonnés. Les parois ſont revêtues d'une ſorte de ſtuc appliqué avec tant de propreté, qu'il ſemble que la main de l'Homme y ait paſſé; & ce n'eſt pourtant que la queue du Caſtor qui exécute cela. Le plancher eſt couvert d'un tapis de verdure, ſur lequel ils ne ſouffrent jamais de ſaletés. La cabane a toujours deux iſſues ou ſorties, l'une

pour aller à terre, l'autre pour aller à l'eau. Les plus grandes cabanes ont huit à dix pieds de diametre ; les plus petites, quatre à cinq. Celles-là logent ſeize, dix-huit ou vingt Caſtors ; celles-ci deux, ſix ou huit Caſtors. Il y a toujours autant de Mâles que de Femelles.

Leur nourriture ordinaire eſt l'Ecorce de quelque bois tendre, comme l'Aune, le Peuplier, le Saule. Ils en font des amas pour l'Hiver, qu'ils renferment dans des magaſins placés ſous l'eau. Chaque cabane a ſon magaſin où tous les membres de la petite ſociété vont puiſer (2).

Les plus grandes bourgades des Caſtors ſont de vingt à vingt-cinq maiſons ; mais de telles bourgades ſont rares. Les plus communes ſont de dix à douze. Chaque république a ſon diſtrict, & ne ſouffre point d'Etranger.

Ici l'union du Mâle & de la Femelle ſemble être moins l'effet de la néceſſité que du choix. Après avoir travaillé de concert avec les autres Caſtors aux ouvrages publics & particuliers,

(2) †† Les Caſtors préferent le bois verd & non flotté au bois ſec. Ils coupent menu celui dont ils font proviſion, & la proviſion pour huit ou dix Caſtors eſt de 25 ou 30 pieds en quarré, ſur 8 à 10 de profondeur.

l'heureux couple goûte les douceurs domeſtiques & tous les plaiſirs attachés à la ſociété conjugale.

La Femelle fait communément deux à trois Petits, & elle a été chargée ſeule des ſoins de l'éducation. Le Mâle ne les partage point. Il s'abſente alors de la maiſon ; il y revient néanmoins de temps en temps ; mais il n'y ſéjourne pas.

Lorsque de grandes inondations viennent à endommager les établiſſemens des Caſtors, toutes les ſociétés particulieres ſe réuniſſent pour concourir aux réparations néceſſaires. Si les Chaſſeurs leur déclarent une guerre cruelle, s'ils détruiſent entiérement leur digue & leurs cabanes, ils ſe diſperſent dans la campagne, ſe réduiſent à la vie ſolitaire, ſe creuſent des terriers, & ne montrent plus cette induſtrie que nous venons d'admirer.

CHAPITRE XXX.

Réflexions sur les Castors.

Les Castors semblent faits pour confondre tous nos raisonnemens. Leur réunion en grand corps de société pour travailler de concert à des ouvrages immenses ; leur division en petites familles ou en sociétés particulieres, chargées de la construction des maisonnettes ; la nature de ces ouvrages, leur grandeur, leur solidité, leur propreté, leur appropriation si marquée à un but général, qui renferme tant de fins subordonnées ; en un mot, leur ressemblance presque parfaite avec les ouvrages que les Hommes construisent dans les mêmes vues ; tout cela donne au travail des Castors une supériorité bien décidée sur celui des Abeilles, & paroît indiquer qu'il est bien moins méchanique. En effet, abattre des Arbres choisis à dessein, les tailler, les débiter, en faire de grandes pieces de traverse, les mettre en place, couper de plus petits Arbres, en former des pieux, planter dans une riviere plusieurs rangs de ces pieux, les entrelacer de branches d'Arbres, pour les fortifier & les lier les uns aux autres ; pêtrir du mortier,

& maçonner ſolidement l'intérieur des pilotis ; procurer à tout cet aſſemblage la forme, les proportions & la ſolidité d'une grande digue ; établir ſur cette digue des eſpeces d'écluſes, les ouvrir & les fermer ſelon que les eaux hauſſent ou baiſſent ; bâtir derriere la digue des maiſonnettes à un ou pluſieurs étages, les fonder ſur un pilotis plein, les maçonner au-dehors, les incruſter ou les revêtir au-dedans d'une couche de ſtuc, appliquée avec autant de préciſion que de propreté ; couvrir les planchers d'un tapis de verdure ; ménager dans les murs des jours & des ſorties pour différens beſoins ; conſtruire des magaſins & les remplir de proviſions ; réparer avec diligence toutes les breches qui ſurviennent aux ouvrages publics, & ſe réunir de nouveau en grand corps de ſociété pour travailler en commun à ces réparations : voilà des traits étonnans d'une induſtrie, qui ſembleroit ſuppoſer chez les Caſtors, un rayon de cette lumiere qui éleve l'Homme ſi fort au-deſſus de tous les Animaux.

DÉFIONS-NOUS cependant de ces premiers mouvemens de l'admiration. L'admiration ſaiſit trop fortement ſon objet, & ne ſouffre guere que la raiſon l'apprécie. Aſſurément il n'en eſt pas de la conſtruction d'une grande digue & de

celle d'une maiſon, comme de la conſtruction d'un gâteau de cire & de celle de cellules héxagones à fond pyramidal. On ſent que le gâteau & les cellules pourroient être, en quelque ſorte, jetés au moule; mais il n'y a point de moule pour une digue & pour une maiſon. Vous ne prendrez pas au pied de la lettre une expreſſion figurée. Le travail des Abeilles n'eſt pas moulé, comme un Phyſicien voudroit nous le perſuader ſur des comparaiſons déceptrices. Il eſt façonné, pour ainſi dire, à la main; mais cette main peut opérer méchaniquement. On ne ſauroit comparer la récolte, la préparation & l'emploi des pouſſieres des étamines, à la collection, la préparation & l'emploi des matériaux d'une digue. Les ouvrages des Caſtors ſont certainement d'une toute autre nature que ceux des Abeilles; ils affectent avec les nôtres une foule de rapports qui les feroient juger réfléchis, ſi l'on cédoit aux premieres impreſſions, & ſi l'on n'analyſoit point les idées que le mot de réflexion repréſente.

Les Caſtors ne ſont ſûrement pas plus Ingénieurs ou Architectes, que les Abeilles ne ſont Géometres. Ne voit-on pas, que ſi les Caſtors avoient nos notions de Génie & d'Architecture, les Caſtors d'aujourd'hui ne bâtiroient pas préciſément comme ceux du temps de Vespuce?

L'Eſprit humain combine & perfectionne ſans ceſſe ; l'Eſprit des Caſtors ne combine & ne perfectionne jamais. Si ſeulement ils élevoient une fois des cabanes quarrées ; mais ce ſont éternellement des cabanes rondes ou ovales. Ils ſe meuvent, comme les Planetes, dans le cercle que la Nature leur a tracé, & ne le franchiſſent jamais. En vain objecteroit-on, que les Sauvages d'aujourd'hui bâtiſſent comme ceux d'autrefois : ſi les Sauvages ne perfectionnent pas, ils n'en ont pas moins la faculté de le faire. Leur cerveau eſt organiſé comme le nôtre ; ils ſont doués de la parole ; ils pratiquent entr'eux un certain droit des Gens, fort ſupérieur à toute la police des Caſtors. Et ſi jamais il s'élevoit au milieu de ces Nations groſſieres, des VAUBANS & des PERRAULTS, leurs bourgades deviendroient des villes, & leurs cabanes des palais. Attendrez-vous des VAUBANS & des PERRAULTS chez les Caſtors ? Le limon avec lequel la Nature a pêtri ces Animaux, n'eſt point celui avec lequel elle pêtrit les Architectes ; mais elle paroît quelquefois faire des Architectes & des Géometres, quand elle ne fait que des Manœuvres & des Automates. Chaque Animal a reçu ſes dons particuliers & ſa meſure d'induſtrie, relatifs à ſa deſtination. Il en eſt où le méchanique eſt ſi palpable, que nous ne pouvons nous le diſſi-

muler. Il en eſt d'autres où il eſt déguiſé ſous une apparence de réflexion & de génie qui nous ſéduit d'autant plus ſûrement, que nous aimons davantage à l'être. D'ailleurs, il nous eſt bien plus facile de faire raiſonner la Brute en Homme, que l'Homme en Brute.

AVOUONS-LE, les Caſtors ſeront toujours pour les Philoſophes une énigme indéchiffrable. Ils ſont doués d'une ſorte d'intelligence qui ſemble les placer entre l'Homme & les autres Animaux. Qu'il me ſoit permis néanmoins de haſarder une conjecture, que je ne donne que pour ce qu'elle eſt. La doctrine des idées innées, qui a eu jadis tant de partiſans, & qui a été depuis ſi ſolidement réfutée, ne ſeroit-elle point applicable aux Brutes? La Brute eſt en naiſſant ce qu'elle ſera toute ſa vie. Ses coups d'eſſai ſont toujours des coups de Maître. Point de tâtonnemens, point de mépriſes proprement dites. Les jeunes Abeilles travaillent auſſi réguliérement que les plus expérimentées. Des Oiſeaux qui n'ont jamais vu de nid, nichent comme leurs Aïeux.

LES Caſtors n'ont point d'école où la Jeuneſſe étudie. Les Abeilles, les Oiſeaux, les Caſtors n'apporteroient-ils donc point en naiſſant des idées de gâteaux, de nid, de digue, de cabane?

cabane? Leur corps n'auroit-il point été conſtruit & monté ſur des rapports déterminés à ces idées? Ne repréſenteroit-il point par ſes mouvemens divers, l'eſpece, la ſuite & l'ordre de ces idées? Mais on convient aſſez que les idées tirent leur origine des ſens, & cela ne ſauroit ſouffrir de difficulté à l'égard des Animaux; puiſque toutes leurs idées ſont purement ſenſibles. Elles tiennent donc toutes aux ſens: il eſt même probable, que chaque idée a dans le cerveau des fibres qui lui ſont appropriées: nous l'avons vu ailleurs (1).

Ainsi nous ne penſerons pas que l'Ame de l'Animal naiſſant renferme actuellement toutes les idées relatives à ſa conſervation & à celle de ſon Eſpece: mais nous ſuppoſerons que le cerveau contient actuellement des fibres propres à exciter dans l'Ame ces idées, à les y exciter dans un certain ordre & relativement à telle ou telle circonſtance où l'Animal ſe rencontrera quelque jour. Ce ne ſeroient donc pas proprement des idées innées que nous admettrions; ce ſeroient des *fibres innées*. Suivant cette hypotheſe, le cerveau des Caſtors contiendroit originairement un aſſemblage de fibres propres à repréſenter à l'Ame

(1) Part. V, Chap. III & VI.

une digue, une cabane, des pilotis, &c. & l'exécution de tout cela. Il y auroit ainſi dans l'Animal deux ſyſtêmes particuliers, qui correſpondroient l'un à l'autre; un ſyſtême repréſentatif, qui auroit ſon ſiege dans le cerveau, & un ſyſtême exécutif, qui réſideroit dans les membres & les autres organes deſtinés à exécuter les repréſentations ou à les réaliſer. Et comme ces deux ſyſtêmes auroient été calculés ſur des rapports déterminés aux différentes circonſtances où l'Animal pouvoit ſe rencontrer, il ſeroit bien naturel que leur jeu variât relativement à la diverſité des ſituations de l'Animal & à ſes beſoins actuels. Le Lecteur a ſaiſi ma penſée : il voudra bien préſumer aſſez favorablement de moi, pour n'imaginer pas que je croie avoir trouvé le vrai mot de l'énigme : je n'ai fait que ſubſtituer à ce mot un terme qui le repréſente (2).

(2) †† Les légeres conjectures que je propoſois ici pour eſſayer de rendre raiſon de l'étonnante induſtrie des Caſtors, ne ſauroient être bien ſaiſies que par ceux de mes Lecteurs qui ont quelque connoiſſance des principes de l'*Eſſai analytique ſur l'Ame*. Toutes nos idées dérivent originairement des ſens, & les ſens communiquent avec le cerveau. Ils lui tranſmettent donc les diverſes impreſſions qu'ils reçoivent des objets. Mais ces impreſſions ne s'effacent pas au moment que les objets ont ceſſé d'agir ſur les ſens & par les ſens ſur le cerveau : elles ſont plus ou moins durables ; & c'eſt à la faculté qui les conſerve qu'on a donné le nom de *mémoire*. Des cauſes, des accidens qui ne ſauroient affecter que le cerveau, affoibliſſent & détruiſent

Au reſte, que les Caſtors ne déploient leur induſtrie & leurs talens que dans l'état de ſociété, qu'ils ceſſent de travailler quand ils ſont réduits à vivre ſolitaires ou priſonniers, qu'ils paroiſſent alors preſque ſtupides, cela n'eſt pas plus ſurprenant que la langueur & l'inaction totale où tombent les Abeilles privées de leur Reine. Cinq ou ſix Abeilles ſéparées de leur ruche ne conſtruiroient pas le moindre alvéole,

même la mémoire. Cette faculté a donc dans le cerveau un ſiege phyſique, & ce ſiege peut-il être autre choſe que les dernieres ramifications des fibres des ſens? Et ſi ces fibres retiennent pendant un temps plus ou moins long les impreſſions des objets, n'eſt-on pas fondé à en inférer qu'elles ſont organiſées de maniere que les objets y produiſent des déterminations durables, en vertu deſquelles elles rappellent à l'Ame les idées des objets? Mais les fibres ou les très-petits organes qui ſont le ſiege de la mémoire, communiquent les uns aux autres, puiſque les idées de tout genre ſe rappellent les unes les autres: l'ordre dans lequel ces petits organes s'ébranleront, déterminera donc la ſuite & l'eſpece des idées qui ſeront reproduites. Si donc l'on ſuppoſe, que le cerveau d'un certain Animal a été originairement conſtruit de maniere que ſes fibres peuvent exciter dans l'Ame une ſuite ordonnée de différentes idées analogues à celles que nous recevons par l'éducation; que ces fibres, par exemple, excitent dans l'Ame de l'Animal les idées d'un certain travail ou d'une certaine ſuite d'opérations, nous concevrons juſqu'à un certain point, comment cet Animal peut du premier coup & ſans éducation exécuter à point nommé ce travail ou ces opérations. Le Lecteur me comprendra peut-être un peu mieux, s'il prend la peine de conſulter le Chapitre VI de la Partie V. Je ne fais dans le moment que rappeller les principes les plus généraux de mon ſujet.

pas même un ſeul pan de cet alvéole. Cette ſorte de ſolitude ne les priveroit pas néanmoins de leurs talens ni de leurs organes. Mais les Abeilles républicaines ont été appellées à vivre en ſociété : elles ont été organiſées pour cet état : la ſolitude laiſſe leurs organes dans l'inaction, ils y manquent de mobile. D'autres Abeilles, appellées à vivre ſolitaires (3), ont été organiſées dans un rapport à cette deſtination différente : chaque Individu exécute donc par ſes ſeules forces des ouvrages admirables, qui ſont ailleurs le produit des forces réunies d'un grand nombre d'Individus. Les Caſtors n'avoient pas été organiſés principalement pour la ſolitude ; ils l'avoient été principalement pour la ſociété. C'étoit elle qui devoit mettre leurs talens en valeur & leurs organes en exercice. La ſolitude laiſſe la plus grande partie de ces reſſorts ſans action & ſans vie.

Les Caſtors demanderoient encore à être étudiés, & par des Obſervateurs que le merveilleux ne ſéduisît jamais. Il faudroit tenter de les dérouter en leur oppoſant différens obſtacles, en modifiant plus ou moins la forme de leurs ouvrages, en ſubſtituant adroitement à leurs matériaux des matériaux étrangers, &c. Un bon

(3) Voyez le Chapitre V de cette Partie.

nombre d'expériences faites dans cet eſprit philoſophique, porteroit la lumiere dans les recoins où nous ne voyons que ténebres.

CHAPITRE XXXI.

Les Rats muſqués.

†† Le Caſtor, Habitant du Canada, a un Compatriote qui lui reſſemble un peu par la forme, par la couleur, par le poil, par le duvet épais placé au-deſſous, & plus encore par les mœurs & l'induſtrie (1) : je parle du Rat muſqué, qui n'eſt pas plus gros qu'un petit Lapin, & qui établit ſa demeure dans les marais, ou ſur le bord des lacs & des rivieres. Il ſait, comme le Caſtor, ſe conſtruire des maiſonnettes où pluſieurs familles logent enſemble. Ce ſont des huttes rondes, dont la forme ſe rapproche de celle des ruches d'Abeilles en panier. Leur grandeur eſt proportionnée au nombre des Rats qui ſe ſont réunis pour les conſtruire. Les plus

(1) Les Sauvages diſent que le Caſtor & le Rat muſqué ſont freres ; mais que le Caſtor, beaucoup plus gros, eſt l'aîné, & qu'il eſt plus intelligent. On prendroit au premier coup-d'œil un vieux Rat muſqué & un Caſtor d'un mois pour deux Animaux de même Eſpece.

les Pays chauds, ne ſe conſtruiſent point de tels logemens : ils ſe contentent de ſe creuſer des terriers comme les Lapins (2).

(2) L'Hiſtorien des Rats muſqués du Canada, Mr. SARRASIN, regrettoit de n'avoir pu les ſuivre dans leur travail ingénieux; mais il avoit au moins pénétré bien avant dans leur anatomie, & y avoit découvert des particularités très-remarquables. Je n'en indiquerai que quelques-unes. Le muſcle peaucier eſt ſi puiſſant, qu'en ſe contractant il raccourcit tout le corps. Les fauſſes-côtes ont auſſi une telle ſoupleſſe, qu'elles permettent à l'Animal de paſſer par des trous où des Animaux plus petits ne ſauroient paſſer. Dans les temps du rut, qui tombent en Été, les teſticules, placés près de l'anus, ſont auſſi gros qu'une muſcade, & rentrent dans l'intérieur & diſparoiſſent entiérement dans les temps intermédiaires. Il en eſt de même des follicules qui contiennent le muſc, ſous la forme d'une liqueur laiteuſe, & qui touchent aux parties ſexuelles. Enfin, l'uretre s'ouvre chez la Femelle dans une éminence velue & percée, placée ſur l'os pubis. Je dois ajouter, que le Rat muſqué n'a point les doigts des pieds de derriere unis par des membranes comme le Caſtor : ſon genre de vie n'eſt pas préciſément le même.

DOUZIEME PARTIE.

SUITE DE L'INDUSTRIE DES ANIMAUX.

CHAPITRE PREMIER.

Généralités ſur les procédés induſtrieux de divers Inſectes, relatifs à leurs Métamorphoſes.

Ce ſont les procédés d'Animaux ſolitaires que nous allons parcourir. S'ils n'affectent pas ce grand air de réflexion & de prudence, cette lueur de génie, cette apparence de police & de législation, qui nous frappent dans ceux des Animaux ſociables, ils ne laiſſent pas de nous intéreſſer, ſoit par leur ſimplicité & leur ſingularité, ſoit par leur diverſité & leur appropriation à une fin commune, dont ils ſont les moyens ingénieux & naturels. Après avoir contemplé le gouvernement, les mœurs & les travaux d'une République, l'on peut ſe plaire encore à conſidérer la vie & les occupations d'un Solitaire, & à paſſer ainſi des monumens de Rome à la cabane

les Pays chauds, ne ſe conſtruiſent point de tels logemens : ils ſe contentent de ſe creuſer des terriers comme les Lapins (2).

(2) L'Hiſtorien des Rats muſqués du Canada, Mr. SARRASIN, regrettoit de n'avoir pu les ſuivre dans leur travail ingénieux; mais il avoit au moins pénétré bien avant dans leur anatomie, & y avoit découvert des particularités très-remarquables. Je n'en indiquerai que quelques-unes. Le muſcle peaucier eſt ſi puiſſant, qu'en ſe contractant il raccourcit tout le corps. Les fauſſes-côtes ont auſſi une telle ſoupleſſe, qu'elles permettent à l'Animal de paſſer par des trous où des Animaux plus petits ne ſauroient paſſer. Dans les temps du rut, qui tombent en Été, les teſticules, placés près de l'anus, ſont auſſi gros qu'une muſcade, & rentrent dans l'intérieur & diſparoiſſent entiérement dans les temps intermédiaires. Il en eſt de même des follicules qui contiennent le muſc, ſous la forme d'une liqueur laiteuſe, & qui touchent aux parties ſexuelles. Enfin, l'uretre s'ouvre chez la Femelle dans une éminence velue & percée, placée ſur l'os pubis. Je dois ajouter, que le Rat muſqué n'a point les doigts des pieds de derriere unis par des membranes comme le Caſtor : ſon genre de vie n'eſt pas préciſément le même.

DOUZIEME PARTIE.

SUITE DE L'INDUSTRIE DES ANIMAUX.

CHAPITRE PREMIER.

Généralités ſur les procédés induſtrieux de divers Inſectes, relatifs à leurs Métamorphoſes.

Ce ſont les procédés d'Animaux ſolitaires que nous allons parcourir. S'ils n'affectent pas ce grand air de réflexion & de prudence, cette lueur de génie, cette apparence de police & de législation, qui nous frappent dans ceux des Animaux ſociables, ils ne laiſſent pas de nous intéreſſer, ſoit par leur ſimplicité & leur ſingularité, ſoit par leur diverſité & leur appropriation à une fin commune, dont ils ſont les moyens ingénieux & naturels. Après avoir contemplé le gouvernement, les mœurs & les travaux d'une République, l'on peut ſe plaire encore à conſidérer la vie & les occupations d'un Solitaire, & à paſſer ainſi des monumens de Rome à la cabane

d'un ROBINSON. Ces ouvrages que les Animaux ſociables exécutent, & qui nous étonnent autant par leur grandeur que par la beauté de leur ordonnance, réſultent du concours de quantité d'Individus. Ils ont à paſſer par différentes mains: les unes les ébauchent, les autres les perfectionnent, d'autres les finiſſent. Les ouvrages des Animaux ſolitaires partent d'une ſeule tête; la même main qui les commence, les continue, les acheve, les répare. Chaque Individu a reçu ſon talent particulier, ſon tour d'adreſſe, par lequel il ſe ſuffit à lui-même, & pourvoit à tout.

ARRÊTONS-NOUS ici aux procédés relatifs à la métamorphoſe: c'eſt une grande affaire pour un de nos Hermites, que de s'y préparer. Sa conſervation dépend des précautions auxquelles il a recours à l'approche de cette époque, la plus importante de ſa vie. Les Chenilles nous offrent ſeules des exemples de preſque tous les procédés que la Nature a enſeignés aux Inſectes en ce genre. Bornons-nous ſur-tout à cette claſſe.

CHAPITRE II.

Les Chenilles qui ſe ſuſpendent par le derriere.

VOUS avez vu (1) que la Chryſalide ne peut agir, & pourquoi. C'eſt la Chenille qui fait tout, & doit tout faire. Le point le plus eſſentiel eſt de mettre la Chryſalide en état de ſe tirer ſans riſque du fourreau de Chenille. Pour y parvenir, les Chenilles ont divers moyens. Le plus ſimple eſt de ſe ſuſpendre par le derriere (2). Elles filent ſur quelque appui un petit monticule de ſoie; elles y cramponnent fortement leurs deux dernieres jambes, & ſe pendent ainſi la tête en en-bas. Dans cette attitude ſinguliere, elles ſubiſſent leur métamorphoſe à découvert. Le fourreau de Chenille s'ouvre, & laiſſe paroître la Chryſalide. De moment en moment elle ſe dégage davantage. Mais, que deviendra-t-elle quand elle aura entiérement abandonné le four-

(1) Part. IX, Chap. X, &c.

(2) †† Ce procédé eſt commun à ces Chenilles demi-velues, qui ont été nommées *épineuſes*, parce que leurs poils reſſemblent à des épines. L'Ortie nourrit de ces Chenilles, ſur leſquelles il eſt très-facile de ſuivre les petites manœuvres que je décris dans ce Chapitre. On les trouve au Printemps.

reau ? Comment ſe ſoutiendra-t-elle en l'air ? Comment parviendra-t-elle à s'accrocher au même endroit où la Chenille l'étoit auparavant ? Elle a une petite queue, & cette queue eſt garnie de crochets. Tout ſon corps eſt encore très-ſouple. Avec ſes anneaux, comme avec des mains, elle ſaiſit une portion du fourreau & s'y cramponne. Un inſtant après elle alonge ſa partie poſtérieure, & ſaiſit avec d'autres anneaux une portion plus élevée du fourreau. Elle rampe ainſi à reculons ſur la dépouille comme ſur un gradin, & parvient enfin à accrocher ſa queue au monticule de ſoie. Le voiſinage de la dépouille l'incommode ; elle ſe met à pirouetter ſur elle-même pour la faire tomber, & en vient ordinairement à bout. Probablement ces pirouettes n'ont pas une fin auſſi raiſonnée qu'un grand Admirateur des Inſectes paroît l'avoir cru : l'attouchement de la dépouille irrite plus ou moins la peau très-délicate de la Chryſalide, & met celle-ci en mouvement. Comme elle eſt ſuſpendue par un fil, il eſt bien naturel qu'elle pirouette, & que la dépouille cede à ces petites impulſions réitérées. Il y a une infinité de pareils faits qu'on exalte trop, & où il ne faut pas chercher plus de merveilleux qu'il n'y en a ici.

CHAPITRE III.

Les Chenilles qui ſe lient avec une ceinture.

Il ne convenoit pas à d'autres Chenilles d'être pendues de cette maniere. Il falloit que leur corps fût un peu aſſujetti contre l'appui, & la Nature leur en a enſeigné le moyen. Elles ſe paſſent autour du corps une ceinture, faite de l'aſſemblage de quantité de fils de ſoie, dont les bouts ſont collés à l'appui. Elles cramponnent auſſi leurs dernieres jambes dans un monticule de ſoie. Il eſt tout ſimple, après cela, que la Chryſalide ſe trouve liée & cramponnée comme l'étoit la Chenille. La ceinture eſt lâche, & laiſſe à la Chryſalide la liberté d'exécuter ſes petites manœuvres (1).

(1) †† Quoique le procédé dont je parle dans ce Chapitre ſoit aſſez ſimple, il ne laiſſe pas d'offrir des variétés remarquables chez les différentes Eſpeces de Chenilles qui y ont recours. Toutes ne s'y prennent pas de la même maniere pour filer leur ceinture & la paſſer autour de leur corps. Une aſſez belle Chenille, très-commune ſur le Chou, & une autre plus belle encore, qui vit ſur le Fenouil, & qui eſt ſur-tout caractériſée par une corne charnue placée près de la tête, & qu'elle fait ſortir & rentrer à volonté, ſont au nombre des Eſpeces où il eſt le plus facile d'obſerver le procédé dont il s'agit. Ces Chenilles paroiſſent en Été.

CHAPITRE IV.

Les Chenilles qui ſe conſtruiſent des coques.

BEAUCOUP d'autres Eſpeces recourent à des pratiques bien différentes pour ſe préparer à la métamorphoſe. Elles ſe renferment dans des coques, où elles ſubiſſent à couvert leurs tranſformations. A qui le Ver-à-ſoie n'a-t-il pas fait connoître cette induſtrie ? Mais on ſe tromperoit ſi l'on penſoit que toutes les Chenilles qui ſe conſtruiſent des coques travaillent ſur le modele du Ver-à-ſoie. Leurs fabriques ſe diverſifient autant que celles qui nous fourniſſent nos habits & nos meubles. Nous avons à regretter que notre marche ne nous permette pas de nous arrêter dans ces petits atteliers, pour y conſidérer de plus près les procédés ingénieux & variés des Ouvrieres, la forme & les effets des Inſtrumens qu'elles mettent ſi adroitement en œuvre : mais nous prendrons au moins une légere idée de leur travail & de la diverſité de leurs manœuvres.

LES coques les plus généralement connues ſont de pure ſoie. Telle eſt celle de ce Ver qui

fournit tant à notre luxe. Leur forme eſt ordinairement ovale. Elles la doivent au corps même de l'Inſecte, ſur lequel elles ſont comme moulées (1). Tandis qu'il travaille, il ſe contourne

(1) †† Il faut pourtant que je le faſſe remarquer : toutes les Chenilles qui ſe filent des coques de ſoie ne les modelent pas ſur leur propre corps ; je veux dire, qu'elles n'y ſont pas toujours renfermées tandis qu'elles en tracent les contours & qu'elles en fabriquent le tiſſu. Mr. de GEER nous a donné la curieuſe hiſtoire d'une très-petite Chenille mineuſe qui s'y prend d'une maniere fort ſinguliere pour conſtruire ſa coque. On regrette que cette coque ſoit ſi petite, & qu'il faille le ſecours de la loupe pour la bien voir ; car c'eſt un vrai chef-d'œuvre en ce genre. Elle eſt ornée de jolies cannelures qui s'étendent dans toute ſa longueur. Sa forme ovale & très-alongée, imite celle d'une navette ou d'un bateau renverſé. Concevez qu'une ſemblable coque eſt partagée en deux tranſverſalement : l'Ouvriere commence par en tricoter une moitié ; mais tandis qu'elle la tricote, elle ſe tient au-dehors, & il n'y a que ſa tête & ſes premieres jambes qui s'appliquent au tiſſu pour l'étendre en tout ſens. Elle travaille donc à-peu-près comme nos tricoteuſes. A meſure qu'elle prolonge le tiſſu, elle va à reculons, en ſe tenant toujours en alignement avec la longueur de la coque commencée. Quand elle a achevé de tracer les contours de la premiere moitié de la coque & d'en fabriquer le tiſſu, elle y entre la tête la premiere, ſe retourne bout par bout & ſe met à travailler à la ſeconde moitié. Elle porte ſa tête en avant & alonge ſon corps comme pour meſurer la longueur que doit avoir la partie de la coque qui lui reſte à conſtruire. Elle en façonne d'abord l'extrémité pointue, & à meſure qu'elle prolonge le tiſſu, elle retire ſon corps en arriere en le faiſant rentrer dans la premiere moitié. Lorſque les bords des deux moitiés ſont prêts à ſe toucher, la Chenille n'a plus qu'à tendre des fils de l'un à l'autre pour les réunir.

en maniere d'S ou de demi-anneau, & l'on voit aſſez que les fils dont il s'enveloppe alors, doivent tracer autour de lui un ovale plus ou moins alongé. La coque eſt une eſpece de pelotton produit par les circonvolutions d'un même fil. Je me ſers là d'une comparaiſon groſſiere & peu exacte : il y a bien plus d'art dans la conſtruction d'une coque, que dans la formation d'un pelotton ; mais cet art eſt caché en partie.

Le tiſſu de cette jolie coque préſente à la loupe un ſpectacle très-agréable : on croit voir un filet de Pêcheur. Les fils qui vont d'une cannelure à une autre, ſe croiſent & forment les mailles bien terminées du réſeau. Ceux qui partent obliquement d'une cannelure vont ſe rendre à la cannelure qui la ſuit immédiatement, & celà ſe répete de cannelures en cannelures. Mais un pareil tiſſu ne ſeroit pas aſſez ſerré au gré de la Chenille : il laiſſeroit trop de tranſparence à la coque, & la Chenille veut qu'elle ſoit opaque. Dès qu'elle a achevé d'en réunir les moitiés, elle s'occupe à fortifier tout l'intérieur en le revêtant de couches de ſoie.

Je n'ai point dit comment l'adroite Fileuſe parvient à former ces cannelures qui parent tant l'extérieur de ſa coque, j'ai omis bien d'autres détails qui ne pourroient être ſaiſis par une ſimple deſcription & ſans le ſecours des figures : mais j'ajouterai, que la Fileuſe ſait ſi bien prendre ſes meſures quand elle fabrique la ſeconde moitié de ſa coque, que les cannelures de cette moitié correſpondent exactement à celles de la premiere.

Le corps de notre petite Chenille ne ſert donc pas de moule à ſa coque ; mais on peut dire qu'il lui ſert de meſure, ou qu'il eſt une ſorte de métier monté pour exécuter l'ouvrage : c'eſt ce qu'on croira remarquer en liſant avec attention dans les Mémoires de l'Obſervateur le détail très-circonſtancié des procédés de la Fileuſe.

Le fil ne fait pas proprement des révolutions autour de la coque ; il y trace une infinité de zigs-zags, qui compoſent différentes couches de ſoie, d'où réſulte l'épaiſſeur du tiſſu. Une filiere, placée près de la bouche de l'Inſecte, moule ce fil précieux. Avant que de paſſer par la filiere, la matiere à ſoie ſe montre ſous l'aſpect d'une gomme preſque liquide, contenue dans deux grands réſervoirs, repliés en maniere d'inteſtins, & qui vont aboutir à la filiere par deux conduits déliés & paralleles. Chaque conduit fournit ainſi la matiere d'un fil : la filiere réunit ces deux fils en un ſeul, & le microſcope démontre cette réunion. Un fil de ſoie, qui nous paroît ſimple, eſt donc réellement double. Un fil de ſoie d'Araignée eſt bien autrement compoſé, quoique prodigieuſement fin : il eſt formé de la réunion de pluſieurs milliers de fils, qui paſſent par différentes filieres.

L'HISTORIEN immortel du Ver-à-ſoie s'eſt aſſuré que la coque de cet Inſecte eſt formée des lacis d'un même fil, dont la longueur eſt de plus de neuf cents pieds de Bologne. Des Ecrivains trop épris du merveilleux, nous ont beaucoup vanté la prévoyance du Ver-à-ſoie : ils nous l'ont préſenté comme prévoyant ſa fin prochaine, & ordonnant lui-même les préparatifs

de ſa ſépulture. Il ne manque à ces jolies choſes qu'un peu plus d'exactitude. Le Ver-à-ſoie agit, il eſt vrai, comme s'il prévoyoit : s'enſuit-il néanmoins qu'il prévoie, & ne pourroit-il pas agir préciſément de la même maniere ſans rien prévoir ? Quand il a pris tout ſon accroiſſement, ſes réſervoirs à ſoie ſont auſſi remplis qu'ils peuvent l'être : il eſt apparemment preſſé du beſoin d'évacuer cette matiere ; il l'évacue, & la coque eſt le réſultat naturel de ce beſoin & des attitudes que prend l'Animal en y ſatisfaiſant. Ces attitudes ſont, ſans doute, celles qui lui conviennent le mieux. Il ſe ſoulage encore en les variant, & comme il eſt à-peu-près cylindrique, de quelque maniere qu'il ſe ploie, il tend toujours à tracer un ovale. En promenant ſa filiere de tous les côtés, il épaiſſit de plus en plus le tiſſu de ſa coque. Telle eſt en général la fabrique de toutes les coques de ce genre. Il en eſt dont le tiſſu eſt ſi fin, ſi ſerré, ſi uni, qu'il ſemble purement membraneux.

QUELQUES-UNES de nos Fileuſes donnent à leur coque une forme plus recherchée, & qui imite celle d'un bateau renverſé. La coque du Ver-à-ſoie eſt faite, pour ainſi dire, d'une ſeule piece. Les coques en bateau ſont faites de deux pieces principales, façonnées en maniere de

coquilles, & réunies avec beaucoup de propreté & d'adreſſe. Chaque coquille eſt travaillée à part, & formée d'un nombre preſqu'infini de très-petites boucles de ſoie. Sur le devant de la coque, qui repréſente le derriere du bateau, eſt un rebord un peu ſaillant, dans lequel on apperçoit une fente très-étroite qui indique l'ouverture ménagée pour la ſortie du Papillon. Là, les deux coquilles peuvent s'écarter l'une de l'autre, & laiſſer paſſer le Papillon. Elles ſont conſtruites & aſſemblées avec un tel art, qu'elles font reſſort, & que la coque dont l'Inſecte eſt ſorti, paroît auſſi bien cloſe que celle où il habite encore. Par cet artifice ingénieux le Papillon eſt toujours libre & la Chryſalide en ſûreté. Nous reviendrons ailleurs à des procédés analogues plus ſinguliers (2).

Nos Fileuſes n'ont pas toutes une égale proviſion de ſoie, & toutes ſemblent néanmoins vouloir ſe dérober aux yeux. Celles qui ne ſont

(2) †† On trouve au Printemps ſur l'Oſier & ſur le Chêne, de ces Chenilles qui ſavent ſe conſtruire ces coques de forme recherchée, qui ont l'air d'un bateau renverſé. Ce que je dis ici de la fente ménagée pour la ſortie du Papillon, méritoit fort d'être remarqué & ne l'avoit pas été : c'eſt que la coque paroit bien fermée, quoique réellement elle ne le ſoit pas. Il faut y regarder de fort près pour reconnoître le petit artifice de la Chenille. J'ai donné dans un autre Ecrit le détail de ſes procédés.

pas assez riches pour se faire une bonne loge de soie, suppléent à cette disette par différentes matieres plus ou moins grossieres, qu'elles ont l'adresse de faire entrer dans la construction de la loge. Les unes se contentent de lui donner une couverture de feuilles qu'elles lient ensemble, sans aucun art. Les autres ne se bornent pas à entasser ces feuilles & à les assujettir; mais elles les arrangent avec une sorte de régularité. D'autres s'avisent de poudrer tout le tissu de leur coque avec une matiere qu'elles rendent par le derriere, & qu'elles font pénétrer entre les fils (3). D'autres se dépouillent de leurs poils, & en composent un tissu mi-soie & poils (4). D'autres, après s'être dépouillées, plantent leurs longs poils autour d'elles, & en

(3) †† Cette Espece de Chenille que la distribution de ses couleurs a fait nommer *Livrée*, & qui vit en société une partie de sa vie, poudre ainsi sa coque pour diminuer la transparence de son tissu & le rendre assez opaque. Cette Chenille est très-commune & se trouve au Printemps sur les haies & sur les Arbres fruitiers.

(4) †† Ce procédé est commun à plusieurs grandes Especes de Chenilles velues qui vivent en Été sur le Charme, le Coudrier, &c. Il l'est encore à différentes Especes de Chenilles que l'arrangement singulier de leurs poils a fait nommer Chenilles *à brosses*, & qu'on trouve dans la belle saison sur le Prunier & sur quelques autres Arbres.

forment une eſpece de paliſſade en berceau (5). D'autres joignent à la ſoie & aux poils une matiere graſſe, qu'elles tirent de leur intérieur & dont elles bouchent les mailles du tiſſu, qui en eſt comme vernis (6). D autres s'enfoncent dans le ſable ou dans le menu gravier, & s'y conſtruiſent des coques de ſable dont tous les grains ſont liés avec de la ſoie (7). D'autres enfin, qui n'ont point de ſoie, percent la terre,

(5) †† Ce procédé curieux eſt celui d'une petite Chenille qui ſe nourrit des Lychens qui croiſſent ſur les murs. On la trouve au Printemps. Mr. de REAUMUR eſt le premier Naturaliſte qui en ait parlé.

(6) †† Pluſieurs grandes Chenilles velues qu'on trouve dans la belle ſaiſon ſur le Charme, ſur l'Orme, &c. ſe conſtruiſent de ces coques, dans la fabrique deſquelles elles font entrer leurs poils & une matiere graſſe. J'ai raconté ailleurs les petites manœuvres que ces Chenilles & quelques Chenilles à broſſes m'avoient offertes.

(7) †† Quantité de Chenilles entrent en terre pour s'y conſtruire des coques avec des grains de ſable qu'elles lient au moyen de leur ſoie. Une belle Chenille qui vit en Été ſur le Bouillon-blanc ou ſur le *Bon-homme*, eſt une de celles dont l'induſtrie en ce genre ſe fait le plus remarquer. On peut l'obliger à travailler à découvert en retirant de terre la coque & en y faiſant une breche plus ou moins grande. Si l'on met du petit gravier à la portée de la Chenille, on la verra avancer ſa tête hors de la breche, ſaiſir les grains de gravier avec ſes dents, les poſer contre le bord de la breche, les y aſſujettir avec de la ſoie, & parvenir ainſi à réparer le déſordre fait à ſa coque.

s'y pratiquent une cavité (8) en forme de coque, & en enduiſent les parois avec une ſorte de glu ou de colle.

Une autre Eſpece, bien plus induſtrieuſe que les précédentes, exécute un ouvrage qu'on ne ſe laſſe point d'admirer. Vous venez de voir des coques qui reſſemblent à un bateau renverſé; c'eſt encore la forme que cette Eſpece donne à ſa coque; mais elle ne la conſtruit pas de pure ſoie. Avec ſes dents elle détache de petites lames d'écorce, de figure rectangulaire, à-peu-près égales & ſemblables, qu'elle aſſemble avec toute la propreté & toute l'adreſſe d'un Ebéniſte, & dont elle compoſe les principales pieces de la coque. Ces grandes pieces ſont ainſi formées d'une multitude de très-petites pieces de rapport, poſées les unes au bout des autres & liées

(8) †† Ce procédé, le plus ſimple de tous, eſt celui que pratiquent les plus grandes Chenilles raſes de nos Contrées, & en particulier la belle Chenille qui vit en Été ſur le Fuſain & ſur le Jaſmin, & qui donne le fameux Papillon à *tête de mort*. Cette grande Chenille, très-commune dans la belle ſaiſon ſur le Tithymale à feuilles de Cyprès, & qui eſt très-remarquable par la beauté & la diſtribution de ſes couleurs, recourt aux mêmes procédés pour aſſurer ſa métamorphoſe, & ſe contente de pratiquer dans la terre une cavité proportionnée à ſa grandeur; mais les grains qui forment les parois de la cavité, ſont liés avec une ſorte de glu ou d'humeur viſqueuſe.

avec de la ſoie. En un mot, on croit voir un parquet ou un ouvrage de marqueterie (9).

C'EST encore en bois que travaille une autre Chenille, mais non avec le même art. Sa coque, de forme ordinaire, n'eſt faite que de petits fragmens irréguliers détachés du bois ſec. Le ſecret de l'Inſecte conſiſte à lier ces fragmens & à en compoſer une eſpece de boîte. Il y parvient en les tenant quelques momens dans ſa bouche, en les y humectant, & en les collant les uns aux autres au moyen d'une ſorte de glu qui lui tient lieu de ſoie. Il ſe forme de ce mêlange une coque dont la ſolidité égale preſque celle du bois. Le Papillon n'a point d'inſtrument pour la percer, il peut apparemment la ramollir. La Chenille eſt celle qui poſſede cette liqueur acide dont j'ai parlé (10). Cette liqueur ramollit ſenſiblement la coque, & l'on a conjecturé avec fondement, qu'elle étoit préparée de loin pour mettre le Papillon en état de ſe faire jour (11).

(9) †† C'eſt à Mr. de REAUMUR que nous devons l'intéreſſante hiſtoire des procédés induſtrieux de la petite Chenille qui ſe conſtruit une coque ſi remarquable. On la trouve en Mai ſur le Chêne : je l'y ai cherchée inutilement pendant bien des années. Il faut qu'elle ſoit aſſez rare.

(10) Part. VIII, Chap. V.

(11) †† Je parlois ici d'une grande Chenille raſe, qui vit

CHAPITRE V.

Les Fauſſes-chenilles qui ſe conſtruiſent des coques doubles.

DES Inſectes, que leur reſſemblance avec les Chenilles a fait nommer *Fauſſes-chenilles* (1), ſavent auſſi ſe conſtruire des coques, & ces coques ont de nouvelles ſingularités à nous offrir. Elles ſont réellement doubles; je veux dire, que deux coques ſont renfermées l'une

en Été ſur le Saule & l'Oſier, & qui eſt la plus remarquable de toutes par la ſingularité de ſa forme: elle a quelque air d'un Poiſſon. Sa partie poſtérieure, aſſez effilée, ſe termine par une queue fourchue & écailleuſe. Chaque branche de la fourche eſt un tuyau qui renferme une ſorte de corne mobile & charnue, que l'Inſecte en fait ſortir à volonté. Cette Chenille offre d'autres particularités anatomiques plus remarquables encore. MM. de REAUMUR & de GEER l'avoient beaucoup obſervée; & elle m'avoit fourni à moi-même la matiere d'un petit écrit que je publiai autrefois.

(1) †† Mr. de REAUMUR a donné le nom de *Fauſſes-chenilles* à ces Vers qui ont plus de jambes membraneuſes que n'en ont les Chenilles; mais qui leur reſſemblent d'ailleurs beaucoup par leur forme, par leur ſtructure, par leur genre de vie & leurs procédés. Il en eſt de raſes & de demi-velues comme les Chenilles. Les Mouches à quatre aîles dans leſquelles elles ſe transforment, ont un air de famille, un air lourd & peſant, qui aide à les faire reconnoître.

dans l'autre, ſans tenir l'une à l'autre. La coque extérieure ſemble faite de parchemin ; quelquefois ce parchemin eſt un ouvrage à réſeau. La coque intérieure, au contraire, eſt d'un tiſſu très-fin, très-ſoyeux, très-luſtré (2).

CHAPITRE VI.

Les Inſectes qui vivent dans les fruits.

LES plus ſolitaires de tous les Inſectes ſont ceux qui vivent dans l'intérieur des fruits. Il eſt prouvé, que chaque fruit ne loge qu'une Chenille ou qu'un Ver (1). Nous ignorons la

(2) †† J'ai fait admirer ailleurs la beauté & la compoſition du tiſſu de cette coque intérieure. Je dois ajouter ici, qu'il eſt des Chenilles *à broſſes* qui paroiſſent ſe conſtruire de doubles coques, comme je l'ai fait remarquer dans un autre écrit.

(1) †† Mr. de REAUMUR s'étoit aſſuré de ce fait par ſes obſervations ſur les petites Chenilles qui vivent dans l'intérieur de différentes eſpeces de fruits, tels que les poires, les pommes, les prunes, les ceriſes, &c. On nomme communément ces Chenilles des *Vers*, & l'on dit que les fruits où elles logent ſont *véreux :* il eſt pourtant très-vrai que la plupart de ces Inſectes ſont de vraies Chenilles qui ſe métamorphoſent en Papillons. Les Femelles pondent ſouvent bien des œufs ſur le même fruit, & pourtant il ne renferme jamais qu'une ſeule Chenille, quoiqu'il pût en loger & en nourrir un bon nombre. On obſerve la même choſe ſur les petites Chenilles qui ſe nichent dans

cauſe de ce fait remarquable. Nous ſavons ſeulement qu'un Obſervateur ayant tenté de faire vivre enſemble des Chenilles de cette Eſpece, elles ſe livroient de furieux combats toutes les fois qu'elles ſe rencontroient (2). Il eſt donc bien décidé que l'humeur de ces Chenilles eſt antiſociable. Pluſieurs ſe métamorphoſent dans le fruit même qui leur a ſervi de retraite & de pâture; elles s'y creuſent des cavités qu'elles tapiſſent de ſoie ou dans leſquelles elles ſe filent des coques. D'autres, & c'eſt le plus grand nombre, ſortent du fruit & vont ſe métamorphoſer dans la terre.

l'intérieur des grains: il n'y a jamais qu'une ſeule Chenille dans chaque grain. Mr. DUHAMEL qui avoit beaucoup obſervé de très-petites Chenilles de ce genre, qui dévoroient les grains de l'Angoumois, & qui nous en a donné un curieux Traité, dit expreſſément: qu'*ayant ouvert avec toutes les précautions poſſibles un grand nombre de grains endommagés, il n'avoit jamais trouvé deux Chenilles dans un même grain.*

(2) †† C'eſt ſur la petite Chenille qui vit dans l'intérieur de la tête du Chardon à bonnetier, que l'Auteur avoit fait les tentatives dont il parle dans ce Chapitre, & qu'il a racontées ailleurs très en détail & peut-être trop. Il les avoit aſſez variées, & toujours les petites Hermites qu'il vouloit forcer à vivre enſemble, ſe livroient des combats de corps à corps avec un acharnement inexprimable: la mort d'un des Combattans en étoit ordinairement la ſuite. On remarquoit qu'ils évitoient ſoigneuſement de ſe rencontrer, & qu'ils ſe tenoient pour l'ordinaire à quelque diſtance les uns des autres.

CHAPITRE VII.

Les Inſectes qui plient & roulent les feuilles des Plantes.

Ce ſont encore de parfaits Hermites que la plupart des Inſectes qui plient ou roulent les feuilles de quantité de Plantes (1). Ce procédé eſt commun à beaucoup de Chenilles (2). Elles ſe procurent ainſi de petites cellules, qui ſont des logemens commodes, & où elles trouvent en tout temps une nourriture aſſurée; car elles mangent les parois de la cellule; mais elles ont grand ſoin de ne toucher jamais à l'enveloppe deſtinée à les couvrir. Les différentes manieres dont ces Chenilles ſe logent, donnent lieu de les diſtinguer en Lieuſes, en Plieuſes & en Rouleuſes (3).

(1) †† Il eſt pourtant quelques Eſpeces de ces Inſectes de la claſſe des Chenilles, qui vivent en ſociété.

(2) †† Différentes Eſpeces de Vers & d'Araignées ſavent auſſi rouler adroitement les feuilles des Plantes.

(3) †† Toutes ces Chenilles ſont aſſez petites & pour l'ordinaire dépourvues de poils. Elles ſe transforment en *Phalenes* ou en Papillons de nuit. Il en eſt de bien des Eſpeces, toutes

L'ART des Lieuſes eſt en général le plus ſimple. Il conſiſte à lier avec des fils de ſoie pluſieurs feuilles, à en former un paquet au centre duquel eſt la loge du petit Hermite.

LE procédé des Plieuſes ſuppoſe des manipulations plus recherchées. Elles plient les feuilles en entier ou en partie. En entier, lorſque la portion pliée eſt ramenée à plat ſur une autre portion de la feuille: en partie, lorſqu'elles ne font ſimplement que courber la feuille plus ou moins.

MAIS c'eſt le travail des Rouleuſes qui ſe fait ſur-tout admirer. Elles habitent une eſpece de rouleau, dont la forme, les dimenſions & la poſition varient en différentes Eſpeces. Les unes lui donnent une figure cylindrique: les autres lui donnent la forme d'un cornet, & ce cornet eſt auſſi bien fait que ceux des Epiciers. La feuille eſt toujours roulée en ſpirale, ou comme le ſont les oublies (4). Ordinairement le rouleau ou le

plus ou moins diverſifiées. Il eſt peu de Plantes qui ne nourriſſent de ces Chenilles. La plupart ſont très-vives & comme convulſionnaires.

(4) †† La Chenille ne ferme pas en entier le rouleau à ſes extrémités: elle veut pouvoir en ſortir au beſoin, & ſe dérober ainſi à ſes ennemis.

cornet eſt couché ſur la feuille ; mais quelquefois, ce qui eſt plus ſingulier, il y eſt planté comme une quille.

Mon Lecteur imagine-t-il la méchanique qui préſide à la conſtruction de ces divers ouvrages ? Conçoit-il comment un Inſecte, qui n'a point de doigts, parvient à rouler une feuille & à la tenir roulée ? L'on ſait en général que les Chenilles filent : on entrevoit que c'eſt à l'aide de leurs fils que nos adroites Rouleuſes font prendre aux feuilles la forme d'un tuyau cylindrique ou conique. L'on voit en effet des paquets de fils diſtribués de diſtance en diſtance, qui tiennent le rouleau aſſujetti à la feuille.

Mais comment ces fils, qui ne ſemblent faire que la fonction de petits cables, ont-ils pu opérer le roulement de la feuille ? Voilà ce qu'on croit deviner, & qu'on ne devine point. On croit qu'en attachant des fils au bord de la feuille, & en tirant ces fils à elle, la Chenille force ce bord à s'élever & à ſe contourner : ce n'eſt point du tout cela. L'application que l'induſtrieux Inſecte fait de ſes forces, eſt d'une plus fine méchanique. Il attache bien des fils au bord de la feuille ; mais il ne les tire point à lui. Il en colle l'autre bout à la ſurface de la feuille. Les fils

d'un même paquet ſont à-peu-près paralleles, & compoſent un petit ruban. A côté de ce ruban, l'Inſecte en file un ſecond, qui paſſe ſur le premier & le croiſe.

Voici donc le ſecret de ſa méchanique. En paſſant ſur le premier ruban pour tendre le ſecond, il peſe ſur le premier de tout le poids de ſon corps; cette preſſion, qui tend à enfoncer le ruban, oblige le bord de la feuille auquel il tient à s'élever. Le ſecond ruban qui eſt collé à l'inſtant ſur le plat de la feuille, conſerve au bord l'élévation ou la courbure que l'Inſecte a voulu lui donner. Si l'on examine de près ces deux rubans, leur effet ſera ſenſible. Le ſecond paroîtra fort tendu & le premier fort lâche; c'eſt que celui-ci n'a plus d'action & qu'il n'en doit plus avoir. Vous comprenez à préſent que le rouleau ſe forme peu-à-peu par la répétition des mêmes manœuvres ſur différens points de la feuille (5).

(5) †† Ce que je diſois ici d'après Mr. de Reaumur ſur l'ingénieuſe méchanique de nos Rouleuſes, paroît exiger quelque correction. Son illuſtre Emule, Mr. de Geer, qui les avoit ſuivies avec beaucoup d'attention, ne croyoit pas que le poids de la Chenille contribuât ſenſiblement à l'effet du roulement. Une Pieuſe qui vit ſur le Cerfeuil ſauvage, lui avoit offert des procédés d'un plus grand effet. Il avoit remarqué que la Chenille ſaiſit avec ſes premieres jambes le fil de ſoie qu'elle tend d'un bord de la feuille à l'autre, & qu'elle ſe tire à elle pour

Mais il arrive ſouvent que les groſſes nervures réſiſtent trop : l'Inſecte ſait les affoiblir en les rongeant çà & là. Pour former un cornet, il faut quelques manœuvres de plus. La Rouleuſe coupe ſur la feuille avec ſes dents la piece qui doit le compoſer. Elle ne l'en détache pas en entier : il manqueroit de baſe : elle ne détache que la partie qui formera les contours du cornet. Cette partie eſt proprement une laniere qu'elle roule à meſure qu'elle la coupe. Elle dreſſe le cornet ſur la feuille à-peu-près comme nous redreſſons un obéliſque incliné. Elle attache des fils ou de petits cables vers la pointe de la pyramide ; elle les charge du poids de ſon corps, & force ainſi cette pointe à s'élever. Vous devinez le reſte : c'eſt la même méchanique qui exécute un rouleau.

Ces cellules où la Chenille paſſe ſa vie, ſervent auſſi de retraite à la Chryſalide. Cette derniere ne s'accommoderoit pas apparemment d'une ſimple enveloppe de feuille : la Chenille donne à la cellule une tapiſſerie de ſoie. D'autres Eſpeces s'y filent une coque. D'autres abandonnent la cellule, & vont ſe transformer ſous terre.

forcer ſes bords à ſe rapprocher ; & que lorſqu'elle tend le ſecond fil, elle ne lâche point le premier qu'elle n'ait achevé de tendre le ſecond. Ces fils ſont donc de vrais petits cables, à l'aide deſquels la Chenille exécute ſa manœuvre avec autant de célérité que d'adreſſe.

CHAPITRE VIII.

Les Inſectes mineurs des feuilles des Plantes.

Il eſt des feuilles de Plantes qui n'ont guere que l'épaiſſeur du papier. Croiroit-on qu'il y a des Inſectes qui ſavent ſe loger dans l'épaiſſeur de ſemblables feuilles & s'y mettre à l'abri des injures de l'air? Une feuille eſt pour ces très-petits Inſectes un vaſte Pays, où ils ſe pratiquent des routes plus ou moins tortueuſes; ils minent dans le parenchyme de la feuille, comme nos Mineurs minent dans la terre. Ils en ont auſſi pris le nom de *Mineurs de feuilles* (1).

Ils ſont extrêmement communs: les uns appartiennent à la claſſe des Chenilles; les autres à celle des Vers. Ils ne peuvent ſouffrir d'être à nud, & c'eſt pour ſe couvrir qu'ils ſe gliſſent entre les deux peaux d'une feuille. Ils y trouvent en même temps leur ſubſiſtance. Ils en mangent le parenchyme ou la pulpe, & ils font chemin en mangeant.

(1) †† C'eſt le Naturaliſte auquel nous devons la meilleure hiſtoire de ces très-petits Inſectes, qui leur a donné le nom de *Mineurs de feuilles*: on comprend que je parle de Mr. de Reaumur.

Les

Les uns s'y creuſent des boyaux droits ou tortueux. Ce ſont des Mineurs en galeries. Les autres minent tout autour d'eux, dans des eſpaces circulaires ou oblongs, & ce ſont des Mineurs en grand (2).

Les dents ſont les inſtrumens au moyen deſquels les Chenilles minent; mais parmi les Vers mineurs on en voit qui piochent le parenchyme à l'aide de deux crochets équivalens à nos pioches (3).

(2) †† La galerie de nos Mineurs eſt ouverte à une de ſes extrémités, à celle par laquelle l'Inſecte naiſſant s'eſt introduit entre les deux membranes de la feuille. On voit bien que la galerie doit aller toujours en s'élargiſſant à meſure que l'Inſecte fait chemin dans la feuille; car il en proportionne la capacité à la groſſeur de ſon corps, & comme il prend chaque jour plus d'accroiſſement, chaque jour il élargit davantage ſa galerie.

Les Mineurs en grand ou en grandes aires minent tout autour d'eux dans l'épaiſſeur de la feuille. La figure de la mine eſt ordinairement déterminée par les nervures de la feuille entre leſquelles elle ſe trouve placée. Ces nervures ſont pour le très-petit Inſecte, des montagnes qu'il ne franchit pas. Divers Mineurs de ce genre recourent à un procédé remarquable pour augmenter la hauteur de la mine & s'y mettre plus à l'aiſe: ils pliſſent l'épiderme qu'ils ont détaché; tantôt ils n'y forment qu'un pli; tantôt ils en forment deux ou pluſieurs. Ces plis ſe montrent ſur l'épiderme comme autant d'arrêtes.

(3) †† La plupart des Mineurs vivent dans une parfaite ſolitude: on trouve pourtant des mines en grandes aires, qui renferment pluſieurs Mineurs qui ne paroiſſent ni ſe cherche

C'EST dans la mine même que pluſieurs de ces Inſectes ſe filent la coque où ils doivent ſe transformer. D'autres ſortent de la mine & vont filer ou ſe métamorphoſer ailleurs. Les Papillons qui proviennent des Chenilles mineuſes, ſont de petits miracles de la Nature. Elle leur a prodigué l'or, l'argent & l'azur. Elle a même mieux fait que de les prodiguer; elle les a aſſociés avec goût à des couleurs plus ou moins riches, & l'on regrette qu'elle n'ait pas travaillé en grand de tels chef-d'œuvres.

MAIS les Mineurs ont quelque choſe de plus admirable à nous offrir. Donnez votre attention à ces feuilles de Vigne que vous avez ſous les yeux. Elles ſont percées de trous ovales, qui ſemblent y avoir été faits avec un emporte-piece. Des Chenilles mineuſes ont fait ces trous en détachant de la feuille deux morceaux de peau,

ni ſe fuir : telles ſont les mines que ſe pratiquent les Vers de la Juſquiame, qui ſont de très-gros Inſectes en comparaiſon des autres Mineurs. Quand on les retire de leur mine, ils ſe mettent auſſi-tôt à en creuſer une nouvelle, ce que le commun des Mineurs ne fait pas faire. Si après qu'un Mineur de la Juſquiame a commencé à creuſer une nouvelle mine, on y introduit un ſecond Mineur, puis un troiſieme & un quatrieme, ils continueront tous à s'avancer dans l'intérieur de la feuille ſans s'attaquer les ~~uns les~~ autres; mais chacun travaillera à part & rien ne ſe fera en commun.

dont elles ſe ſont fabriqué une coque : voilà cette coque poſée perpendiculairement ſur un échalas, à une aſſez grande diſtance de la feuille qui en a fourni les matériaux. Comment a-t-elle été taillée, façonnée, détachée, tranſportée ? Ne tentons pas de le deviner : tentons plutôt de ſurprendre l'induſtrieuſe Ouvriere ſur ſon établi.

Elle mine en galerie, & c'eſt à l'extrémité de la galerie, qu'elle conſtruit ſa coque. Deux morceaux de feuille, de figure ovale, très-minces, égaux & ſemblables doivent la compoſer. La Chenille prépare ces pieces, les amincit en les déchargeant du parenchyme, les modele, les double de ſoie, les coupe avec ſes dents comme avec des ciſeaux, les aſſemble & les unit. Déja ils ne tiennent plus à la feuille, & pourtant la coque ne tombe point : la Chenille a pris la précaution de la retenir par quelques fils à l'eſpece de cadre dont elle eſt bordée.

La coque finie, la Chenille ſe met en devoir de la détacher de ſa place & de la tranſporter. Elle a laiſſé une petite ouverture à un des bouts : par cette ouverture elle fait ſortir ſa tête ; elle la porte en avant, ſaiſit avec ſes dents un point d'appui, & faiſant effort, elle tire la coque à elle. Les fils qui la retenoient cedent, & la Che-

nille emporte ſa petite maiſon, comme le Limaçon ſa coquille.

VOYEZ-LA cheminer : ſa marche eſt un nouveau myſtere. L'on avoit dit, que toutes les Chenilles ont au moins dix jambes : celle-ci en eſt abſolument dépourvue, & nous montre ce qu'on doit penſer des Nomenclatures (4). Oppoſons à ſa marche un verre très-poli, poſé verticalement. Elle n'en eſt point arrêtée ; & la voilà qui grimpe ſur ce verre comme ſur une feuille. Par quel art ſecret y trouve-t-elle priſe ; car elle n'a ni jambes ni crochets pour s'y cramponner ? Vous avez vu des Chenilles, qui filent de petits monticules de ſoie, où elles ſe fixent (5). Notre Mineuſe file de pareils monticules de diſ-

(4) †† Mr. de REAUMUR avoit donné pour un des caracteres eſſentiels de la *Chenille*, d'avoir au moins dix jambes & au plus ſeize ; & il avoit nommé *Fauſſes-chenilles* des Inſectes fort ſemblables aux Chenilles ; mais qui en different principalement en ce qu'ils ont plus de ſeize jambes. (Chap. V, Note. 1.) L'induſtrieuſe Mineuſe dont il s'agit actuellement, contredit le caractere que notre illuſtre Obſervateur avoit établi à l'égard des Chenilles. Toute l'Hiſtoire naturelle eſt pleine de pareilles exceptions à nos regles prétendues générales ; & rien n'eſt plus propre à nous faire ſentir combien nous devons être réſervés à tirer de ces concluſions générales, puiſque nos prémiſſes ſont toujours plus ou moins particulieres.

(5) Chap. I de cette Partie.

tance en distance, sur le plan qu'elle parcourt. Avec ses dents, elle saisit un de ces monticules, qui devient pour elle un point d'appui; elle tire à elle la coque, & l'amene près du monticule; elle l'y attache; elle porte ensuite sa tête en avant, file un second monticule, & s'y cramponne comme au premier; elle fait effort pour détacher la coque, la détache, la traîne vers le nouveau monticule, l'y attache encore, & ce second pas fait vous dévoile le secret de son ingénieuse méchanique. Elle laisse ainsi sur les corps qu'elle parcourt de petites traces de soie, produites par les monticules qu'elle file d'espace en espace.

Parvenue au lieu où elle veut se fixer, elle y arrête sa coque à demeure, & la place dans une situation verticale. Il en sort ensuite un très-joli Papillon, aussi richement vêtu, que ceux des autres Mineuses, & du même genre (6).

(6) †† C'est Mr. Godeheu de Riville, Commandeur de Malthe, excellent Observateur, qui nous a donné l'intéressante histoire de cette Mineuse.

CHAPITRE IX.

Les Fauſſes-teignes.

D'AUTRES Inſectes habitent dans de grandes galeries de ſoie, qu'ils prolongent & élargiſſent à meſure qu'ils croiſſent. Ils les recouvrent de matieres groſſieres, & ſouvent de leurs excrémens. Ils conſtruiſent de ces galeries ſur les divers corps dont ils ſe nourriſſent, & qui varient ſuivant l'Eſpece de l'Inſecte. L'on a donné le nom de *Fauſſes-teignes* à toutes les Eſpeces qui ſe font de ſemblables fourreaux. Vous ſavez, que ceux des vraies Teignes ſont portatifs.

LES Fauſſes-teignes les plus remarquables ſont celles qui s'établiſſent dans les ruches des Abeilles, & qui en détruiſent les gâteaux. Elles n'ont point d'armes défenſives, elles ne ſont recouvertes que d'une peau molle & délicate, & pourtant la Nature les a appellées à vivre aux dépens d'un petit Peuple guerrier, très-bien armé & très-diſpoſé à défendre ſes établiſſemens. Nos Ingénieurs recourent ſouvent aux mines & à la ſappe pour réduire les Places. Il étoit encore plus néceſſaire à nos Fauſſes-teignes d'exceller dans

cette ſorte d'attaque, & leurs ouvrages prouvent qu'elles y excellent.

Elles ne marchent jamais qu'à couvert. Elles pouſſent dans l'épaiſſeur des gâteaux, de longs boyaux qu'elles dirigent à leur gré, & où elles ſont toujours en ſûreté contre l'ennemi. Ces eſpeces de galeries ſont garnies intérieurement d'un tiſſu de ſoie aſſez ſerré, & revêtues par-dehors d'une épaiſſe couche de grains de cire & d'excrémens. Ainſi les beaux ouvrages des laborieuſes Abeilles ſont détruits ſourdement par un Ennemi qu'elles ne peuvent découvrir, & qui les force quelquefois à abandonner leur ruche.

Ce n'eſt point au miel que les Fauſſes-teignes en veulent: elles ne percent point les cellules qui en contiennent. Elles ne mangent que la cire, & cette matiere que la Chymie ne ſait pas diſſoudre, leur eſtomac l'analyſe (1). Quand

(1) †† Ces Fauſſes-teignes peuvent s'accommoder au beſoin de matieres très-différentes de la cire, ſe nourrir & ſe vêtir de papier, de cuir, de plumes, de poils, &c. Leurs excrémens retiennent, comme ceux des Teignes, les couleurs des matieres qu'elles ont rongées; & ces excrémens elles peuvent les digérer de nouveau & digérer encore le réſidu groſſier qui en provient. Ces Fauſſes-teignes appartiennent à la nombreuſe claſſe des Chenilles, & les Papillons nocturnes qui en proviennent, courent avec une grande vîteſſe & ſont très-habiles à ſe gliſſer dans les ruches pour y dépoſer leurs œufs.

elles ont pris tout leur accroiſſement, elles ſe font au bout de la galerie une coque de ſoie, qu'elles ne manquent point d'envelopper de grains de cire.

C'EST dans nos greniers que d'autres Fauſſes-teignes s'établiſſent & qu'elles multiplient avec excès. Elles en veulent à notre plus précieuſe denrée. Elles lient enſemble des grains de Bled; elles ſe filent au milieu de cet amas de grains un petit tuyau où elles ſe logent. Là, elles ſont toujours à portée d'une nourriture abondante. Elles rongent à leur aiſe les grains qu'elles ont eu ſoin d'aſſujettir à leur fourreau, & qui en ſont comme l'enveloppe. A l'approche de la métamorphoſe elles abandonnent ce fourreau; elles ſe nichent dans l'intérieur d'un grain, ou dans les petites cavités qu'elles creuſent dans les planchers: elles les tapiſſent de ſoie, & s'y transforment en Chryſalides (2).

(2) †† J'indiquerai encore quelques autres Fauſſes-teignes qui méritent d'être connues. Tout le monde connoît les Teignes qui rongent les étoffes de laine, & qui ſavent ſe faire des fourreaux portatifs. Il eſt auſſi une Fauſſe-teigne qui ſurpaſſe en grandeur les vraies Teignes, & qui vit ſur de pareilles étoffes. Elle s'y conſtruit avec art une ſorte de berceau de ſoie & de poils, ſous lequel elle demeure renfermée. Ce berceau n'eſt ouvert qu'à ſon extrémité antérieure, & c'eſt par cette extrémité que la Fauſſe-teigne le prolonge à meſure qu'elle croît.

CHAPITRE X.

Des Teignes en général. Les Teignes domeſtiques.

IL eſt peu d'Inſectes, qui aient autant de droit à notre admiration, que ceux qui ſavent, comme nous, ſe faire des habits, & qui l'ont ſu ſans doute avant nous. Comme nous, ils naiſſent nuds; mais à peine ſont-ils nés, qu'ils travaillent à ſe vêtir. Vous comprenez que je parle des Teignes.

Elle file d'abord un tiſſu de pure ſoie, auquel elle donne la forme de berceau, & elle finit par le garnir de poils. Quand elle veut rejetter ſes excrémens, elle ſe retourne bout par bout pour ramener ſon derriere à l'ouverture du berceau. Ces excrémens n'ont pas comme ceux des vraies Teignes, la couleur des étoffes que l'Inſecte a rongées: ils ſont toujours noirs.

Une autre Fauſſe-teigne attaque les cuirs; & en particulier ceux qui forment la couverture des livres. Elles ſont donc de celles que les Gens de Lettres ont le plus d'intérêt à connoître. Les galeries qu'elles ſe conſtruiſent ſont recouvertes de leurs excrémens. Mais ce n'eſt pas ſeulement ſur les cuirs qu'elles s'établiſſent, elles ſe logent auſſi ſous l'écorce de vieux Arbres, & s'y nourriſſent de cadavres d'Inſectes.

Une autre Fauſſe-teigne eſt friande de Chocolat, & choiſit le plus parfumé. Elle y creuſe des cavités & s'y conſtruit une galerie de ſoie, qu'elle prolonge au beſoin.

Toutes les Fauſſes-teignes dont je viens de parler, ſe rangent dans la claſſe des Chenilles, parce que toutes ſe transforment en Papillons.

Toutes ne s'habillent pas d'une maniere uniforme, & n'employent pas dans leurs habillemens les mêmes matieres. Il y a peut-être plus de diverſité à cet égard dans les modes des Teignes de différentes Eſpeces, que dans celles de différens Peuples de la Terre. Spectacle intéreſſant pour l'Obſervateur, & que le Contemplateur de la Nature ne peut conſidérer comme tout le reſte, que d'une vue très-générale.

Nous avons entrevu les Teignes domeſtiques (1); elles méritent bien que nous leur donnions encore quelques momens d'attention. La forme de leur habit étoit la plus convenable: elle répond préciſément à celle de leur corps. C'eſt un petit fourreau cylindrique ouvert aux deux bouts. L'étoffe eſt de la fabrique de la Teigne. Un mêlange de ſoie & de poils en compoſe le tiſſu: mais il ne ſeroit pas aſſez doux pour l'Inſecte; il le double de pure ſoie. Nos meubles de laine & nos fourrures fourniſſent à ces Teignes les poils qu'elles emploient dans la fabrique de leurs étoffes. Elles font un choix de ces poils; elles les coupent avec leurs dents, & les incorporent artiſtement dans le tiſſu ſoyeux.

Elles ne changent jamais d'habit: celui

(1) Part. XI, Chap. II.

qu'elles portoient dans leur enfance, elles le portent encore dans l'âge de maturité. Elles ſavent donc l'alonger & l'élargir à propos. L'alonger n'eſt pas une affaire; elles n'ont pour cela qu'à ajouter de nouveaux fils & de nouveaux poils à chaque bout. Mais, l'élargir n'eſt pas choſe ſi facile. Vous avez vu (2) qu'elles s'y prennent préciſément comme nous nous y prenons en pareil cas. Elles fendent le fourreau de deux côtés oppoſés, & y inferent adroitement deux pieces de largeur requiſe. Elles ne fendent pas le fourreau d'un bout à l'autre : les côtés s'écarteroient trop, & elles ſeroient à nud. Elles ne le fendent de chaque côté, que juſques vers le milieu de ſa longueur. Ainſi, au lieu de deux pieces ou de deux élargiſſures, elles en mettent quatre. La raiſon ne procéderoit pas mieux.

Leur habit eſt toujours de la couleur de l'étoffe ſur laquelle il a été pris. Si donc la Teigne dont l'habit eſt bleu, paſſe ſur un drap rouge, les élargiſſures ſeront rouges; elle ſe fera un habit d'Arlequin, ſi elle paſſe ſur des draps ou des étoffes de pluſieurs couleurs.

Elles vivent des mêmes poils dont elles ſe

(2) Part. XI, Chap. II.

vêtent. Il eſt ſingulier qu'elles les digerent, plus ſingulier encore que les couleurs ne s'alterent point par la digeſtion, & que leurs excrémens ſoient toujours d'une auſſi belle teinte que celle des draps qu'elles rongent. Les Peintres pourroient s'aſſortir auprès de nos Teignes, de poudres de toutes couleurs & de toutes les nuances de la même couleur.

Elles ſont de petits voyages : celles qui s'établiſſent dans les fourrures, n'aiment pas à marcher ſur de longs poils ; elles coupent tous ceux qui ſe trouvent ſur leur route, & ne marchent jamais que la faux à la main. De temps en temps elles ſe repoſent : alors elles fixent leur fourreau par de petits cordages, & le mettent, pour ainſi dire, à l'ancre. Elles l'arrêtent plus ſolidement encore quand elles veulent ſe métamorphoſer. Elles en ferment exactement les deux bouts, pour y revêtir plus en ſûreté la forme de Chryſalide, & enſuite celle de Papillon (3).

(3) †† L'admiration que les Teignes domeſtiques avoient inſpirées pour elles à leur Hiſtorien, ne l'avoit pas empêché de chercher des moyens efficaces de les détruire & de préſerver de leurs ravages nos meubles & nos étoffes. Il avoit eu le bonheur de réuſſir dans cette recherche ſi utile, & il nous a appris que l'odeur de l'huile de térébenthine leur eſt toujours fatale. Une couche légere de cette huile étendue ſur des feuilles de

CHAPITRE XI.

Les Teignes champêtres, & les Teignes aquatiques.

Les Teignes champêtres, dont nous n'avons point à redouter les attaques, l'emportent beaucoup en induſtrie ſur les Teignes domeſtiques. Elles prennent dans les feuilles des Plantes la matiere de leurs habits; mais il faut qu'elles apprêtent cette matiere & qu'elles lui donnent la légéreté & la ſoupleſſe propres à leurs vêtemens.

Ces Teignes ſont des eſpeces de mineuſes, & elles ſe gliſſent entre les deux membranes d'une feuille, qui ſont pour elles ce qu'une piece de drap eſt pour un Tailleur, avec cette différence, que celui-ci a beſoin d'un patron, & que nos Teignes ſavent s'en paſſer. Elles détachent de ces membranes toute la ſubſtance charnue qui leur eſt adhérente: elles les aminciſſent & les poliſſent. Elles coupent enſuite dans ces membranes ainſi préparées, deux pieces à-peu-près égales & ſemblables; elles travaillent à leur

papier, donne infailliblement la mort à ces Inſectes deſtructeurs. L'odeur qui s'en exhale les fait tomber en convulſion; ils expirent bientôt couverts de taches livides.

donner la concavité, la courbure, les contours & les proportions que requiert la forme de leur fourreau, & cette forme eſt ſouvent très-recherchée. Elles les aſſemblent & les uniſſent avec une propreté & une adreſſe incroyables, & finiſſent par les doubler de ſoie. Elles n'ont plus alors qu'à déſengrener l'habit de dedans la feuille où il a été pris & taillé, & cela n'exige que quelques efforts.

Il eſt de ces fourreaux qui portent du côté du dos, de petites dentelures qui les ornent beaucoup & les font paroître plus compoſés. Ces dentelures ne ſont autre choſe que celles de la feuille dans laquelle ces fourreaux ont été façonnés.

Les Teignes champêtres ſe métamorphoſent dans leurs habits, comme les Teignes domeſtiques dans le leur. Nous n'avons fait encore qu'entrevoir l'art induſtrieux des Teignes champêtres; nous le conſidérerons ailleurs de plus près, & nous ne reviendrons point de notre étonnement. Au reſte, l'habit de ces Teignes n'eſt pas fait pour être alongé & élargi; quand il devient trop étroit, elles en font un autre.

Quantité de Teignes champêtres & de

Teignes aquatiques, car les eaux ont auſſi leurs Teignes, n'entendent point à préparer l'étoffe de leurs vêtemens. Auſſi les matieres qu'elles mettent en œuvre ne ſont-elles ſuſceptibles d'aucune préparation.

DES brins de bois, de petites baguettes, des fragmens de feuilles, des morceaux d'écorce, &c. poſés en recouvrement comme les tuiles, revêtent extérieurement le fourreau qui eſt de pure ſoie.

D'AUTREFOIS il eſt recouvert de gravier, de petites pierres, de morceaux de bois, de parcelles de roſeau, de petites coquilles, tantôt de Moules, tantôt de Limaçons; & ce qu'on n'imagineroit pas, les Moules & les Limaçons habitent encore ces coquilles: enchaînés au fourreau, ils ſont forcés de ſuivre la Teigne qui les porte où il lui plaît. Une Teigne vêtue ainſi ne reſſemble pas mal à certains Pélerins. Celles qui ſont couvertes de bois, de gravier, de pierres & d'autres matieres auſſi lourdes, liées enſemble, reſſemblent aſſez à un Soldat Romain peſamment armé.

VOUS jugez bien que de pareils habits doivent avoir des formes très-baroques: il en eſt

pourtant de fort jolis, & où l'arrangement ſymmétrique des matériaux compenſe un peu leur groſſiéreté.

Les Teignes aquatiques trouvent quelque avantage à s'habiller d'une façon ſi étrange. Il faut qu'elles ſoient toujours en équilibre avec l'eau au milieu de laquelle elles vivent. Si leur fourreau devient trop léger, elles y attachent une petite pierre; s'il devient trop peſant, elles y attachent des brins de roſeau (1).

(1) †† Tout eſt bon à la plupart des Teignes aquatiques pour recouvrir le fourreau de pure ſoie qu'elles ſe filent: on les voit ſe ſaiſir indifféremment de tous les petits corps qu'elles rencontrent dans l'eau & les attacher à leur habit. Il eſt pourtant des Eſpeces de ces Teignes qui ne s'habillent pas indifféremment de toutes ſortes de matieres, & qui ſemblent choiſir par préférence des matieres d'un certain genre dont elles revêtent conſtamment leur fourreau. Les unes préferent des grains de gravier ou de petites pierres; d'autres, des feuilles ou des fragmens de feuilles; d'autres, des brins de jones; d'autres, des graines, &c.

Nos Teignes aquatiques ne ſortent pas d'elles-mêmes de leur fourreau: il leur ſert de retraite ou de défenſe, & ſi l'on veut les obliger à en ſortir, elles ne l'abandonnent qu'à la derniere extrémité: le met-on enſuite à leur portée? elles y rentrent auſſi-tôt. Il n'en eſt pas de même des Teignes domeſtiques; elles ne rentrent plus dans leur fourreau, quand on les force à l'abandonner.

Les Teignes aquatiques ſont pourvues de dents comme les Chenilles, & rongent comme elles les feuilles des Plantes: mais elles ſont en même temps carnivores, & dévorent les Vers &

Toutes

TOUTES ces Teignes ſe métamorphoſent dans leur fourreau (2); les unes en Papillon, les autres en Mouches (3), d'autres en Scarabés.

les Nymphes des Inſectes aquatiques. Elles ſe dévorent même les unes les autres, & une Teigne qui auroit le malheur d'être privée de ſon fourreau, ſeroit bientôt dévorée par les Teignes de ſon Eſpece.

A l'approche de la premiere métamorphoſe, les Teignes aquatiques amarrent leur fourreau, mais de maniere que l'eau puiſſe toujours s'y renouveller : elles ne le fixent donc jamais ſur l'extrémité qui doit demeurer ouverte : quelquefois il leur arrive de le fixer au fonrreau d'une autre Teigne, qui le tranſporte ainſi avec le ſien.

Quelques-unes de ces Teignes nous montrent un procédé particulier : à l'approche de la métamorphoſe, elles raccourciſſent leur fourreau. Comme la Nymphe eſt moins longue que la Teigne, elle peut être très-bien logée dans un fourreau plus court, & apparemment qu'il lui convient que le fourreau ſoit raccourci.

(2) †† Les Teignes aquatiques ne ſubiſſent dans leur fourreau que la ſeule transformation en Nymphe. Mr. de GEER s'en eſt aſſuré. Le fourreau ſe trouve ſouvent placé à une aſſez grande profondeur ſous l'eau : ſi la transformation en Mouche s'opéroit dans cette enveloppe, la Mouche, toute aérienne, riſqueroit de ſe noyer en traverſant la couche d'eau qui la ſépare de l'air. La Nature, qui a voulu la conſervation de l'Inſecte, a enſeigné à la Nymphe à ſortir du fourreau à l'approche de la derniere métamorphoſe. Celle-ci n'a point à redouter l'eau, ſon élément naturel : elle ouvre donc la porte de la maiſonnette, traverſe l'eau, s'éleve à la ſurface & gagne le plein air, où elle ſe défait de l'enveloppe de Nymphe pour paroître ſous ſa derniere forme de Mouche.

(3) †† Les Teignes aquatiques ſont des Vers à ſix pieds,

QUELQUES Teignes champêtres n'empruntent point pour ſe vêtir des matieres étrangeres ; elles s'habillent de pure ſoie ; mais leur tiſſu eſt bien plus ſerré, bien plus fin, bien plus luſtré que celui des plus belles coques des Chenilles. Il a encore une ſingularité de plus ; il eſt tout compoſé de petites écailles ſemblables à celles des Poiſſons, & qui ſe recouvrent un peu les unes les autres. Le fourreau eſt quelquefois ſurmonté d'une enveloppe en forme de manteau, qui le couvre preſque en entier, & qui eſt compoſé de deux pieces principales, dont la figure imite celle d'une coquille bivalve ou à deux battans.

DES Teignes qui puiſent dans leur propre fond la matiere de leur habit, devoient ſavoir l'alonger & l'élargir : il leur en auroit trop coûté de s'en faire un neuf au beſoin. Auſſi entendent-elles à merveille à l'agrandir. Elles n'y mettent pas des élargiſſures à la maniere des Teignes domeſtiques : elles le fendent de place en

qui ſe transforment en des Mouches à quatre aîles, d'un genre particulier : leurs aîles ſont colorées à-peu-près comme celles des Papillons ; mais elles ne doivent pas leurs couleurs, comme ces dernieres, à de petites écailles diverſement colorées. (Part. III, Chap. XVIII, Note 4.) La ſorte de reſſemblance de ces Mouches avec les Papillons, a porté Mr. de REAUMUR à leur donner le nom de *papillonnacées*. D'autres Naturaliſtes les ont nommées *Erigones*.

place ſuivant ſa longueur, & rempliſſent ſur-le-champ les intervalles par de nouveaux fils d'une longueur proportionnée à l'ampleur requiſe. Ce fourreau, de forme ſinguliere, devient auſſi pour elles une ſorte de coque où elles ſe transforment en Papillons.

CHAPITRE XII.

Les Inſectes qui ſe recouvrent des matieres qu'ils rejettent.

†† Ce ſont des Hommes bien dégoûtans que ces Hottentots qui ſe font des ceintures & des bottines d'inteſtins de Bœuf, qu'ils négligent de vuider. Le Peuple des Inſectes a auſſi ſes Hottentots. Un petit Ver à ſix pieds, jaunâtre, très-dodu, grand mangeur de ſon naturel, & qui dévore les feuilles des Lys, fait plus encore que le Hottentot; car il recouvre tout ſon corps de ſes propres excrémens. Sa peau délicate, fine & tranſparente demandoit apparemment à être défendue contre l'ardeur du Soleil; & tout a été bien diſpoſé dans l'Inſecte pour qu'elle le fût par les matieres qu'il rejette. Au lieu d'être placé, comme à l'ordinaire, du côté du ventre,

l'anus eſt placé du côté du dos, & l'inteſtin qui va y aboutir chaſſe les excrémens vers la tête. Il ne les pouſſe pas loin ; mais un mouvement ondulatoire des anneaux, que le Ver ſait diriger & modifier à propos, chaſſe la matiere de place en place, & l'étend peu-à-peu ſur le dos & ſur les côtés. Elle gliſſe facilement ſur la peau unie du petit Hottentot, & l'humidité qui la pénetre facilite encore ſa marche. A peine le Ver a-t-il mangé deux à trois heures, que tout le deſſus de ſon corps eſt recouvert d'une couche d'excrémens. Cette couche, d'abord très-mince, s'épaiſſit à chaque repas, & les repas de notre Inſecte ſont toujours copieux. Elle s'épaiſſit enfin au point d'acquérir un volume trois à quatre fois plus grand que celui de l'Animal. Affublé de cette énorme couverture, enterré, pour ainſi dire, ſous un monticule d'excrémens, il ne montre plus que ſa tête, qui eſt fort petite, & ſous cet aſpect étrange, il trompe l'œil du Spectateur peu inſtruit, qui croit ne voir qu'un tas d'excrémens. Cette épaiſſe enveloppe tient peu au corps de l'Inſecte, & quand il le veut il s'en débarraſſe facilement : quelquefois elle tombe d'elle-même, & une nouvelle lui ſuccede, qui ne coûte pas plus à fabriquer que la premiere. Cette ſorte de Teigne n'a ſimplement qu'à manger pour ſe vêtir. Son accroiſſement eſt aſſez

rapide : il ne lui faut qu'une quinzaine de jours pour acquérir la grandeur propre à l'Eſpece. Alors elle entre en terre & s'y conſtruit une coque qui mérite fort d'être examinée. L'extérieur ne préſente qu'un petit amas de terre : mais l'intérieur offre une tapiſſerie de ſatin qui a tout l'éclat de l'argent le plus pur. On la croiroit de la ſoie la plus fine & la plus luſtrée ; elle n'eſt pourtant formée que d'une matiere mouſſeuſe que la Teigne rend par la bouche, & qui ſe ſeche promptement à l'air. C'eſt avec cette matiere ſinguliere qu'elle lie les grains de terre qui recouvrent ſa coque & lui ſervent de défenſe. Après y avoir revêtu la forme de Nymphe, l'Inſecte ſe montre bientôt ſous celle d'un très-joli Scarabé, dont l'écaille brillante eſt du plus beau rouge de vermillon, & dont la tête, les jambes & le ventre ſont d'un noir très-luſtré.

Un autre Ver à ſix pieds, d'une figure plus remarquable que le précédent, & qui vit ſur l'Artichaut, ne couvre pas tout ſon corps de ſes excrémens & ne les applique pas immédiatement ſur ſa peau. Il a été mis en état de les employer avec plus d'art & de propreté. Il ne s'en fait pas une enveloppe ; il s'en fait un paraſol, auquel il donne la direction & l'élévation qu'il veut. Il l'incline en avant ou en arriere,

l'éleve ou l'abaiſſe ſelon ſes beſoins. Les pieces du paraſol ſont uniquement de la main de la Nature ; l'étoffe eſt fournie par l'Inſecte. Près de l'anus eſt attachée une longue fourchette écailleuſe & mobile, ſur laquelle les excrémens s'arrangent à meſure qu'ils ſortent. Bientôt toute la fourchette en eſt garnie, & l'Inſecte eſt en poſſeſſion d'un paraſol qui le met à l'abri du Soleil. Mais ce ne ſont pas ſeulement les matieres qu'il rejette par l'anus, qui ſervent à compoſer la toile du paraſol : comme bien d'autres Inſectes, il change de temps en temps de peau, & la peau dont il ſe défait s'ajuſte auſſi ſur la fourchette & ſert quelquefois de fond à l'étoffe du paraſol.

NOTRE curieuſe Teigne, ſi pourtant on peut donner ce nom à notre Ver à paraſol, ſe métamorphoſe ſur la feuille où elle a vécu, & ſans ſe faire de coque : parvenue à ſon dernier état, elle ſe montre ſous la forme d'un Scarabé, caractériſé par une ſorte de camail.

CHAPITRE XIII.

Les Inſectes qui habitent dans une ſorte d'écume.

†† LA Cigale, fameuſe par ſon chant, eſt une très-groſſe Mouche à quatre aîles. Il eſt d'autres Eſpeces de Cigales qui ne ſont connues que des Naturaliſtes, & qui en different par divers caracteres. Entre ces Eſpeces il en eſt une aſſez petite, qui, ſous ſes premieres formes de Ver & de Nymphe, mene un genre de vie fort ſingulier. Quand on ſe promene au Printemps dans les prairies, on rencontre fréquemment ſur les Plantes des amas d'une ſorte d'écume d'un blanc vif, toute imprégnée de bulles d'air, & qu'on prendroit pour de la ſalive (1): c'eſt au milieu de cette écume que vit l'Inſecte dont je veux parler. Il en eſt entiérement couvert, & pour parvenir à le voir il faut écarter délicatement ſon enveloppe, preſque toute aérienne: on met

(1) On a donné le nom d'*écumes printanniéres* à ces amas de matiere mouſſeuſe qu'on voit au Printemps ſur les Herbes des prairies. Le Peuple, qui en ignore la vraie nature, les prend pour des crachats de différens Animaux. POUPART eſt le premier qui nous en ait donné l'hiſtoire. Mr. de GEER l'a perfectionnée: il les avoit édudiées dès 1737. Je les avois auſſi obſervées en 1740, & vérifié la plupart des faits de POUPART.

alors à découvert un petit Animal tout nud, qui ſemble ſortir du bain. Sa peau, de couleur jaunâtre, paroît molle & délicate : il eſt porté ſur ſix pieds, & marche avec aſſez de vîteſſe. A l'aide d'une trompe, il pompe le ſuc d'une multitude de Plantes, & plus il pompe, plus il accroît l'amas d'écume ſous lequel il loge. Il la rejette peu-à-peu par l'anus. On voit alors le derriere très-mobile de l'Inſecte ſe donner divers mouvemens, s'alonger & ſe raccourcir, ſe dilater & ſe contracter, & l'écume ſortir ſous la forme de petites bulles qui s'arrangent les unes auprès des autres. Il s'en forme par degrés un amas conſidérable qui cache entiérement l'Inſecte. Cette ſinguliere enveloppe lui eſt bien néceſſaire : s'il en demeure privé, il ſe deſſeche & périt enfin. Elle peut encore le préſerver des attaques des Inſectes carnaſſiers (2).

Tandis que les Petits de cette ſorte de Cigale ſont jeunes encore, ils demeurent volontiers enſemble dans le même amas d'écume ; ils ſemblent travailler en commun à l'augmenter : mais quand ils ont pris un certain accroiſſement, ils ſe diſperſent ſur les Herbes, & on ne trouve alors, pour l'ordinaire, qu'un ſeul Ver

(2) Il eſt pourtant des Guêpes qui fondent dans l'écume & en enlevent l'Habitant pour le porter à leur guêpier.

ou une ſeule Nymphe dans chaque amas d'écume : il n'eſt pas rare cependant d'en rencontrer deux à trois. On juge bien que les amas d'écume qui recelent pluſieurs Nymphes ſont les plus gros. Il n'en eſt pas de ces Nymphes comme de celles de la plupart des Mouches, qui demeurent dans une parfaite immobilité juſqu'à leur transformation : elles ſont auſſi agiles que les Vers eux-mêmes, & ne peuvent en être diſtinguées que par deux tubercules qu'elles ont ſur le dos, & qui cachent les aîles de la Cigale (3).

C'EST au milieu même de l'écume que la Nymphe ſubit ſa transformation ; mais dans cette circonſtance importante l'écume ne touche plus la peau de l'Inſecte. Il s'en forme, on ne ſait encore comment, une ſorte de voûte mince, unie & tranſparente, qui l'environne de toute part à quelque diſtance. Sous cette voûte s'opere commodément la derniere métamorphoſe, & la Nymphe devenue Cigale, la perce auſſi-tôt pour ſe mettre en liberté & commencer un nouveau genre de vie tout différent du premier. Elle court & ſaute dans les

(3) Ce ſont donc des *demi-Nymphes* ou *fauſſes-Nymphes*. (Conſultez le Chap. IX de la Partie IX.)

praires, & cette vie vagabonde ſe termine chez les Femelles par la ponte des œufs (4).

CHAPITRE XIV.

L'Araignée qui ſe fait un logement de bulles d'air.

†† A la ſuite des Inſectes qui ſavent ſe loger ou ſe vêtir, s'offre une Araignée dont les procédés en ce genre ont bien plus encore de quoi nous ſurprendre par leur extrême ſingularité. Elle eſt déja très-remarquable par l'élément dans lequel elle vit. Les Araignées les plus généralement connues ſont des Inſectes purement terreſtres ; celle que je veux faire connoître vit au milieu des eaux dormantes : elle en ſort néanmoins de temps en temps pour chaſſer ſur leurs bords : elle eſt donc une eſpece d'Amphibie, mais qui eſt plus aquatique que terreſtre. Elle nage avec une merveilleuſe célérité, tantôt ſur le dos, tantôt ſur le ventre,

(4) Mr. de GEER a remarqué que cette Eſpece de Cigale pond ſes œufs en Automne, & qu'ils n'éclоſent qu'au Printemps. Le derriere de la Femelle eſt pourvu d'un bel inſtrument, compoſé d'un aſſemblage de quatre lancettes écailleuſes, deſtinées ſans doute à faire dans les Plantes les entailles qui doivent loger les œufs.

& plus ſouvent encore ſur le dos. Elle eſt une admirable plongeuſe, & pourſuit ſa proie juſqu'au fond de l'eau avec une agilité ſurprenante. D'autrefois elle la pourſuit ſur terre, & après l'avoir ſaiſie, elle la tranſporte au fond de l'eau. C'eſt là qu'elle ſe pratique un logement qui eſt unique en ſon genre. Elle en poſe les fondemens ſur quelques brins d'Herbes, & ce fondement eſt de pure ſoie. Elle s'éleve enſuite à la ſurface de l'eau en nageant ſur le dos, expoſe ſon ventre à l'air, & comme il eſt toujours enduit d'une ſorte de vernis, l'eau ne ſauroit s'y attacher, mais l'air s'y attache; un inſtant après elle le retire promptement ſous l'eau, chargé d'une lame d'air qui y eſt demeurée adhérente, & qu'elle va placer adroitement dans ſon tiſſu ſoyeux. Elle répete auſſi-tôt la même manœuvre, s'éleve de nouveau à la ſurface de l'eau, préſente ſon ventre à l'air, replonge à l'inſtant, & va dépoſer une ſeconde bulle d'air à côté de la premiere. Elle multiplie ſes courſes, continue ſon travail, & ſe trouve enfin en poſſeſſion d'un petit édifice tout aérien, j'ai preſque dit d'un palais enchanté, qui lui procure une retraite aſſurée & commode où elle loge à ſec au milieu de l'eau. Mais elle deſire un peu plus de ſolidité à ſon édifice; elle veut ſur-tout que les bulles d'air qui en ſont les matériaux, ne puiſſent

s'échapper ; dans cette vue elle le recouvre extérieurement de ſoie dont les fils très-fins ſont fort rapprochés. Elle ſort de ce palais enchanté pour ſe promener aux environs & chaſſer aux Inſectes. Dès qu'elle en eſt ſortie, le palais ſe reſſerre de lui-même, ſa capacité diminue ; bientôt l'Araignée y rentre chargée d'une proie : il s'élargit auſſi-tôt ; l'Araignée s'y trouve logée à l'aiſe & y dévore ſa proie en ſûreté.

Le Mâle & la Femelle entendent également à conſtruire ce logement ſingulier. Dans la ſaiſon des amours, le Mâle quitte le ſien, s'approche de celui de la Femelle, s'y introduit, l'agrandit même par la bulle d'air qu'il porte avec lui, & le logement devient une chambre nuptiale où les heureux Amans ſe prodiguent leurs faveurs (1).

(1) Chez les Araignées, la fécondation s'opere d'une maniere fort particuliere. Les parties ſexuelles du Mâle ſont placées dans un endroit où l'on ne s'aviſeroit pas de les chercher : elles ſont placées dans ſes antennes. On n'a pas oublié que les *antennes* ſont ces deux cornes-mobiles, que les Inſectes portent à la tête, & dont on ignore encore le véritable uſage. (Part. III, Chap. XVIII.) Les antennes de l'Araignée Mâle ſont terminées par un bouton qui renferme la partie deſtinée à féconder la Femelle. Chez ces Inſectes féroces, & qui ſe dévorent les uns les autres, les approches du Mâle & de la Femelle ne ſe font qu'avec précaution, & dans la ſaiſon où l'amour adoucit leur férocité naturelle. En tout autre temps les Araignées vivent dans la plus grande ſolitude au centre de leur toile, & évitent

avec ſoin la rencontre de leurs ſemblables. Mais dans le temps des amours on voit ſouvent deux Araignées ſur la même toile, & on les reconnoît aiſément pour deux Individus de ſexes différens, que les mêmes beſoins tendent à rapprocher. Le Mâle fait toutes les avances : il s'approche à pas lents & meſurés ; il montre de la défiance, & ſemble craindre de n'être pas bien reçu : il s'enhardit néanmoins, & quoique beaucoup plus petit & moins fort que la Femelle, il oſe s'en approcher au point de la toucher d'une de ſes pattes ; mais, ſaiſi auſſi-tôt d'une frayeur ſubite, il recule à l'inſtant : la Femelle demeure pourtant immobile au centre de ſa toile, la tête tournée en en-bas, & ne paroît point chercher à intimider le Mâle. Bientôt il réitere ſes approches, & devenu plus hardi, il ſollicite plus vivement des faveurs qu'on n'eſt point dans l'intention de lui refuſer : le bouton d'une de ſes antennes s'ouvre ; il en ſort un petit corps charnu qu'il applique à la partie ſexuelle de la Femelle, placée ſous le ventre, aſſez près du corcelet : il répete la même manœuvre avec l'autre antenne, & la femelle eſt rendue féconde. Telles ſont, en particulier, les amours de ces Araignées de Jardin qui ſe filent des toiles verticales en polygones, & dont pluſieurs Eſpeces ſont remarquables par leurs belles couleurs : les amours de quelques autres Eſpeces offrent d'autres particularités que je ne m'arrêterai pas à décrire.

Mr. GEOFFROY, un des Hiſtoriens des Inſectes, a vérifié ces faits, qui avoient déja été obſervés par les LYONET & les GEER, & il a vérifié pareillement ceux qui concernent l'Araignée aquatique, qui avoient été découverts par un Anonyme.

CHAPITRE XV.

L'Araignée mineuſe.

†† NOUS avons vu des Inſectes qui minent dans le parenchyme des feuilles des Plantes, & qui s'y pratiquent des boyaux ou des galeries, comme nos Mineurs en pratiquent dans la terre (1). Ils en ont pris le nom de Mineurs de feuilles. Il eſt un autre Inſecte, d'un genre très-différent, auquel le nom de *Mineur* paroît bien mieux convenir, parce que c'eſt dans la terre qu'il mine, & cet Inſecte eſt une Araignée, fort ſemblable par ſon extérieur à celle des caves; mais qui en differe beaucoup par ſon genre de vie & ſon induſtrie. Elle s'établit ſur la pente plus ou moins rapide d'une glaiſe franche & pelée, où l'eau des pluies puiſſe s'écouler facilement. Elle y creuſe avec ſes fortes pinces une mine en galerie, d'environ deux pieds de longueur, & dont la largeur, par-tout à-peu-près égale & proportionnée à ſa groſſeur, lui permet de monter & de deſcendre commodément dans le ſouterrein. Elle en tapiſſe tout l'intérieur de

(1) Conſultez le Chap. VIII de cette Partie.

toile de ſoie qui facilite encore ſa marche, retient les grains de terre qui pourroient ſe détacher de la mine, & l'avertit de ce qui ſe paſſe à l'entrée. Là eſt un ouvrage étonnant pour être fait de main d'Inſecte, & qu'on ſeroit même tenté de révoquer en doute, s'il n'avoit été bien vu & bien décrit par un Naturaliſte exact (2). Cet ouvrage, unique chez les Inſectes, eſt une porte ou plutôt une vraie trappe, formée de pluſieurs couches d'une terre détrempée, liée avec de la ſoie, & dont les contours ſont ſi parfaitement circulaires, qu'ils ſemblent tracés au compas. Le derriere de la trappe ou la face qui regarde l'intérieur de la mine eſt convexe & unie : la face extérieure, qui eſt à fleur de terre, eſt, au contraire, plane & raboteuſe, & ſe confond ſi bien avec le terrein voiſin, qu'on ne ſauroit l'en diſtinguer ; & on juge facilement que l'adroite Mineuſe l'a voulu ainſi pour mieux dérober le lieu de ſa retraite.

Mais je n'ai point dit encore tout ce que le travail de cette ingénieuſe trappe renferme de plus admirable ; je crains ſeulement que ce qu'il me reſte à en rapporter ne paroiſſe fabuleux. Sa face poſtérieure eſt doublée d'une toile, dont les

(2) Mr. l'Abbé Sauvages.

fils très-forts & très-ſerrés ſe prolongent de maniere qu'ils forment une ſorte de *penture* (3) qui ſuſpend artiſtement la trappe à la partie la plus élevée de l'ouverture de la galerie. Au moyen de cette penture, comme à l'aide d'une charniere, la trappe peut s'élever & s'abaiſſer, ouvrir & fermer la galerie. Son propre poids ſuffit à l'abaiſſer, ſoit parce que la galerie eſt fort inclinée à l'horiſon, ſoit parce que la Mineuſe a eû l'adreſſe de la ſuſpendre à la partie ſupérieure de l'ouverture, comme ſi elle connoiſſoit l'effet de la peſanteur. Cette ouverture eſt façonnée en entonnoir, & ſon évaſement forme une eſpece de feuillure contre laquelle la trappe va battre quand elle s'abaiſſe. Elle s'ajuſte alors avec tant de préciſion dans la feuillure, qu'elle ne laiſſe par-dehors aucune priſe pour la ſoulever, & qu'elle ſemble faire corps avec la feuillure. Si pourtant on introduit adroitement la pointe d'une épingle dans le joint, on parvient à ſoulever un peu la trappe, mais alors on éprouve une réſiſtance dont on eſt étonné. Elle augmente à meſure qu'on tente de ſoulever davantage la trappe. Mon Lecteur devine-t-il ce qui produit cette réſiſtance? L'Araignée avertie par l'ébran-

(3) On nomme *penture*, en terme de l'art, cette bande de fer qui ſert à ſoutenir une porte.

lement

lement léger que l'épingle occaſione dans les fils qui ſe prolongent le long de la galerie, accourt promptement à la porte, cramponne ſes pattes d'un côté aux parois de la galerie, de l'autre à la porte, & ſe renverſant en arriere, elle fait effort pour la tirer à elle. Ainſi la porte s'ouvre & ſe ferme alternativement, ſuivant que l'Obſervateur l'emporte dans ce petit combat ſur l'Araignée, ou l'Araignée ſur l'Obſervateur. Mais on ſent bien de quel côté la victoire doit pencher, & l'on n'en eſt pas moins étonné qu'un ſi petit Animal puiſſe faire une ſi grande réſiſtance. L'Obſervateur force enfin la porte, ou la ſouleve entiérement, & l'Araignée eſt réduite à fuir à toutes jambes au fond de ſa galerie. On peut répéter bien des fois les mêmes procédés avec l'induſtrieuſe Mineuſe, & éprouver chaque fois de ſa part la même réſiſtance. Toujours elle accourt à ſa porte & fait les plus grands efforts pour empêcher qu'on ne l'ouvre.

Appellée à vivre dans la retraite la plus obſcure, cette Araignée ſemble ne pouvoir ſupporter l'éclat du grand jour. Quand on la retire de ſa mine, ſon agilité naturelle l'abandonne; elle paroît languiſſante & comme engourdie; & ſi elle fait quelques pas, c'eſt en chancelant. On ne peut même parvenir à la conſerver long-temps

hors de ſa mine, & toutes les Araignées de cette Eſpece qu'on renferme dans des vaſes, y périſſent (4).

(4) On deſireroit que Mr. l'Abbé SAUVAGES eût pu ſuivre l'habile Mineuſe dans ſon curieux travail. C'en eſt un bien conſidérable pour un ſi petit Inſecte, que celui de ſe creuſer dans la glaiſe une galerie d'environ deux pieds de longueur : mais c'eſt ſur-tout à la conſtruction de l'admirable trappe qu'on voudroit le voir occupé. Le lieu où elle eſt conſtruite rend l'obſervation bien difficile. On pourroit pourtant imaginer des moyens qui en diminueroient la difficulté. La Mineuſe ne refuſeroit peut-être pas de travailler ſous les yeux de l'Obſervateur. J'ai ſouhaité de ſavoir, ſi depuis la publication de ſon intéreſſante obſervation en 1758, Mr. SAUVAGES n'avoit rien découvert de nouveau ſur ſon Araignée : je l'ai donc fait interroger par un Ami, & ſa réponſe a été qu'il n'avoit rien de plus à m'en apprendre. Il ne nous a pas dit le principal uſage de cette trappe ſinguliere qu'il nous a ſi bien décrite. On pourroit ſoupçonner que l'Araignée a un moyen de la ſoulever de temps en temps, & que lorſqu'un Inſecte ſe préſente à l'ouverture du ſouterrein, elle la laiſſe ſur-le-champ retomber pour retenir la proie captive. La trappe ſeroit ainſi un piege que la Mineuſe tendroit aux Inſectes. On trouve cette Araignée aux environs de Montpellier : mais, ſans doute qu'elle n'eſt pas propre au Languedoc.

CHAPITRE XVI.

Réflexions sur ces divers procédés des Insectes.

Vous avez parcouru d'une vue rapide les procédés d'une multitude d'Insectes différens, & vous vous étonnez avec raison de la grande variété qui regne dans ces procédés, tous relatifs à une même fin générale, & tous aussi diversifiés que le sont ceux de nos Artisans ou de nos Artistes. D'où vient que parmi les Insectes qui se préparent à la métamorphose, les uns se pendent par le derriere, les autres se lient avec une ceinture, d'autres se construisent des coques? D'où vient que parmi ceux qui se construisent des coques, les uns les font de pure soie, tandis que les autres y emploient des matieres de divers genres? Pourquoi la forme de ces coques est-elle si différente chez différentes Especes? Pourquoi est-il des Insectes qui roulent artistement les feuilles des Plantes, tandis que d'autres ne font que les lier ou les plier? D'où vient que d'autres minent ces feuilles, & pourquoi ne les minent-ils pas tous de la même maniere? Pourquoi enfin, toutes les Teignes ne portent-elles pas le même habit?

Tous ces pourquoi, & mille autres qu'on peut former ſur les productions de la Nature, ſont autant d'énigmes pour des Etres relégués dans un coin de l'Univers, & dont la vue, auſſi courte que celle de la Taupe, ne ſauroit appercevoir que les objets les plus voiſins & les rapports les plus directs & les plus ſaillans. Les ouvrages des Inſectes ſont les derniers réſultats de leur organiſation, & cette organiſation répond au rôle qu'ils devoient jouer dans la grande Machine du Monde. Ils en ſont, à la vérité, de bien petites Pieces; mais ces Pieces concourent à un effet général par leur engrenement avec des Pieces plus importantes. Ainſi la ceinture que ſe file une Chenille, a ſes rapports à l'Univers, comme l'Anneau de Saturne. Mais, combien de Pieces différentes interpoſées entre la ceinture & l'Anneau, & entre Saturne & les Mondes de Syrius! Si l'Univers eſt un Tout, & comment en douter après tant & de ſi belles preuves d'un enchaînement univerſel (1)? la ceinture de la Chenille tiendra donc auſſi aux Mondes de Syrius. Quelle Intelligence que celle qui ſaiſit d'une ſeule vue cette chaîne immenſe de rapports divers, & qui les voit ſe réſoudre tous dans l'Unité & l'Unité dans ſa CAUSE!

(1) Part. I, Chap. III & VII.

Il faut bien que nous demeurions dans la place qui nous a été assignée, & d'où nous ne pouvons découvrir que quelques chaînons de la chaîne. Un jour nous en découvrirons davantage, & nous les verrons mieux. En attendant, nous pouvons enviſager les procédés ſi variés & ſi induſtrieux des Inſectes, comme un agréable ſpectacle que la Nature préſente aux yeux de l'Obſervateur, & qui devient pour lui une ſource intariſſable de plaiſirs réfléchis & d'inſtructions utiles. Il eſt conduit à l'Auteur de l'Univers par le fil de la Chenille, & il admire dans la variété des moyens, & dans leur tendance au même but, la fécondité & la ſageſſe de l'Intelligence Ordonnatrice.

Le Spectacle eſt plus intéreſſant encore, lorſque l'Obſervateur entreprend de dérouter les Inſectes & de les tirer de leur cercle naturel. Ils montrent alors des reſſources qu'il n'avoit pas lui-même prévues & qui trompent ſon attente. Lorſque les Fauſſes-teignes de la cire manquent de cire, elles ſavent ſe faire des galeries de cuir, de parchemin ou de papier. On a vu une Chenille parvenir à ſe conſtruire une coque avec de petits morceaux de papier qu'on lui avoit offerts & qu'on avoit coupés comme on avoit voulu. Elle les ſaiſiſſoit avec ſes dents & ſes premieres

jambes, les tranſportoit au lieu où elle s'étoit établie, les mettoit en place, les lioit avec des fils, poſoit les uns ſur la tranche, les autres de plat, & formoit de tout cela un aſſemblage un peu bizarre, il eſt vrai, mais qui répondoit parfaitement à une coque. Elle lui auroit donné une figure plus réguliere ſi elle avoit travaillé avec les matériaux deſtinés à ſon Eſpece. Avant que nous euſſions appris à préparer & à apprêter les laines & les peaux des Animaux, les Teignes domeſtiques n'alloient pas apparemment toutes nues (2). Peut-être qu'elles s'habilloient alors à la maniere des Teignes champêtres (3). Cette réflexion nous achemine à tenter d'obliger différentes Teignes à ſe vêtir différemment. Il ſeroit curieux encore d'en obliger d'autres à aller nues. Il s'en trouveroit probablement qui ſe paſſeroient fort bien d'habit. Une ſuite de générations de ces Teignes, élevées nues, nous

(2) †† Les draps & les fourrures ne ſont pas les ſeuls alimens qui conviennent aux Teignes domeſtiques : elles s'accommodent très-bien des plumes des Oiſeaux, & les emploient auſſi dans la fabrique de leur fourreau.

(3) †† Je ne veux pas dire à la maniere des Mineuſes : l'induſtrie des Teignes mineuſes differe trop de celles des Teignes domeſtiques : mais on peut ſuppoſer avec fondement, que les Teignes domeſtiques ſe ſervoient alors des poils des Végétaux ou de brins d'Herbes fort déliés. Il faudroit eſſayer d'obliger des Teignes de cette Eſpece à ſe vêtir de pareils poils, &c.

apprendroit ſi elles oublieroient enfin l'art de ſe vêtir, &c. &c.

CHAPITRE XVII.

Procédés des Coquillages. La Moule de riviere.

Nous n'attendons pas beaucoup des Coquillages : renfermés dans un étui preſque pierreux & qui fait partie de leur être, ils nous paroiſſent bien lourds, & pour peu qu'ils nous montrent d'induſtrie, nous leur en tiendrons grand compte. Tous ne ſont pourtant pas auſſi lourds qu'ils le paroiſſent : nous allons contempler avec plaiſir les procédés de quelques-uns.

Vous ſavez, que les Moules habitent une coquille à deux battans. Les deux pieces ſont unies par une ſorte de charniere, que la Moule fait jouer pour ouvrir & fermer à ſon gré la coquille. La ſtructure de l'Animal n'eſt pas notre objet actuel : nous voulons voir ce qu'il ſait faire. Il s'agit de la Moule des Rivieres.

En voilà une dont la coquille repoſe à plat ſur le ſable. Dans peu de temps, cette coquille ſera aſſez loin du lieu où elle vous paroît main-

tenant collée. Ce ne ſera pas la riviere qui lui ſera changer de place ; ce ſera la Moule elle-même qui la tranſportera.

Vous cherchez à pénétrer comment elle s'y prendra, & vous ne le découvrez point. Laiſſez-la faire, & ſuivez-la. Elle entr'ouvre ſa coquille : elle en fait ſortir une eſpece de langue ou de trompe charnue. Je vous préviens, que ſon deſſein eſt de mettre ſa coquille ſur le tranchant : elle repoſe encore ſur un de ſes côtés, & ce côté eſt à-peu-près plat & le terrein horiſontal. Comment donc réuſſira-t-elle à élever la coquille & à la poſer ſur ſa tranche ? Elle n'a pour tout inſtrument que ſa trompe.

Avec cette trompe, elle laboure le ſable autour de ſa coquille ; elle creuſe un petit foſſé ; elle y fait tomber la coquille, qui ſe trouve ainſi poſée preſque verticalement ſur ſon tranchant. La Moule porte ſa trompe en avant ; elle l'alonge le plus qu'elle peut ; elle en cramponne l'extrémité dans le ſable, & à l'aide de ce point d'appui, elle tire à elle la coquille, qui acheve de ſe relever : la voilà qui poſe toute entiere ſur ſa tranche.

Mais, la Moule veut aller en avant. Sa trompe

trace dans le ſable un ſillon ou une rainure : elle ſe cramponne comme la premiere fois : la Moule tire à elle la coquille ; celle-ci gliſſe dans la rainure, qui la maintient ſur ſon tranchant. La Moule fait ainſi chemin, & nous montre dans ſa méchanique une reſſource que nous n'avions pas imaginée. Sa trompe lui tient lieu de mains & de pieds, & ſuffit à tout : auſſi eſt-elle plutôt une main ou un pied, qu'une véritable trompe.

CHAPITRE XVIII.

Autres Coquillages. La Telline.

DIVERS Coquillages de Mer dont la coquille eſt encore à deux battans, ſe meuvent par une méchanique peu différente. La plupart ſont pourvus de deux tuyaux, au moyen deſquels ils reſpirent l'eau, & qu'ils ont grand ſoin de tenir élevés au-deſſus de la vaſe dans laquelle ils ont coutume de s'enfoncer plus ou moins. Il en eſt qui font jaillir l'eau à pluſieurs pieds de diſtance (1).

(1) †† Les Lavignons, les Sourdons, les Palourdes, &c. ſont du nombre de ces Coquillages de Mer, dont la coquille eſt

La partie unique, qui dans quelques-uns exécute le mouvement progreſſif ou rétrograde, reſſemble fort bien à une véritable jambe munie de ſon pied; mais cette jambe eſt un Prothée, qui prend toutes ſortes de formes pour ſatiſfaire aux beſoins de l'Animal. Elle ne lui ſert pas ſeulement à ramper, à s'enfoncer dans la vaſe ou à s'en retirer; mais, il s'en ſert encore avec beaucoup d'adreſſe pour exécuter un mouvement dont on ne ſe douteroit pas qu'un Coquillage fût capable.

Un Coquillage qui ſaute doit paroître un ſpectacle bien nouveau. C'eſt une Telline que vous avez actuellement ſous les yeux. Remarquez qu'elle a mis ſa coquille ſur la pointe ou

bivalve, & qui s'enfoncent plus ou moins dans la vaſe. Ils appartiennent au genre des Cames. Les tuyaux des Sourdons, en particulier, ſont des eſpeces de pompes aſpirantes & foulantes, qui attirent & rejettent alternativement l'eau de la Mer. Ceux de la Palourde peuvent faire jaillir l'eau à près de quinze pieds de diſtance.

Les Cames, proprement dites, ſavent voguer ſur une Mer tranquille, ou qui n'eſt agitée que par les Zéphirs. Elles élevent alors un des battans de leur coquille & s'en ſervent comme de voile, tandis que l'autre leur tient lieu de nacelle. On voit de petites flottes de ces Cames voguer ainſi au gré des vents. Survient-il quelqu'ennemi? les Cames referment leur coquille, ſe plongent au fond de l'eau, & la petite flotte diſparoît. Les Cames auroient donc un moyen que nous ne connoiſſons pas de regagner la ſurface de l'eau.

le ſommet, comme pour diminuer les frottemens. Elle alonge ſa jambe le plus qu'il lui eſt poſſible ; elle lui fait embraſſer une portion conſidérable du contour de la coquille, & par un mouvement ſubit, analogue à celui d'un reſſort qui ſe débande, elle frappe de ſa jambe le terrein, & ſaute ainſi à une certaine diſtance.

CHAPITRE XIX.

Le Coutelier.

Le Coutelier ne rampe point. Il perce le ſable perpendiculairement. Il s'y creuſe un trou ou une ſorte de cellule, qui a quelquefois deux pieds de longueur, & dans laquelle il monte & deſcend à ſon gré. Sa coquille, dont la figure imite un peu celle d'un manche de couteau, lui a fait donner le nom de Coutelier. Elle eſt compoſée de deux longues pieces creuſées en gouttiere, & réunies par des membranes. C'eſt un étui qui renferme le corps de l'Animal. La partie à l'aide de laquelle il exécute tous ſes mouvemens, eſt logée au centre. Elle eſt deſtinée à faire principalement la fonction de jambe, & elle s'en acquitte au mieux. Elle eſt charnue, cylin-

drique & assez longue. Son bout peut, quand il le faut, s'arrondir en maniere de boule.

Voyez ce Coutelier étendu de son long sur le sable. Il va travailler à s'y enfoncer. Il fait sortir sa jambe par le bout inférieur de la coquille : il l'alonge & fait prendre à son extrémité la forme d'une pêle tranchante des deux côtés & terminée en pointe. Il la dirige vers le sable, & se sert du tranchant & de la pointe pour l'y engager un peu avant. L'ouverture faite, il alonge sa jambe encore davantage ; il la fait pénétrer plus bas dans le sable, il la recourbe en crochet, & saisissant avec ce crochet un point d'appui, il tire à lui la coquille, l'oblige à se redresser peu-à-peu & à descendre dans le trou. Veut-il continuer à s'enfoncer ? il fait sortir toute sa jambe hors de la coquille ; il engage dans le sable la boule qui la termine alors ; il raccourcit aussi-tôt cette jambe ; sa grosse tête, engagée fortement dans le trou, résiste plus à remonter, que la coquille à descendre : elle descend donc, & c'est un premier pas que le Coutelier fait dans le sable : il n'a qu'à répéter les mêmes manœuvres pour s'enfoncer toujours plus. Veut-il remonter ? il ne fait sortir que la boule ; il fait en même temps effort pour alonger la jambe : la boule qui résiste

à deſcendre, pouſſe la coquille vers le haut du trou.

Il eſt aſſez ſingulier que le Coutelier, qui vit dans l'eau ſalée, craigne le ſel. Si l'on en jette une pincée dans ſon trou, il en ſortira promptement. Si on le prend, & qu'on le laiſſe enſuite rentrer dans ſa cellule, on aura beau y jetter du ſel, il n'en ſortira plus. On diroit qu'il ſe ſouvient d'avoir été pris, & cela eſt ſi vrai, que lorſqu'on ne cherche point à le prendre, on le fait toujours ſortir à volonté, en jettant du nouveau ſel dans le trou. Il ſemble donc qu'il connoiſſe le piege qu'on lui tend, & qu'il ne veuille pas s'y laiſſer prendre.

CHAPITRE XX.

Les Dails ou Pholas.

Jettez les yeux ſur cette pierre que je viens de ramaſſer au bord de la Mer. Un Coquillage vivant y fait ſa demeure. Si je n'ajoutois pas qu'il eſt vivant, vous croiriez que je veux vous montrer une pétrification, & votre curioſité ne ſeroit pas excitée par une choſe ſi commune.

REMARQUEZ ſur la ſurface de la pierre un trou fort petit : c'eſt par-là que le Coquillage y eſt entré, & vous jugez de la petiteſſe de ce Coquillage par celle de cette ouverture. Partageons la pierre pour voir le ſingulier Animal qui l'habite. Quelle n'eſt point votre ſurpriſe ! voilà un gros Coquillage, qui a plus de trois pouces de longueur, & dont la coquille eſt formée de trois pieces unies par une membrane ligamenteuſe (1). Il eſt logé dans une grande cavité, creuſée en maniere d'entonnoir ou de cône tronqué. Le ſommet du cône eſt dans ce petit trou que vous voyez à la ſurface de la pierre. Ce Coquillage eſt un Dail ou un Pholas. Comment a-t-il pu parvenir à percer une pierre ſi dure ? Comment a-t-il pu paſſer par un trou ſi petit ?

APPROCHEZ-VOUS de ce banc de terre glaiſe où le flot va mourir. Il eſt percé d'une multitude de trous pareils à celui de la pierre que vous avez à la main. Tous ces trous ſont habités

(1) †† Il n'eſt pas apparemment bien facile de déterminer le nombre des pieces de la coquille du Dail. Mr. de REAUMUR, que je ſuivois ici, lui en donnoit trois. D'autres Naturaliſtes ne lui en donnent que deux, & Mr. la FAILLE lui en donne ſix. Y auroit-il pluſieurs Eſpeces de ces Coquillages diſtinguées par le nombre des pieces de leur coquille ? ou les pieces principales de la coquille ſeroient-elles diviſées, ou, ſi l'on veut, compoſées ?

par de jeunes Dails, qui n'ont que quelques lignes de longueur. Ils n'ont donc pas eu à percer une pierre dure : une ſimple glaiſe & une glaiſe abreuvée réſiſte peu. Mais la Mer convertit inſenſiblement cette glaiſe en pierre : le Dail, qui ſe trouvoit d'abord logé dans une terre molle, ſe trouve par la ſuite niché dans une cellule pierreuſe.

Le mouvement progreſſif de ces Coquillages eſt ſans doute le plus lent qu'il y ait dans la Nature ; car il ſuit les proportions de leur accroiſſement. A meſure qu'ils croiſſent, ils s'enfoncent davantage. Ainſi la meſure de l'accroiſſement eſt celle du mouvement progreſſif. De-là vient que la cellule eſt un entonnoir renverſé.

Nous avons vu, que le Coutelier ſort de ſon trou quand il lui plaît ; le Dail ne ſort jamais du ſien, & n'en peut ſortir : la forme de cette ſorte de cellule s'y oppoſe. Tout ce qu'il peut faire, c'eſt d'alonger deux tuyaux à l'ouverture du trou avec leſquels il tire & rejette l'eau. Le Coutelier en fait de même.

Vous êtes impatient de connoître l'inſtrument au moyen duquel le Dail creuſe ſa cellule. Cet inſtrument n'a rien de tranchant : il eſt purement

charnu & taillé en forme de loſange. Vous jugez avec raiſon qu'il doit opérer bien lentement, mais vous ne vous doutez peut-être pas, qu'il eſt capable de percer la glaiſe pétrifiée : au moins eſt-il très-ſûr qu'il peut percer le bois. Apparemment que les Dails vivent long-temps, puiſque ce n'eſt que très à la longue que la glaiſe ſe pétrifie (2).

(2) †† Je venois de dire, que le Dail *eſt capable de percer la glaiſe pétrifiée ;* & cela eſt très-vrai. Des Naturaliſtes dont le témoignage mérite la plus grande confiance, tels que MM. VALLISNIERI, la FAILLE, FORTIS, FOUGEROUX, ont rigoureuſement démontré que les Dails percent la pierre & même le marbre le plus dur. On trouve des Dails dans les pierres des fortifications de Toulon, & dans les colonnes d'un vieux Temple d'ESCULAPE près de Naples; & les Dails qui logent dans ces pierres & dans ces colonnes ſont vivans, & il en eſt de toute grandeur. Mr. FOUGEROUX, qui a beaucoup étudié ce Coquillage, n'eſt point parvenu à découvrir la méchanique au moyen de laquelle il perce la pierre, & ne nous donne là-deſſus que de légeres conjectures. Mr. la FAILLE m'écrivoit de la Rochelle en Novembre 1765 : *que ce n'eſt point la partie charnue de l'Animal, ou la partie faite en loſange, qui lui ſert à creuſer ſa cellule dans les banches du rivage ; mais, qu'il y emploie uniquement les dents dont ſa coquille eſt armée à l'extérieur, & qui font ſur la pierre l'effet d'une rappe.* Au rapport de Mr. ADANSON, le Dail du Sénégal ſe loge dans un limon un peu durci.

Les Dails ſont phoſphoriques au-dehors & au-dedans, & la liqueur qui ſort de leur corps eſt phoſphorique auſſi. Les Dails deſſéchés perdent leur lumiere ; mais ils la recouvrent en partie lorſqu'on les humecte. Les corps qu'on humecte de la liqueur de ces coquillages, paroiſſent lumineux ; & lorſque cette lumiere

CHAPITRE

CHAPITRE XXI.

Divers Inſectes ou Animaux de Mer. Les Orties.

LAISSONS pour quelque temps les Coquillages ; nous les reprendrons enſuite. Divers Inſectes ou Animaux de Mer ont auſſi à nous entretenir des merveilles de leur AUTEUR. Prêtons-leur l'attention qu'ils méritent : ce qu'ils nous diront vaudra bien un Chapitre de Théologie naturelle.

SUR ces rochers qui bordent la Mer, vous appercevez de petites maſſes charnues, de la groſſeur d'une Orange, & dont la forme imite

empruntée s'éteint, on la fait reparoître en plongeant ces corps dans l'eau ; mais alors elle eſt beaucoup plus foible.

Le Coquillage de Mer bivalve, qu'on nomme *Datte* ſur les Côtes de Provence, & qu'on range parmi les Moules, eſt phoſphorique comme le Dail. Il perce auſſi les pierres les plus dures, & ſe loge encore dans différens Coquillages, dans les Madrepores & d'autres Corps marins.

Malgré les retraites que les Dails & les Dattes ſavent ſe creuſer dans les corps les plus durs, il ne laiſſent pas d'y être attaqués par des Scolopendres & d'autres Inſectes de Mer, qui ont été inſtruits à pénétrer dans ces retraites profondes & obſcures : tant il eſt établi dans la Nature, que chaque Eſpece d'Êtres vivans a ſes Ennemis, & que tout y ſubſiſte par un combat perpétuel.

celle d'une bourſe de jettons, qui eſt aſſez celle d'un cône tronqué. Toutes ces maſſes vous paroiſſent immobiles & collées au rocher par leur baſe. Les unes ſont chagrinées, les autres liſſes. Nous venons de les comparer à une bourſe de jettons; mais cette bourſe n'eſt pas pliſſée, & elle manque de cordons. Ce ſont des Orties (1) que vous voyez; Animaux fort ſinguliers, & qui

(1) †† Le nom d'*Ortie* eſt très-impropre, & ne réveille l'idée d'aucun des caracteres par leſquels l'Animal eſt connu. Le nom de *Cul-de-Cheval* qu'il porte ſur quelques Côtes de France, réveille au moins l'idée de ſa figure: celui de *Méduſe* que lui a donné le PLINE du Nord paroîtra peut-être préférable. Les Anciens lui avoient impoſé celui d'Ortie, parce qu'ils s'étoient imaginé fauſſement qu'il produiſoit ſur la main le même effet que la Plante de même nom. Les dénominations ne ſont pas des choſes indifférentes, & il ſeroit à ſouhaiter que celles par leſquelles on déſigne les Êtres de la Nature réveillaſſent toujours dans l'eſprit l'idée de quelqu'un des caracteres principaux par leſquels ces Êtres s'offrent d'abord à nous. Les Nomenclateurs rangent les Orties de Mer parmi ces Animaux que leur molleſſe naturelle les porte à nommer des *Molluſques*; tels ſont tous les genres de Polypes, & en général la plupart des *Zoophytes*. Mais les claſſifications de ces Êtres marins, qui ne repoſent ſouvent que ſur des fondemens très-légers, fourmillent d'imperfections, & l'arbitraire y domine par-tout. Chaque jour la Mer offre aux Obſervateurs des formes nouvelles & inſolites, qu'ils ne ſauroient rapporter à des formes connues, & que les Nomenclateurs ne ſavent comment déſigner & claſſer. La Mer eſt bien plus riche que la Terre en Productions ſingulieres, & tout l'art des plus habiles Nomenclateurs s'épuiſe bientôt quand ils oſent entreprendre de les aſſujettir à leurs méthodes. On peut en juger par les divers échantillons que

demandent à être obſervés de plus près. Le corps de l'Animal eſt en effet renfermé dans une ſorte de bourſe charnue, de figure conique. Au ſommet du cône eſt une ouverture que l'Ortie augmente ou diminue à ſon gré.

PARCOURONS les Orties que nous avons actuellement ſous les yeux : en voilà une qui s'ouvre & s'épanouit comme une fleur (2). Elle a fait ſortir cent cinquante cornes charnues, ſemblables à celles des Limaçons, diſtribuées ſur trois rangs autour de l'ouverture. Vous remarquez que de petits jets-d'eau jailliſſent de ces cornes : elles n'ont donc pas les mêmes fonctions que celles du Limaçon : vous jugez qu'elles ſont analogues aux tuyaux des Dails, des Couteliers & des autres Coquillages que vous avez vus, & ce jugement eſt très-vrai.

VOUS remarquez encore, que la figure de toutes ces Orties varie beaucoup ; que leur baſe eſt tantôt circulaire, & tantôt ovale, & que la hauteur du cône varie comme les dimenſions de

nous préſentent les Mémoires que l'infatigable DICQUEMARE publie de temps en temps.

(2) †† Les couleurs agréables & variées de diverſes Orties rendent cette comparaiſon avec une fleur plus juſte encore.

ſa baſe. Il s'éleve ou s'abaiſſe ſuivant que la baſe ſe rétrécit ou s'élargit.

TOUCHEZ une de ces Orties épanouies ; voyez avec quelle promptitude elle ſe ferme & ſe contracte. Mais vous n'appercevez point de mouvement progreſſif : les Orties ſont-elles donc condamnées à paſſer toute leur vie collées à la même place ? Les Anciens l'ont cru. Que devons-nous en penſer ?

IL y a environ une heure que cette groſſe Ortie, que vous avez à votre droite, touchoit cette pointe du rocher : remarquez qu'elle en eſt à préſent éloignée de plus d'un pouce. Vous vous étonnez de ne l'avoir point apperçu cheminer, car vous l'avez regardée plus d'une fois : c'eſt que ce mouvement progreſſif eſt auſſi lent que celui de l'aiguille d'une horloge. Nous devons être curieux de connoître comment l'Ortie l'exécute.

TOUT ſon corps eſt garni extérieurement de divers ordres de muſcles. Ceux de la baſe vont, comme des rayons, du centre à la circonférence ; d'autres deſcendent du ſommet vers la baſe. Ces muſcles ſont en même temps des canaux pleins d'une liqueur qu'on en fait ſortir en les piquant.

Ils ſe rempliſſent & ſe vuident au gré de l'Ortie. C'eſt par le jeu de ces muſcles ou canaux que s'exécute ce mouvement progreſſif que nous cherchons à connoître. Suivons l'Ortie lorſqu'elle veut aller en avant. Sa baſe eſt circulaire. Elle enfle les muſcles qui regardent le côté où elle tend. Elle y envoie ſa liqueur, qui en les enflant, les alonge. Ils ne peuvent s'alonger que le bord correſpondant de la baſe ne change de place & ne ſe porte un peu en avant. En même temps, elle relâche les muſcles oppoſés, elle en vuide les canaux. Ils ſe raccourciſſent : ils ne peuvent ſe raccourcir que le bord de la baſe qui leur correſpond, ne rentre un peu en dedans, & préciſément d'autant que le bord oppoſé s'eſt porté en dehors. Telle eſt la Méchanique qui exécute le premier pas de notre Ortie. Pour en faire un ſecond, elle fait prendre de nouveau à la baſe la forme circulaire, en gonflant également tous les canaux, puis elle répete les mêmes manœuvres que nous venons d'entrevoir.

Tout le mouvement progreſſif des Orties ne ſe réduit pas à celui-ci. Elles ont une autre maniere de marcher, qui ſe rapproche plus de celle des Inſectes. Elles ſavent ſe ſervir de leurs cornes en guiſe de jambes. Mais ces cornes ſont au ſommet de leur corps ; l'Ortie eſt appliquée

par ſa baſe contre le rocher : comment les cornes feront-elles la fonction de jambes ? L'Ortie que vous ſuivez va vous l'apprendre. Elle ſe renverſe ſens deſſus deſſous ; la baſe abandonne le rocher, & le cône eſt placé ſur ſon ſommet. Toutes les cornes ſortent, & vous les voyez s'accrocher au rocher. Elles ſont gluantes & rudes au toucher : elles ont donc beaucoup de facilité à ſe cramponner.

SOUPÇONNERIEZ-VOUS qu'un Animal qui eſt tout charnu & qui n'a aucun inſtrument pour ouvrir ou pour percer les coquilles, ſe nourrit de Coquillages ? D'aſſez petites Orties avalent de fort gros Coquillages, & l'on a peine à comprendre comment ils ont pu ſe loger dans l'intérieur de l'Ortie. Il eſt vrai que celle-ci étant purement charnue, elle eſt ſuſceptible d'une grande diſtenſion. Elle eſt une ſorte de bourſe fort ſouple qui s'agrandit au beſoin. L'ouverture de la bourſe eſt proprement la bouche de l'Ortie. Comme ſon intérieur n'eſt pas tranſparent, on ne peut voir ce qui s'y paſſe & comment l'Ortie vient à bout de vuider le Coquillage. Au moment qu'elle l'a avalé, elle ſe referme. Voyez cette jeune Ortie exactement fermée : elle vient d'avaler un aſſez gros Limaçon : elle eſt occupée à le vuider & à le digérer. La voilà qui ſe rouvre,

& qui rejette la coquille vuide. A côté eſt une autre Ortie qui fixe votre attention : elle a englouti une grande Moule, & elle fait d'inutiles efforts pour en rejetter la coquille. Elle ne peut y réuſſir : la coquille ſe préſente mal à l'ouverture, & vous commencez à être inquiet pour la malheureuſe Ortie. Elle a une reſſource que vous ne devinez pas. Regardez vers ſa baſe : la coquille s'y fait jour par une large plaie ; l'Ortie s'en délivre, & cette large plaie ne ſera pas plus pour elle que n'eſt pour nous une égratignure.

Toutes les Orties ne ſe délivrent pas par un moyen auſſi violent : elles en ont un autre qui leur réuſſit pour l'ordinaire. Elles ſe renverſent comme un gant ou un bas, de maniere que les bords de l'ouverture, qui ſont des eſpeces de levres, ſe replient ſur la baſe. La bouche eſt alors d'une grandeur démeſurée, & le fond de la bourſe preſque à découvert. On y apperçoit une ſorte de ſuçoir, qui eſt probablement l'inſtrument avec lequel l'Ortie vuide les coquilles. Elle rejette donc par la bouche le réſidu des Corps dont elle ſe nourrit.

Ce n'eſt pas ſeulement pour ſe délivrer des Corps étrangers, que les Orties ſe renverſent ainſi ; elles ſe mettent dans la même poſture

pour accoucher. Elles ſont vivipares. Les Petits naiſſent tout formés ; & l'on voit paroître des Orties en miniature. L'ouverture qui leur livre paſſage eſt ſi grande, qu'elle en pourroit laiſſer paſſer à la fois une multitude. Il ne ſort pourtant jamais qu'un ſeul Petit à la fois. Tous ſont d'abord renfermés dans certains replis cachés au fond de la bourſe.

Ces Orties, que vous ne vous laſſez point d'obſerver, ne réveillent-elles point dans votre Eſprit l'idée de ces fameux Polypes à bras (3) qui nous ont offert tant de merveilles ? Ils ſont auſſi tout membraneux, très-voraces, & pourvus de cornes qui leur tiennent lieu de bras & de jambes. Ils rejettent de même par la bouche le réſidu des alimens. Les levres de cette bouche peuvent auſſi ſe renverſer ſur le corps. Voilà bien des traits d'analogie. Les Orties reſſembleroient-elles encore aux Polypes par la ſinguliere propriété de pouvoir être multipliées de bouture & greffées ? C'eſt ce que les expériences les plus modernes ont mis hors de doute. D'une ſeule Ortie partagée ſuivant ſa longueur ou ſuivant ſa largeur, on fait deux ou trois Orties, à qui, au bout de quelques ſemaines, il ne manque

(3) Part. VIII, Chap. [XV.]

rien. On peut auſſi les greffer ; mais il faut avoir recours à la ſuture. Vous n'êtes plus ſurpris à préſent de la conſolidation de cette énorme plaie faite à la baſe d'une Ortie par une grande coquille qui s'y faiſoit jour. Ce n'eſt rien du tout qu'une ſemblable plaie pour un Animal qui peut être mis en pieces ſans ceſſer de vivre & de multiplier dans chaque piece. Les Orties ſeront donc des Eſpeces de Polypes à bras d'une grandeur monſtrueuſe, ou ſi vous l'aimez mieux, les Polypes à bras ſeront des Eſpeces de très-petites Orties.

QUITTONS ces rochers peuplés d'Orties, & portons nos pas vers cette petite anſe où la Mer eſt fort tranquille. Penchez-vous, & regardez la ſurface de l'eau. Qu'appercevez-vous ? une eſpece de gelée verdâtre qui ſurnage. Sa forme imite celle d'un Champignon en paraſol. Elle a près de deux pieds de diametre. Prenez-en un morceau entre vos doigts ; maniez-le quelques momens : vous le voyez ſe réſoudre en eau. La chaleur de votre main a ſuffi pour le fondre. Vous vient-il dans l'Eſprit que cette Gelée eſt un véritable Animal, & même une eſpece d'Ortie ? Elle a été nommée *Ortie errante* (4), parce

(4) †† Elle ſeroit mieux nommée *Gelée de Mer*, comme l'a remarqué Mr. de REAUMUR, dont j'eſquiſſois ici les découvertes. Toutes ces ſortes de Molluſques ou de Zoophytes qu'on

qu'elle ne ſe fixe point & qu'elle flotte de côté & d'autre. Sa ſurface convexe ne préſente qu'une infinité de petits grains ou mamelons. Mais ſa ſurface inférieure, qui eſt concave, eſt très-organiſée. On y voit un grand nombre de canaux, diſpoſés réguliérement & façonnés avec beaucoup d'art, les uns circulaires, les autres diſtribués comme les rayons d'une roue, & qui ſont pleins d'une liqueur aqueuſe qui paſſe des uns aux autres.

Cet étrange Animal erre dans la Mer. Il eſt ſpécifiquement plus peſant que l'eau. Il ne peut s'y ſoutenir qu'à l'aide d'un mouvement volontaire, qui mérite d'être obſervé & qu'on ne peut bien voir que dans les endroits où l'eau eſt calme. Elle l'eſt dans cette petite anſe ſur le bord de laquelle nous ſommes aſſis. Fixez vos regards ſur la ſurface de la Gelée qui s'offre à nous. Remarquez qu'elle ſe donne des mouvemens que vous êtes tenté de comparer à des mouvemens de ſyſtole & de dyaſtole. Ils n'en ſont pas néanmoins : ils n'ont pour fin que de faire

rencontre par-tout dans les Mers, ſont d'autant plus difficiles à caractériſer, que leurs formes ſont plus étranges, je dirois preſque plus bizarres, & que leur ſtructure eſt en apparence plus ſimple. La Nature ſemble travailler dans les Mers ſur des modeles abſolument nouveaux. (Note 1.)

ſurnager l'Ortie. Vous voyez que dans l'eſpece de ſyſtole, la ſurface de l'Animal devient très-convexe ; & que dans la dyaſtole, elle s'applatit & s'élargit ſubitement. Telle eſt la maniere de nager de notre Ortie gélatineuſe. Séchée au Soleil, elle ſe réduit preſque à rien. On s'imagine voir un petit morceau de parchemin ou de colle fort tranſparent. Il n'y a pas lieu de douter que cette Eſpece d'Ortie ne multiplie, comme les autres, de bouture ; mais je ne ſache pas que l'expérience en ait été faite. Une Gelée doit avoir bien plus de facilité à ſe régénérer, que des Corps organiſés de même genre, d'un tiſſu plus ſerré & plus ferme (5).

(5) †† Il y a lieu de conjecturer que l'Ortie errante ou la Gelée de Mer pourroit être conſervée au ſec comme le Noſtoch, la Trémelle, le Rotifere & bien d'autres Corps organiſés dont j'ai parlé dans mes Notes additionnelles. J'invite les Naturaliſtes à en faire l'épreuve. Il faudroit la tenter encore ſur d'autres Productions marines de la même claſſe. Le nombre des Animaux qui peuvent, en quelque ſorte, reſſuſciter après avoir été deſſéchés, eſt probablement bien plus grand qu'on ne penſe.

CHAPITRE XXII.

Les Étoiles.

Il n'eſt point de formes régulieres ou bizarres, dont le Regne animal ne nous préſente des modeles. Le ſpectacle le plus intéreſſant aux yeux du Naturaliſte eſt, ſans doute, celui de ces formes ſi prodigieuſement variées & ſi propres à lui faire concevoir les plus hautes idées de la fécondité inépuiſable de la Nature.

Voici un Animal dont la figure eſt préciſément celle ſous laquelle l'on nous peint les Etoiles du Firmament. Le moyen de ne pas lui donner le nom d'*Etoile!* Il eſt preſque plat. Du milieu de ſon corps partent quatre ou cinq rayons, à-peu-près égaux & ſemblables (1). Sa

(1) †† Ce ſont les Étoiles les plus communes qui n'ont que quatre à cinq rayons. On en voit d'autres, moins communes, qui en ont juſqu'à douze à treize. On en compte une quarantaine dans une Eſpece d'Étoile qu'on rencontre dans la Mer des Indes. Une pareille Étoile méritoit bien le nom de *Soleil de Mer*, que les Nomenclateurs lui ont impoſé.

On obſerve bien des variétés dans les différentes Eſpeces d'Étoiles. Les unes ſont liſſes, les autres ſont épineuſes ou garnies de petites épines qui ne permettent pas de les manier

ſurface ſupérieure eſt couverte d'une peau dure, calleuſe & fort chagrinée. Au centre de la ſurface inférieure eſt placée la bouche, garnie d'un ſuçoir, dont l'Etoile ſe ſert pour tirer la ſubſtance des Coquillages dont elle ſe nourrit. Cinq petites dents ou pinces les retiennent aſſujettis pendant qu'elle les ſuce, & lui aident peut-être à ouvrir la coquille.

Les jambes de l'Etoile ſont une vraie curioſité. Elles ſont attachées à ſa ſurface inférieure, & diſtribuées avec ſymmétrie ſur quatre rangs, chacun de ſoixante & ſeize jambes; enſorte que chaque rayon eſt pourvu de trois cents quatre jambes, & l'Etoile entiere de quinze cents vingt. Cependant, qui le croiroit? Malgré tout ce prodigieux attirail de jambes, l'Etoile ne va guere plus vîte que la Moule avec ſa jambe unique. Après cela, hâtons-nous de décider du haut de notre tête ſur les fins particulieres. Je renvoie ici mon Lecteur à la réflexion que je faiſois à l'entrée du Chapitre XIV de la Partie VIII.

Ces jambes, qui ont été ſi exceſſivement multipliées dans les Etoiles, reſſemblent parfaitement

impunément. Les unes ont leurs rayons plus ou moins renflés, les autres les ont plus ou moins applatis. Tantôt les rayons ſont ſimples, tantôt ils ſont compoſés ou ramifiés, &c.

aux cornes du Limaçon, ſoit par leur figure, ſoit par leur conſiſtance ou par leur jeu. Quand l'Etoile veut marcher, elle déploie ſes jambes, comme le Limaçon ſes cornes, & ſaiſit avec leur extrémité les divers Corps marins ſur leſquels elle rampe. Ordinairement elle ne fait ſortir qu'une partie des jambes; le reſte demeure en réſerve pour les beſoins qui ſurviennent. La méchanique qui préſide à leurs mouvemens eſt une belle preuve d'une INTELLIGENCE CRÉATRICE. Ouvrons un rayon en le partageant ſuivant ſa longueur, & nous mettrons à découvert les principaux reſſorts de la Machine.

UNE cloiſon preſque cartilagineuſe, faite en forme de vertebres, diviſe tout le rayon. De part & d'autre de cette cloiſon, vous appercevez deux rangs de petites boules, ſemblables à des perles de la plus belle eau. Que le plaiſir que vous goûtez à les contempler ne vous faſſe pas perdre le fait le plus intéreſſant: remarquez, je vous prie, que le nombre de ces petites boules eſt préciſément égal à celui des jambes. Comptez les unes & les autres: vous voyez que chaque boule répond ainſi à une jambe. Vous croyez démêler dans ces boules une liqueur limpide; vous ne vous trompez point. Paſſez le doigt deſſus; elles ſe vuident, la liqueur paſſe dans les

jambes correſpondantes, & elles s'alongent auſſitôt. L'Etoile n'a donc qu'à preſſer les boules pour déployer ſes jambes. Mais elles ſont capables de contraction, & lorſqu'elles ſe contractent, elles refoulent la liqueur dans les boules, d'où elle ſera de nouveau chaſſée dans les jambes, pour procurer le mouvement progreſſif.

Vous avez du penchant à conjecturer que ces jambes aſſez ſemblables aux tuyaux avec leſquels divers Coquillages reſpirent, ſervent auſſi aux mêmes uſages. Mais la Nature qui a prodigué les jambes aux Etoiles, leur a encore prodigué les organes de la reſpiration. Elle les a même beaucoup plus multipliés que les jambes. Ce ſont de très-petits tuyaux coniques, diſpoſés par grouppes, & qui produiſent autant de petits jets-d'eau.

Parmi nos Etoiles, vous en obſervez qui n'ont que deux ou trois rayons; & en y regardant de plus près, vous découvrez de très-petits rayons qui ſemblent commencer à pouſſer. Seroit-ce donc, me demandez-vous, que les Etoiles multiplient auſſi de bouture? Des Animaux formés de la répétition d'un ſi grand nombre de parties tant extérieures qu'intérieures, ſe régénéreroient-ils comme les Polypes, dont la ſtructure nous paroît

ſi ſimple ? Rien n'eſt plus vrai, & les Etoiles que vous avez ſous les yeux vous en fourniſſent la preuve. Il arrive aſſez ſouvent à ces Animaux de perdre deux ou trois de leurs rayons ; & cette perte n'eſt pas plus pour eux que pour les Polypes celle de quelques bras. On a beau déchiqueter les Etoiles, on a beau les mettre en pieces, on ne parvient point à les faire périr. Elles renaiſſent toujours de leurs débris ; & chaque morceau devient une Etoile complete.

CETTE admirable reſſource étoit ſur-tout néceſſaire à une Eſpece d'Etoile, dont les rayons ſont fort caſſans, & lui tiennent lieu de jambes. En prodiguant les jambes avec tant de complaiſance aux autres Etoiles, la Nature ſembleroit avoir oublié celle-ci, & l'avoir, en quelque ſorte, diſgraciée, ſi elle ne lui avoit donné des rayons auſſi flexibles que la queue du Lézard, & dont elle ſe ſert avec aſſez d'adreſſe pour ramper ſur le fond de la Mer (2).

(2) †† Cette Eſpece d'Étoile dont les rayons ſont auſſi flexibles que la queue du Lézard, a été auſſi nommée *Étoile à queue de Lézard*. Ses rayons ſont arrondis & articulés comme la queue du petit Quadrupede qu'ils ſemblent imiter. Ils ſont fort caſſans, & l'Étoile eſt fort ſujette à les perdre en tout ou en partie : mais cette perte eſt bientôt réparée par de nouveaux rayons qui repouſſent à la place des premiers. Le corps de l'Étoile a une figure qui approche de la lenticulaire ; mais quelquefois il eſt taillé en pentagone.

J'ai

J'ai dit, (Note 1) qu'il eſt des Étoiles dont les rayons ſont ramifiés ou branchus. Elles en ont pris le nom d'*Étoiles arborescentes*. Dans de telles Étoiles, les ſoudiviſions des rayons vont quelquefois ſi loin, qu'on y compte juſqu'à quatre-vingt à quatre-vingt-dix mille rayons principaux ou ſubordonnés. L'Étoile ſe ſert de ces nombreux rayons comme de bras ou de mains pour ſaiſir ſa proie & la porter à ſa bouche.

Je ferai remarquer à cette occaſion, que les Nomenclateurs qui ſe ſont preſſés de caractériſer les Étoiles de Mer par le nombre de leurs rayons, ont probablement commis bien des mépriſes; car les Étoiles qui ſont fort ſujettes à perdre deux ou pluſieurs de leurs rayons, & qui jouiſſent du privilege de les refaire, peuvent en montrer plus ou moins dans certaines circonſtances, ſans ceſſer d'appartenir à la même Eſpece. Il en eſt de leurs rayons comme des bras du Polype d'eau douce; & ſi l'on vouloit caractériſer les Polypes de ce genre par le nombre de leurs bras, on feroit bien plus d'Eſpeces de ces Zoophytes qu'il n'y en a réellement. Ainſi l'Étoile que les Nomenclateurs ont déſignée par le nom de *Comete*, parce qu'elle n'a qu'un ſeul rayon fort long, accompagné de pluſieurs rayons fort courts, pourroit bien n'être qu'une Étoile qui avoit perdu tous ſes rayons à l'exception d'un ſeul, & qui réparoît actuellement la perte des autres. Il faudroit donc avoir ſuivi les différentes Eſpeces d'Étoiles pendant tout le cours de leur vie, pour être en droit d'aſſurer, qu'une certaine Étoile n'a conſtamment qu'un ſeul rayon fort long, accompagné de pluſieurs autres fort courts, ou qu'une autre Étoile n'a pour l'ordinaire que quatre à cinq rayons, une autre dix à douze, &c. Je le répéterai encore; l'immenſe Claſſe des *Zoophytes* ſera toujours celle dont on aura le plus de peine à caractériſer les Genres & les Eſpeces. Les Individus qui lui appartiennent ſemblent faits pour torturer l'Eſprit des Nomenclateurs.

CHAPITRE XXIII.

Les Hériſſons.

VOICI des Animaux travaillés avec bien plus d'appareil encore ; j'ai preſque dit, où éclate un bien plus grand luxe. Les *Hériſſons* de Mer (1), comme ceux de Terre, doivent leur nom à leurs piquans. Mais les piquans des Hériſſons de Mer ſont tout autre choſe que ceux des Hériſſons de Terre. Les piquans des premiers ſont leurs jambes. Faiſons-nous une idée de l'extérieur de ces Animaux, où la Nature a pris plaiſir à accumuler avec tant de profuſion les organes relatifs au mouvement progreſſif.

LA forme de ces Hériſſons eſt celle d'un bouton arrondi (2). Il eſt creux intérieurement, & ſa ſurface eſt très-ouvragée. L'on pourroit en

(1) †† On les nomme auſſi *Ourſins*. Il en eſt de différentes Eſpeces, qu'on diſtingue ſur-tout par le nombre & la diſtribution des petites pieces dont leur extérieur eſt garni, & qui le parent beaucoup.

(2) †† La forme des Hériſſons de Mer varie beaucoup. Il en eſt d'arrondis ou de façonnés, comme des boutons ou des turbans, & d'applatis comme des gâteaux, &c. Cette diverſité de forme a fait naître différentes dénominations plus ou moins

comparer le travail à celui de certains boutons de cuivre ou de trait. Une multitude de tubercules, ſemblables à des mamelles, diſtribuées dans un ordre régulier, y repréſentent par leur arrangement de petits triangles, qui diviſent toute la ſurface du bouton en différentes aires. Ces triangles ſont ſéparés par des bandes eſpacées régulièrement, & percées de trous diſtribués avec beaucoup de ſymmétrie ſur pluſieurs lignes. Ces trous traverſent de part en part toute l'épaiſſeur du ſquelette; car le corps de nos Hériſſons eſt une ſorte de boîte oſſeuſe. Chaque trou eſt une gaîne où eſt logée une corne charnue, pareille à celle du Limaçon, & ſuſceptible des mêmes mouvemens. Il y a donc autant de cornes que de trous, & l'on compte au moins treize cents trous. Comme le Limaçon, le Hériſſon ſe ſert de ſes cornes pour tâter le terrein & les divers corps qu'il rencontre ſur ſa route. Mais il s'en ſert ſur-tout pour s'y cramponner & ſe mettre à l'ancre.

Les tubercules ſont les baſes d'autant d'épines ou de jambes, & leur nombre eſt au moins de

arbitraires : on dit les *Hériſſons en turban*, *les Hériſſons en gâteau*, *&c.*

L'intérieur des Hériſſons eſt gélatineux. On les mange comme les Écreviſſes, & ils en ont le goût.

deux mille cent. Ainſi il n'eſt preſque aucun point du corps du Hériſſon où il ne ſe trouve une jambe. Il peut donc marcher ſur le dos comme ſur le ventre ; & en général, quelle que ſoit ſa poſture, il y a toujours un bon nombre de jambes prêtes à le porter & de cornes prêtes à le fixer. Les jambes dont il ſe ſert le plus volontiers ſont celles qui environnent la bouche ; mais, quand il lui plaît, il marche en tournant ſur lui-même comme une roue.

Sa bouche, munie de cinq dents, eſt au milieu du ventre. Sur le dos, ou au ſommet du bouton, eſt une autre ouverture qu'on croit être l'anus.

Voila donc un Animal pourvu au moins de treize cents cornes & de deux mille cent jambes. Combien faut-il de muſcles pour mouvoir tant de cornes & tant de jambes ! Combien y a-t-il de fibres & de fibrilles dans chacun de ces muſcles ! Quelle étonnante multiplication de pieces dans ce petit Animal ! Quelle régularité, quelle ſymmétrie, & même quel agrément dans leur diſtribution ! Quelle variété dans leur jeu (3) !

(3) †† Il exiſte des Hériſſons de Mer bien plus compoſés encore que ceux dont je crayonnois ici la ſtructure d'après Mr. de Reaumur. Un Académicien de Rouen a décrit en dernier

LORSQUE le Hériſſon veut faire chemin, il ſe tire avec les jambes qui regardent l'endroit où il tend, & ſe pouſſe vers le même endroit avec les jambes oppoſées : toutes les autres demeurent alors dans l'inaction. En même temps qu'une partie des jambes travaille, les cornes qui les avoiſinent ſe déploient pour ſonder la route ou ancrer l'Animal.

lieu un Hériſſon de Mer, de quatre pouces de longueur ſur deux de largeur & trois de hauteur, qui étoit formé de neuf cents cinquante pieces, ſur leſquelles étoient diſtribués quatre mille cinq cents mamelons, de chacun deſquels partoit un piquant mobile ; & le nombre des petits trous dont il étoit comme criblé, alloit à trois mille huit cents quarante, dont ſortoient autant de cornes charnues. Il n'y a pas lieu de douter que les jambes & les cornes ſi prodigieuſement multipliées de ces Hériſſons, ne ſe reproduiſent de bouture comme les bras du Polype, & il en eſt apparemment de même de celles des Étoiles. Quelle immenſe quantité de Germes réparateurs n'a donc pas été diſtribuée dans ces Animaux de genres ſi ſinguliers !

CHAPITRE XXIV.

Le Bernard-l'hermite (1).

LES Coquillages naiſſent vêtus. La coquille qu'ils apportent en naiſſant croît avec eux & par eux. L'Animal qui s'offre à nos regards, & qu'on prendroit pour une ſorte d'Ecreviſſe, vient au jour dépourvu de coquille, & pourtant il lui en falloit une pour couvrir la plus grande partie de ſon corps, dont la peau mince & délicate ſouffriroit trop d'être à nud. La Nature l'auroit-elle donc traité en Marâtre en lui refuſant un tégument ſi néceſſaire? Point du tout: bienfaiſante envers tous les Animaux, elle n'a point oublié celui-ci. Elle ne l'a pas revêtu d'une coquille, il eſt vrai; mais elle a fait l'équivalent, en lui enſeignant à s'en revêtir. Inſtruit par un ſi grand Maître, notre Hermite ſait ſe loger dans la premiere coquille vuide qu'il rencontre. Il s'adreſſe aſſez indifféremment à toutes celles qui ſont tournées en ſpirale. Souvent il s'y retire

(1) †† On le nomme auſſi *le Soldat*, parce qu'il ſemble logé dans ſa coquille d'emprunt comme un Soldat dans ſa guérite. Le nom de *Bernard-l'hermite*, ſous lequel ce Cruſtacé eſt plus connu, lui a été impoſé pour exprimer la ſolitude profonde dans laquelle il vit.

ſi avant qu'on ne l'apperçoit point, & que la coquille paroît vuide. Veut-il changer de place? il fait ſortir ſes groſſes pattes ou pinces, ſemblables à celles de l'Ecreviſſe, & ſaiſiſſant avec ces eſpeces de tenailles les corps qui l'avoiſinent, il tire à lui la coquille, en même temps qu'il s'entortille fortement autour des parois ou de la rampe, pour ne point ſe trouver à nud. Si la coquille devient trop étroite, il l'abandonne, & va ſe loger dans une autre mieux proportionnée à ſa taille. On dit qu'il y a quelquefois des combats entre nos Hermites pour une coquille, & qu'elle demeure à celui qui a la plus forte pince. Nos combats n'ont preſque jamais un objet auſſi important (2).

(2) †† Ce n'eſt pas ſeulement dans des coquilles, que notre Hermite ſait ſe loger: il ſe niche auſſi dans différens corps caverneux, qui ont aſſez de capacité pour qu'il puiſſe y être à l'aiſe, & aſſez de légéreté pour qu'il puiſſe les traîner facilement. On l'a rencontré dans des os & dans des enveloppes de fruits deſſéchés. Il eſſaie, en quelque ſorte, ces différentes loges comme nous eſſayons un vêtement. C'eſt même un ſpectacle très-amuſant que celui que préſente ce petit Cruſtacé, tandis qu'il eſt occupé à chercher ſur le bord de la Mer un nouveau domicile & à en faire l'eſſai. Sa partie antérieure eſt très-bien défendue par des tégumens ſemblables à ceux de l'Écreviſſe; mais ſon ventre n'eſt recouvert que d'une peau molle & délicate, & il lui convenoit de défendre cette partie par le ſecours d'un tégument étranger. Il y a pourtant dans l'hiſtoire de notre petit DIOGENE une incertitude que je ne dois pas diſſimuler. SWAMMERDAM, qui s'en étoit fort occupé, ne croyoit point qu'il en

CHAPITRE XXV.

Les Coquillages qui filent. Les Moules & les Pinnes marines.

LE titre de ce Chapitre vous surprend sans doute. Vous ne vous attendiez pas à ce nouveau trait de l'industrie des Coquillages qui pro-

fût jamais logé que dans une coquille d'emprunt. Il prétendoit, au contraire, s'être bien assuré qu'il a sa propre coquille, à laquelle il adhere par des productions tendineuses, comme la Moule adhere à la sienne. Il avoit même décrit ces attaches & reconnu le périoste de la coquille. „ J'en ai conclu, disoit-il, „ que la coquille de cet Animal est son enveloppe propre & „ comme sa peau pierreuse, ainsi que cela a lieu dans tous les „ Coquillages. Je suis donc très-surpris, ajoutoit-il, de ce que „ RONDELET avance, *que le Bernard-l'hermite se loge toujours „ dans les coquilles d'autrui, & qu'il n'en a point de propres;* „ car de même que dans l'Escargot, non-seulement les muscles „ sont attachés à la coquille, mais que les tendons des muscles „ y sont incorporés & comme identifiés; ainsi dans le Bernard-„ l'hermite les tendons des muscles s'attachent fortement & „ s'incorporent au noyau de la coquille, vers son second tour „ de spirale; mais comme cette insertion n'occupe pas un grand „ espace, le corps de l'Animal mort se détache aisément de la „ coquille, & c'est peut-être ce qui a trompé RONDELET, „ qui, entraîné par l'autorité d'ARISTOTE, a négligé de con-„ sulter l'observation ".

Après des assertions si expresses, comment douter qu'un aussi habile Anatomiste que SWAMMERDAM s'en fût laissé imposer sur un fait anatomique si aisé à constater? Cependant il n'en

mettoient ſi peu. Vous aviez déja été fort étonné de l'adreſſe qui brille dans le mouvement progreſſif de pluſieurs : votre étonnement redouble en apprenant qu'il en eſt qui ſavent filer, & vous êtes impatient de les voir à l'ouvrage & de juger de leur travail. Promenons-nous ſur le bord de la Mer. Vous découvrez quantité de Moules, les unes iſolées, les autres entaſſées par

eſt pas moins certain qu'on a trouvé de nos Hermites dans des coquilles d'Eſpeces très-différentes & dans des corps caverneux très-différens des coquilles. Il eſt très-certain encore, qu'on a retiré facilement ces Cruſtacés des coquilles où ils étoient logés; ce qui n'auroit pu ſe faire avec autant de facilité, s'ils euſſent adhéré à la coquille par des tendons un peu forts. J'ajoute, qu'on ne connoit aucun Coquillage dont la conſiſtance & la ſtructure ſe rapprochent le moins du monde de celles du Bernard-l'hermite : tous ſont mols ou gélatineux; & le Bernard-l'hermite, qui appartient à la Famille des Crabes, n'a rien de gélatineux ni rien qui paroiſſe analogue à la coquille qu'il traîne après lui. Seroit-ce donc qu'il arrive aſſez ſouvent à notre Hermite de ſe détacher par accident de ſa propre coquille ? ou ſeroit-ce *que le point ſaillant*, dont parle SWAMMERDAM, *qui ſe trouve aſſez près du thorax, & qui ſemble être un centre où tous les tendons du thorax & de l'abdomen ſe réuniſſent & s'attachent à la coquille ;* ſeroit-ce, dis-je, que ce point ſaillant auroit été organiſé de maniere à aider l'Animal à ſe cramponner à la coquille étrangere dont il a fait choix? SWAMMERDAM auroit-il été trompé par l'adhérence plus ou moins forte ou plus ou moins immédiate de ce petit organe à l'intérieur de la coquille? La queſtion ſeroit bientôt décidée ſi l'on obſervoit ces Cruſtacés au ſortir de l'œuf : on verroit s'ils naiſſent vêtus comme tous les Coquillages. L'Anatomiſte Hollandois ne les avoit pas obſervés à leur naiſſance.

paquets. Conſidérez-les un peu plus attentivement : vous obſerverez que toutes ſont attachées aux pierres, ou les unes aux autres, par un grand nombre de petits cordages déliés. Choiſiſſons une de ces Moules pour l'obſerver de plus près : nous en démêlerons mieux toutes leurs manœuvres. En voici une qui travaille à s'attacher à cette pierre qui eſt preſque à fleur de l'eau. Sa coquille eſt entr'ouverte : elle en fait ſortir une ſorte de langue, fort ſouple, qu'elle alonge & qu'elle raccourcit alternativement. Remarquez qu'elle en applique ſouvent le bout contre la pierre, & qu'elle la retire auſſi-tôt dans ſa coquille pour l'en faire reſſortir un moment après. De la racine de cette eſpece de langue partent des fils dont la groſſeur égale celle d'un cheveu ou d'une ſoie de Porc. Ces fils vont en s'écartant les uns des autres, & leur extrémité eſt collée à la pierre. Regardez-les de fort près ; vous appercevrez qu'ils ſe terminent tous par un petit empatement qui les attache plus fortement à la ſurface de la pierre. Ce ſont autant de petits cables qui tiennent notre Moule à l'ancre. Il y a ſouvent plus de cent cinquante de ces petits cables employés à amarrer une Moule. Chaque cable n'a guere que deux pouces de longueur.

C'EST la Moule elle-même qui a filé tous ces cordages. En contemplant le mouvement progreſſif de la Moule de riviere & de quelques autres Coquillages (1), vous avez fort admiré l'adreſſe avec laquelle ils ſe ſervent de leur eſpece de langue. Vous avez vu que cette partie unique leur tient lieu à la fois de bras & de jambes. La langue de nos Moules de Mer s'acquitte auſſi des mêmes fonctions; mais chez celles-ci, ce petit inſtrument eſt bien plus admirable encore. Non-ſeulement il leur ſert comme aux autres Coquillages, de bras pour ſe cramponner & de jambes pour ramper, il eſt encore la filiere qui fournit ces fils nombreux au moyen deſquels la Moule réſiſte à l'impulſion du flot.

DE l'origine de la langue juſqu'à ſon extrémité s'étend une rainure qui la diviſe ſuivant ſa longueur en deux parties égales. Cette rainure eſt un véritable canal, garni d'un grand nombre de petits muſcles qui l'ouvrent & le ferment. Dans ce canal paſſe une liqueur viſqueuſe qui eſt la matiere des fils que tend la Moule. A ſa naiſſance, ce canal eſt exactement cylindrique, & c'eſt là proprement que les fils ſont moulés.

LES divers mouvemens que ſe donnoit il n'y

(1) Chap. XVII & XVIII de cette Partie.

a qu'un moment la langue de la Moule que nous obſervons, avoient tous pour fin de l'attacher à la pierre. Ces fils plus blancs & plus tranſparens que les autres, ſont ceux qu'elle a tirés récemment de ſa filiere. Elle n'a pas achevé de s'ancrer, & voilà ſa langue qui s'alonge de nouveau d'environ deux pouces, & dont le bout s'applique contre la pierre. La liqueur viſqueuſe coule dans le canal & arrive à ſon extrémité. Cette liqueur eſt déja moulée, elle eſt déja un fil cylindrique. La Moule colle le bout de ce fil à la pierre; mais elle veut qu'il s'y applique par une ſurface un peu large pour y être plus adhérent. Elle lui procure donc avec le bout de ſa langue ce petit empatement que vous avez obſervé & qui eſt très-ſenſible.

Il s'agit à préſent de tendre un autre cable à quelque diſtance de celui-ci. La langue doit donc abandonner ce dernier pour aller travailler ailleurs. Comment l'abandonnera-t-elle? Le canal s'ouvre dans toute ſa longueur & laiſſe ſortir le fil. La langue dégagée de ce fil, ſe retire promptement ſur elle-même, rentre dans la coquille, & en reſſort un inſtant après pour attacher un peu plus loin un nouveau cable.

Avez-vous pris garde à une petite adreſſe

de notre Moule? Elle venoit de tendre le premier fil : pour s'assurer s'il étoit bon, elle l'a mis sur-le-champ à l'épreuve ; elle l'a tiré fortement à elle comme pour le rompre. Il a résisté à cet effort, & satisfaite de l'épreuve, elle a été tendre le second fil, qu'elle a éprouvé comme le premier.

Ces cordages que les Moules de Mer filent avec tant d'art, sont réellement pour elles ce que les cables sont pour un vaisseau qui est à l'ancre. Vous me demandez, si elles savent aussi lever l'ancre? Diverses expériences paroissent prouver qu'elles n'ont pas cette industrie : sans doute qu'elle ne leur étoit pas nécessaire. Mais elles chassent quelquefois sur leurs ancres ; il leur importoit donc de pouvoir se transporter d'un lieu dans un autre, & d'avoir en réserve de nouveaux cables (2).

(2) †† Quelques Naturalistes très-modernes n'admettent point avec Mr. de Reaumur, que la langue des Moules de Mer leur serve quelquefois de bras ou de jambe pour se traîner d'un lieu à un autre, & ils veulent qu'elles soient absolument privées de la faculté loco-motive. Ils rapportent à ce sujet des observations qui leur ont paru prouver que la conservation des Moules exige indispensablement qu'elles soient toute leur vie enchaînées les unes aux autres, ou aux différens Corps qui tapissent le fond de la mer ; & que lorsque la Mer rompt ces chaînes & qu'elle disperse les Moules, elles périssent. Mais les Moules que les Pêcheurs jettent dans les marais salans pour

Ainsi la Mer a ſes Fileuſes comme la Terre. Les Moules ſont à la Mer, ce que les Chenilles ſont à la Terre. Il y a néanmoins une différence remarquable entre les unes & les autres. Le travail des Chenilles répond préciſément à celui des Tireurs d'or. Le fil de ſoie ſe moule en paſſant par le bec de la filiere, & la Chenille lui donne la longueur qu'elle veut, qui eſt dans certaines coques de pluſieurs centaines de pieds (3). Le travail des Moules doit être plutôt comparé à celui des Ouvriers qui jettent les métaux en fonte. La filiere de ces Coquillages eſt un véritable moule qui ne détermine pas ſeulement la

perfectionner leur chair, & qu'ils diſperſent ainſi à différentes diſtances, ſe trouvent au bout d'un certain temps raſſemblées par paquets, comme elles l'étoient auparavant. Elles ont donc eu un moyen de ſe raſſembler & de ſe groupper de la ſorte; & combien eſt-il naturel de penſer que c'eſt à l'aide de leur langue, comme à l'aide d'un bras ou d'une jambe qu'elles y parviennent! Il eſt au moins très-ſûr que les Moules d'eau douce ſe tranſportent ainſi d'un lieu dans un autre, & il y a bien des rapports entre ces Moules & les Moules de Mer. Celles-ci ne naiſſent certainement pas avec leurs chaînes, comme le prétendent encore les Naturaliſtes eſtimables dont il s'agit: ces chaînes ſont des fils que les Moules tirent de leur intérieur & qu'elles attachent elles-mêmes à la ſurface des corps auxquels elles veulent s'amarrer. Ce fait a été trop bien vu & trop bien détaillé par M. de Reaumur, pour qu'on puiſſe raiſonnablement le révoquer en doute.

(3) Chap. IV de cette Partie.

groſſeur du fil, mais qui détermine encore ſa longueur, toujours égale à celle de la filiere ou de la langue.

Les Pinnes marines, eſpeces de fort grandes Moules, ſont de plus habiles fileuſes encore. Leurs fils, longs au moins de ſept à huit pouces, ſont d'une grande fineſſe, & l'on en fait de beaux ouvrages (4). Si les Moules ſont les Chenilles de la Mer, les Pinnes en ſont les Araignées. Les fils des Pinnes ſervent, comme ceux des Moules, à les amarrer & à les défendre de l'agitation des flots. Ils ſont prodigieuſement nombreux, & forment par leur réunion une ſorte de houppe ou d'écheveau de ſoie, du poids d'environ trois onces. L'inſtrument qui les prépare & les moule reſſemble pour l'eſſentiel à celui des autres Coquillages de ce genre; il eſt ſeulement beaucoup plus grand, & la rainure qui le diviſe ſuivant ſa longueur, eſt plus étroite. A ſon origine eſt un ſac membraneux, compoſé de pluſieurs feuillets charnus, qui ſéparent les feuillets ſoyeux dont la houppe réſulte.

(4) †† Ces ouvrages, qui ſe fabriquent ſur-tout en Sicile, ſont ſi fins, qu'une paire de bas de cette ſoie peut être renfermée dans une petite boîte telle qu'une tabatiere de médiocre grandeur.

CHAPITRE XXVI.

Les Coquillages & autres Animaux de Mer, qui s'attachent par une ſorte de glu ou de ſuc pierreux.

S'IL n'a pas été donné à tous les Coquillages & Animaux de Mer de s'amarrer avec autant d'adreſſe que les Moules & les Pinnes, la Nature les en a dédommagés par des moyens qui ne ſont pas moins efficaces. Avant que de quitter ce rivage qui nous a offert tant d'objets intéreſſans, arrêtons-nous quelques momens à conſidérer ce petit Coquillage que vous voyez attaché à ce rocher. C'eſt un Oeil de bouc ou une Patelle.

SA coquille, qui eſt d'une ſeule piece, eſt faite en maniere de chapiteau conique, ſous lequel tout le corps eſt à couvert, comme ſous un toit. L'Animal peut élever ou abaiſſer ce toit à ſon gré. Quand il l'abaiſſe, il cache le corps en entier & repoſe immédiatement ſur la pierre. Un gros muſcle qui occupe toute la largeur de la coquille, & qui en eſt comme la baſe, attache l'Animal à cette pierre. Eſſayez de l'en détacher: vous

vous n'en pouvez venir à bout. Il ne tient pourtant à la pierre que par une baſe d'un pouce de diametre. Paſſons une corde autour de la coquille : ſuſpendons à cette corde un poids de vingt-huit à trente livres : le Coquillage ne lâche priſe qu'au bout de quelques ſecondes, & vous vous étonnez qu'un ſi petit Animal ſoit doué d'une auſſi grande force d'adhéſion.

Vous êtes curieux de connoître d'où lui vient une telle force : vous examinez la pierre : elle vous paroît très-polie, & votre étonnement redouble. Seroit-ce que le muſcle s'engrene dans les parties inſenſibles de la pierre ? Partagez l'Animal tranſverſalement : il adhere tout auſſi fortement qu'auparavant : ſeroit-ce qu'il tient à la pierre comme deux marbres polis tiennent l'un à l'autre ? Mais les marbres gliſſent facilement l'un ſur l'autre, & vous ne pouvez faire gliſſer le Coquillage. Voici donc la cauſe ſecrete de cette adhéſion qui vous étonne. Le muſcle eſt enduit d'une humeur viſqueuſe qui le colle à la ſurface de la pierre, & qui ſe fait ſentir aſſez fortement au doigt.

Mais l'Oeil de bouc n'a pas été condamné à demeurer collé toute ſa vie à la même place : il doit aller chercher ſa nourriture. En voilà un

qui rampe ſur le rocher : ſon gros muſcle lui ſert de jambe, & s'acquitte des mêmes fonctions que celui que vous connoiſſez au Limaçon. L'Oeil de bouc ſait donc ſe détacher quand il lui plaît. Il ſait briſer ces liens qu'un poids de vingt-huit livres rompt à peine. Humectez votre doigt, paſſez-le ſur le muſcle, la colle naturelle dont il eſt enduit n'y trouve plus de priſe. Cette colle eſt diſſoluble à l'eau. Toute la ſurface du muſcle eſt ſemée de petits grains pleins d'une liqueur diſſolvante. Lorſque l'Animal veut lever le piquet, il n'a qu'à preſſer ſes nombreuſes glandes ; le diſſolvant en ſort, & les liens ſont briſés.

L'OEIL de bouc n'a qu'une certaine proviſion de colle : ſi on le détache pluſieurs fois de ſuite, ſa proviſion s'épuiſera & il ne s'attachera plus.

CETTE maniere de s'amarrer eſt commune à divers Animaux de Mer. Elle l'eſt en particulier aux Orties (1). Leur peau n'eſt qu'un amas de glu qui ſe diſſout très-promptement dans l'eau-de-vie. C'eſt avec cette abondante proviſion de glu que ces Animaux ſinguliers ſe collent aux rochers.

C'EST encore par le même moyen que les Etoiles

(1) Chap. XXI de cette Partie.

ſe fixent (2). Une matiere viſqueuſe eſt portée à l'extrémité de ces eſpeces de cornes qui leur tiennent lieu de jambes, & dont elles ont bien des centaines. Quoique très-foibles, ces jambes deviennent de forts liens à l'aide de cette glu qui en exſude, & lorſqu'elles ſont une fois cramponnées, il eſt plus aiſé de les rompre que de les détacher.

Il en eſt préciſément de même des cornes des Hériſſons (3).

Toutes ces adhéſions ſont volontaires & dépendent uniquement du bon plaiſir de l'Animal. Il s'attache ou ſe détache, ſelon que les circonſtances l'exigent. Mais il eſt d'autres adhéſions qui ſont tout-à-fait involontaires. Les Vers de Mer, qu'on nomme à tuyau, ſont enfermés dans un tuyau rond, d'une ſubſtance ſemblable à celle des coquilles, & attachés aux pierres ou au ſable dur ou même à d'autres Coquillages. Ce tuyau ſuit les contours de la ſurface à laquelle il eſt collé. Le Ver n'abandonne jamais cette cellule, qu'il prolonge & élargit à meſure qu'il croît. Il vous rappelle les Fauſſes-teignes (4) : ce ſera, ſi vous

(2) Chap. XXII de cette Partie.

(3) Ibid. Chap. XXIII.

(4) Ibid. Chap. IX.

le voulez, une Fauſſe-teigne de la Mer. Il exſude de tout ſon corps un ſuc pierreux qui eſt la matiere du tuyau (5).

(5) †† Ce que je diſois ici, d'après Mr. de REAUMUR, ſur la maniere dont le Ver conſtruit ſon tuyau, tenoit à l'opinion de ce célebre Académicien touchant la formation de la coquille de l'Eſcargot de jardin. Il croyoit s'être aſſuré par de bonnes expériences, que cette coquille ſe forme d'un ſuc pierreux ou crétacé qui exſude de l'Animal: mais nous avons vu, (Part. III, Chap. XXI, Note 2) que ce n'eſt point ainſi que la coquille ſe forme & qu'elle ne croît point par appoſition. Elle eſt une partie intégrante de l'Animal, comme nos os ſont des parties intégrantes de notre corps. Le tiſſu parenchymateux, qui fait le fond de la coquille, s'incruſte peu-à-peu, comme l'os, d'une matiere crétacée, qui lui donne de la dureté, & qu'on peut en extraire à volonté. Les Coraux, les Corallines, les Madrepores & quantité d'autres Corps marins de la même claſſe ne ſont de même que des productions parenchymateuſes des Polypes dont leur extérieur eſt parſemé, & auxquelles la nutrition a incorporé une ſorte de craie qui leur donne la ſorte de conſiſtance qui leur eſt propre.

Il y a de grands rapports entre les Vers à tuyaux & les Polypes: il en eſt beaucoup auſſi entre la matiere du tuyau & celle des coraux ou des coquilles. C'eſt à Mr. GUETTARD que nous devons cette remarque importante. Il devient donc très-probable, que le tuyau de nos Vers marins a la même origine que les coquilles, les coraux & les autres corps de ce genre. Il eſt de ces Vers dont la tête eſt ornée de deux beaux panaches, comme l'eſt celle de certains Polypes d'eau douce. D'autres Vers à tuyau ont au lieu de panaches, de petits filets coniques, qui s'acquittent apparemment des mêmes fonctions. Le corps de tous ces Vers eſt encore entiérement mollaſſe, comme celui des Polypes. Les Vers à tuyau touchent donc de bien près aux Polypes, s'ils ne ſont eux-mêmes de vrais Polypes.

D'AUTRES Vers de cette Eſpece, dont le ſuc n'eſt pas pierreux, mais qui abondent en ſuc gluant, s'en ſervent à lier autour d'eux des grains de ſable, des fragmens de coquilles, &c. & cette cellule de pieces rapportées ne laiſſe pas d'être aſſez proprement travaillée.

LES Huîtres & divers Coquillages adherent par un ſuc pierreux aux corps ſur leſquels ils repoſent, & ſouvent ils ſont ainſi cimentés les uns aux autres (*6*). Telle eſt l'eſpece de ciment

Les tuyaux de ces ſortes de Vers, & par conſéquent les Vers eux-mêmes, peuvent ſe ranger ſous deux genres principaux. Les tuyaux du premier genre ſont ſimples: les uns ſont droits, les autres ſe contournent en différens ſens. Les uns ſont coniques, les autres cylindriques. Aſſez ſouvent on les trouve entrelacés avec d'autres tuyaux de même eſpece.

Les tuyaux du ſecond genre ſont très-fins, plus coniques que cylindriques, & compoſent des maſſes plus ou moins conſidérables, qui préſentent différentes ramifications; ce qui a porté Mr. GUETTARD à les nommer *ramifiés*.

On connoît une Eſpece de ces Vers qui ſe grouppent d'une façon admirable, & qui imitent au mieux l'aſſemblage des tuyaux d'une orgue. Ils en ont reçu le nom d'*Orgues de Mer*. Chaque tuyau de nos Orgues marines eſt lié à ſes voiſins par des lames minces & circulaires, qui les ceignent extérieurement & fortifient tout l'aſſemblage.

(6) †† Les Huîtres de différentes Eſpeces adherent les unes aux autres; mais les paquets ou amas d'Huîtres de même Eſpece ſont les plus communs. Elles adherent encore à beaucoup d'autres Coquillages, aux racines & aux branches des Arbres, & en

universel dont la Nature se sert toutes les fois qu'elle veut bâtir dans la Mer, ou y assurer un Coquillage contre le mouvement violent des eaux.

général à tous les corps naturels qui couvrent le fond de la Mer. Une humeur visqueuse que fournit l'intérieur du Coquillage opere son adhérence. Elle ne se fait pas constamment dans les mêmes endroits, tantôt les Huîtres s'unissent par le talon de la coquille, tantôt par divers points de la surface des battans, & tout cela avec des variétés innumérables. On retrouve les mêmes variétés dans les Huitres fossiles. On observe encore que la plupart des Coquillages fossiles affectent dans l'intérieur des Continens les mêmes positions que leurs Analogues vivans affectent dans la Mer : preuve frappante qu'ils ont été laissés dans les terres par une Mer qui se retiroit lentement.

Au reste, les variétés qu'on remarque dans la maniere dont les Huîtres adherent les unes aux autres, dépendent originairement de la position où elles se sont trouvées respectivement à leur naissance, & du mouvement des eaux; car l'Huître a été condamnée à passer toute sa vie dans une parfaite immobilité. Rien au monde de plus monotone ou de plus uniforme que la vie de ce Coquillage, dont tout le mouvement se borne à ouvrir & à fermer sa coquille.

On sait que c'est à la classe des Huîtres qu'appartient ce riche Coquillage, dont la coquille est incrustée de nacre & qui fournit les perles. Cette matiere, qui a tant d'éclat & qui est si recherchée, n'est au fond qu'une sorte de terre, dont le parenchyme de la coquille de l'Huître s'incruste peu-à-peu. Lorsqu'elle est trop abondante, elle s'extravase & produit les perles. Elles n'ont rien d'organique, puisqu'elles ne laissent aucun résidu parenchymateux quand on les traite par le procédé de Mr. HÉRISSANT. (Part. VII, Chap. VII, Note 4.)

CHAPITRE XXVII.

Procédés des Poiſſons.

Nous ſommes peu inſtruits de l'induſtrie des Poiſſons : ils ne ſont pas aſſez à notre portée. La plupart habitent des profondeurs inacceſſibles à nos recherches. Nous ne préſumerons pas que tout leur ſavoir faire ſe borne uniquement à ſe manger les uns les autres (1). Leurs

(1) †† Les Poiſſons volent, en quelque ſorte, dans l'eau, comme les Oiſeaux dans l'air ; & il n'y a pas moins d'art dans la manœuvre des premiers, que dans celle des ſeconds ; mais cette manœuvre differe chez les uns & les autres dans le rapport à l'élément & aux organes qui l'exécutent. Plus on étudie ce rapport, & plus on eſt frappé de l'admirable appropriation des moyens à la fin. Les nageoires, qui ſont les aîles des Poiſſons, ne ſont pas moins propres à manœuvrer dans l'eau, que les aîles des Oiſeaux, à manœuvrer dans l'air.

A l'aide de leurs nageoires & de leurs aîlerons, les Poiſſons exécutent avec autant de grace que de célérité une multitude de mouvemens divers, que leur preſteſſe dérobe ſans ceſſe aux regards avides de l'Obſervateur, & qu'il regrette de ne pouvoir contempler plus à ſon aiſe. Chez les Poiſſons dont le corps eſt arrondi, les nageoires ou les aîlerons du dos & du ventre ſervent principalement à diriger leur marche. Ils les couchent ſur le corps quand ils ſont pris en travers par le courant : ils les étendent ou les déploient quand ils nagent contre le courant ou dans une eau calme.

En général, lorſque les Poiſſons veulent ſe ſervir de leurs

paſſages ſont bien auſſi ſinguliers que ceux des Oiſeaux. Ils peuvent avoir beſoin d'une ſorte de génie pour faire leurs chaſſes avec plus de ſuccès, & pour ſe ſouſtraire à la pourſuite de leurs Ennemis. La Seche répand à propos une liqueur noire qui trouble l'eau, & la dérobe aux regards des Poiſſons qui en veulent à ſa vie. Peut-être que cette liqueur lui ſert encore à ſaiſir avec plus de facilité ceux dont elle ſe nourrit (2).

nageoires pour exécuter de petits mouvemens, ils diſpoſent les nervures ou les rayons des nageoires de maniere à les déployer; ils portent ainſi la nageoire vers la tête, puis par une diſpoſition contraire des rayons, ils la ramenent vers la queue; & par ce jeu alternatif ils fendent l'onde avec plus ou moins de vîteſſe. Ils ne nagent jamais avec plus de rapidité que lorſqu'ils déploient tous leurs ailerons. Les mouvemens preſtement répétés & habilement ménagés de la queue & de tout le corps, ſont encore ce qui influe le plus ſur la rapidité de la courſe. Pour l'ordinaire, la queue & ſon aileron ſervent de gouvernail, & c'eſt toujours par leur moyen que les Poiſſons exécutent les plus grands mouvemens. Ils changent preſque à chaque inſtant d'allure & de direction, & ſe jouent dans l'eau, de mille & mille manieres différentes & avec plus de liberté encore que les Oiſeaux dans l'air.

(2) †† La Seche, le Calmar & le Polype de Mer ſont trois Animaux marins, tous trois voraces, qui ne different que par de légeres variétés, & qui ſe reſſemblent parfaitement par le genre de vie. Quoique j'aie rangé dans mon Texte la Seche parmi les Poiſſons, ce n'eſt point du tout à dire qu'elle ſoit un vrai Poiſſon ou un Poiſſon à écailles: elle appartiendroit plutôt au peuple nombreux des Inſectes de Mer, & l'Anatomiſte cé-

D'autres Poiſſons ſavent percer avec beaucoup

lebre (†) qui l'avoit nommée *Inſecte-poiſſon*, ne l'avoit pas déſignée d'une maniere convenable. Il avoit réuni dans ſa dénomination des caracteres que la Nature n'a pas réunis dans l'Animal.

La figure de la Seche a quelque choſe de hideux & de difforme. Si elle eſt un Inſecte, elle eſt un bien grand Inſecte; car elle a environ deux pieds de longueur. Elle eſt ſur-tout caractériſée par un grand os large & épais, uni, fongueux, placé ſous le dos, & dont l'organiſation avoit fort excité l'admiration de SWAMMERDAM.

Ce qui ſe fait le plus remarquer dans l'extérieur de la Seche, ſont ſes longs bras au nombre de dix, placés à égale diſtance autour de la téte. Deux de ces bras ſont beaucoup plus longs que les autres. Tous ſont garnis de petits organes qui méritent une grande attention. Leur forme imite celle du calice d'un gland. Un anneau cartilagineux, armé de petits crochets, les ceint extérieurement. Le calice tient aux bras par un pédicule tendineux. Une membrane qui accompagne l'anneau, peut s'élever au beſoin & remplir la cavité du calice. On nomme ces petits organes les *ſuçoirs* de la Seche. Ils n'en ſont point néanmoins, & leur fonction n'a rien de commun avec celle des ſuçoirs: ils n'ont été donnés à la Seche que pour la mettre plus en état de ſe cramponner avec ſes bras & de retenir ſa proie. Ces prétendus ſuçoirs n'agiſſent que comme un cuir mouillé, qui s'applique fortement à la ſurface d'un corps. Les crochets dont ils ſont armés leur donnent plus de priſe encore. Il y a ſur chaque bras des centaines de ces petits organes, qui vont en diminuant de grandeur à meſure qu'ils approchent des extrémités. Les deux plus longs bras ne portent de ces eſpeces de mamelons qu'à leur extrémité ſupérieure. On juge qu'avec des membres & des organes ſi nombreux & ſi bien appropriés, la Seche a une merveilleuſe facilité à ſe cramponner à tous les

(†) Mr. LECAT.

d'art des coquilles fort dures, & en tirer la ſubſ-

corps, & à retenir la proie que ſes longs bras, tendineux & élaſtiques ont ſaiſie. Ils ſont à la fois des ancres, des cables & des mains.

Au centre des bras eſt placée la bouche, façonnée en bec de Perroquet : elle eſt même ſi bien un bec, qu'elle eſt cornée ou cartilagineuſe comme le bec des Oiſeaux. De chaque côté de la tête, à l'origine des bras, & à peu de diſtance l'un de l'autre, ſont placés deux yeux noirs, ſaillans & aſſez gros.

Le corps eſt charnu & recouvert d'une peau mince, mais qui a de la fermeté. Il eſt pourvu de deux eſpeces de nageoires. Mais mon objet n'eſt pas de décrire la Seche : je ne dois parler ici que des particularités qui ont rapport à ſon genre de vie & à ſon induſtrie.

Dans la cavité du bec ſe trouvent pluſieurs rangées de dents, différemment conſigurées, qui jouent latéralement comme celles des Inſectes, & au moyen deſquelles la Seche diviſe les alimens dont elle ſe nourrit.

Dans l'intérieur du ventre, près du cœcum, eſt la veſſie qui contient la liqueur noire que l'Animal rejette dans certaines circonſtances. Cette veſſie remarquable eſt pourvue d'un canal qui s'ouvre dans l'anus. Cette liqueur ſe réduit par la deſſication en une poudre impalpable.

Divers Auteurs anciens & modernes, dont je ſuivois l'opinion, avoient prêté à la Seche la petite ruſe de troubler l'eau par l'émiſſion volontaire de ſon encre, ſoit pour ſe ſouſtraire à la pourſuite de ſes Ennemis, ſoit pour s'emparer de ſa proie avec plus de ſûreté : mais d'autres Auteurs, moins amis du merveilleux, préferent de penſer, que l'émiſſion de la liqueur n'eſt que l'effet de la peur qui ſaiſit l'Animal, & qui relâchant le muſcle de la veſſie, fait épancher l'encre ; & cette opinion, qui ne laiſſe rien à l'induſtrie de la Seche, me paroît aſſez probable. L'Animal, moins ruſé qu'on ne l'avoit penſé, n'en auroit pas été mis moins en état de pourvoir à ſa conſervation.

tance charnue qu'elles renferment (3). Nous ignorons l'uſage que l'Eſpadon, la Scie, le Narhwal font de ces inſtrumens énormes qu'ils portent au bout du nez : mais, ſans doute, qu'ils entendent à les manier (4). La Torpille, qui

(3) †† Ces Animaux qui ſavent percer les coquilles pour ſe nourrir de la ſubſtance qu'elles renferment, ne ſont pas plus de vrais Poiſſons que la Seche & le Calmar ; à moins qu'on ne veuille donner le nom de *Poiſſons* à tous les Teſtacés de Mer. Ce ſont de vrais Coquillages qui, comme les Dattes dont je parlois dans la Note 2 du Chap. XX, percent ou taraudent les coquilles pour ſe nourrir de la chair de l'Animal qu'elles renferment. Tandis que les Dattes avancent lentement dans leur retraite pierreuſe, il arrive ſouvent qu'elles ſe rencontrent dans ces réduits ténébreux, & malheur alors aux Dattes qui viennent à être rencontrées par d'autres Dattes ; car celles-ci ne manquent point de les percer pour ſe nourrir de leur ſubſtance. La Pourpre, Limaçon de Mer, fameux par la riche couleur qu'il fourniſſoit aux Anciens & qui leur tenoit lieu de notre Cochenille, eſt encore un de ces Coquillages qui ont l'adreſſe de percer les coquilles pour puiſer dans leur intérieur un aliment dont ils ſont avides. La Nature les a pourvus d'une trompe armée de dents ou d'une eſpece de tariere qu'ils entendent à merveille à faire jouer, & au moyen de laquelle ils taraudent les coquilles les plus dures. (Conſultez la Note 6 du Chap. XXI de la Partie III.)

(4) †† L'Eſpadon ou la Scie & le Narhwal n'appartiennent point proprement à la claſſe des Poiſſons ; mais ils ſe rangent dans celle des Cétacées. Les vrais Poiſſons n'ont point de poumons : ils ont des ouies qui leur en tiennent lieu. Tous les Cétacées, au contraire, ont de vrais poumons. Conſultez la Note 5 du Chap. XXVI de la Partie III.

L'Eſpadon & la Scie, que je donnois dans mon Texte pour

engourdit ſi ſubitement la main qui la touche, n'a-t-elle pas un moyen bien remarquable de

deux Animaux différens, ne ſont qu'un ſeul & même Cétacée. L'Eſpadon n'eſt pas un grand Cétacée, il n'a pour l'ordinaire que neuf à dix pieds de longueur. Il eſt bien remarquable par la ſinguliere défenſe dont il eſt armé, & qui reſſemble à une forte épée dentée des deux côtés. Sa ſubſtance eſt très-dure, & les nombreuſes dents qui la diviſent ont ſouvent plus d'un pouce de long. Une peau ferme recouvre cette épée.

L'Eſpadon fait une guerre éternelle à la Baleine, & la pourſuit avec acharnement. Le combat de ces deux Cétacées offre un grand ſpectacle. La Baleine n'eſt pas armée comme l'Eſpadon; mais ſa queue, énorme muſcle d'une force prodigieuſe, lui ſert bien de défenſe. Elle tâche d'en porter un coup à ſon Ennemi, & ſi elle a le bonheur de l'atteindre, elle le met hors de combat. L'Eſpadon, très-agile, eſquive le coup avec adreſſe, bondit en l'air, & ſe laiſſant retomber ſur la Baleine, il la déchire avec ſa ſcie. Bientôt la Mer eſt teinte du ſang de la Baleine, elle s'agite avec violence, entre en fureur, foule la Mer de ſon épouvantable maſſe, la fait frémir & en éleve les eaux comme des Montagnes.

La bouche de l'Eſpadon eſt entiérement privée de dents; mais, en revanche, elle eſt comme pavée d'écailles dures & épaiſſes. Il n'avoit pas beſoin apparemment de diviſer & de moudre ſa proie avant que de l'avaler. Ce Cétacée habite les Mers de Groënland.

Le Narhwal eſt un bien plus grand Cétacée que l'Eſpadon. On voit des Narhwals qui ont depuis vingt juſqu'à ſoixante pieds de longueur. La bouche de ce Cétacée eſt dépourvue de dents comme celle de l'Eſpadon, & l'ouverture de ſon goſier eſt fort petite proportionnellement à la grandeur de ſon corps. On prétend qu'il ne ſe nourrit, comme la Baleine, que de petits Poiſſons & d'Inſectes marins; mais il n'a point, comme celle-ci, de fanons pour retenir les alimens. On avoit pris ſon énorme

pourvoir à ſa conſervation, & un grand art à

défenſe pour une corne; ce qui lui avoit fait donner le nom de *Licorne de Mer*. On a rencontré des Narhwals qui étoient armés de deux défenſes : c'étoit apparemment une monſtruoſité. J'ai parlé ailleurs de cette arme ſinguliere. (Part. III, Chap. XXV, Note 2.) Le Narhwal s'en ſert pour percer la glace & aller reſpirer à la ſurface de l'eau. Quelquefois il l'enfonce bien avant dans le doublage des Vaiſſeaux. Elle ne réſiſte pas toujours à des coups ſi violens, & il lui arrive aſſez ſouvent de ſe rompre. Un Monſtre marin, pourvu d'une arme ſi redoutable, ne feroit-il la guerre qu'aux petits Poiſſons & aux Inſectes marins? Il y a bien de l'apparence qu'il attaque d'autres Monſtres, & en particulier les Baleines avec leſquelles on le rencontre preſque toujours. Mais les Hiſtoriens de la Nature ne nous diſent que fort peu de choſe de la vie de ce Cétacée, & il n'y a pas de quoi s'en étonner : on n'obſerve pas ces Monſtres que recelent les profondeurs des Mers glaciales, comme on obſerve les Poiſſons & les Inſectes de nos viviers. Le Narhwal ſe ſert admirablement bien de ſa queue pour nager, & il eſt au nombee des Animaux de Mer qui nagent avec le plus de vîteſſe. Sa forme très-alongée tient de celle de l'Eſturgeon. On remarque qu'il ſe plaît dans la ſociété de ſes ſemblables; mais cet inſtinct ſocial lui eſt ſouvent funeſte : les Narhwals, attaqués par les Pêcheurs, ſe réuniſſent en troupes, & raſſemblés dans la même enceinte, ils croiſent leurs longues défenſes de mille maniere différentes, & les embarraſſent tellement les unes dans les autres, qu'ils ne peuvent plonger & ſe ſouſtraire ainſi aux pourſuites de leurs plus ardens Ennemis.

L'Empereur eſt un autre Cétacée qui n'eſt pas plus grand que l'Eſpadon, & qui eſt auſſi agile que lui. Il porte ſur le dos une ſorte de ſabre ou plutôt de pieu, de trois à quatre pieds de longueur, qui ne paroît pas trop une arme offenſive, & dont on ignore encore le véritable uſage. Les vraies armes offenſives de ces ſortes de Cétacées ſont dans leur gueule : elles conſiſtent dans les dents pointues dont leurs deux mâchoires ſont

offrir aux méditations du Phyſicien (5)? Le Poiſſon volant, pourſuivi par d'autres Poiſſons,

bien pourvues. Ils ſe réuniſſent pour faire la guerre à la Baleine : ils fondent ſur elle avec impétuoſité, lui enlevent chacun de leur côté de gros morceaux de chair, & ne ceſſent de la harceler juſqu'à ce qu'excédée de fatigue elle ouvre ſa gueule & en faſſe ſortir ſon énorme langue. A l'inſtant ſes Ennemis acharnés ſe jettent ſur cette langue dont ils ſont friands, l'arrachent & la dévorent.

Les Cétacées ſont des Animaux *ſouffleurs*, qui rejettent avec force, par leurs évents, & ſouvent à pluſieurs toiſes de diſtance, l'eau de la Mer qu'ils ont avalée. Ces torrens d'eau qu'ils font jaillir avec tant de force peuvent dans certains cas étourdir leurs proies & leur en faciliter la capture. C'eſt à la force prodigieuſe de leurs poumons, à la conformation particuliere de leur larynx, à une ſorte d'aqueduc ſitué au bas du front, & à un muſcle fort puiſſant, que ces grands Animaux ſouffleurs doivent la ſinguliere propriété de lancer l'eau à des diſtances conſidérables & en grande abondance.

(5) †† J'ai parlé au long de la Torpille & de ſon admirable inſtrument électrique, dans la Note 5 du Chap. XIII de la Partie V : j'y renvoie le Lecteur. La Torpille, qui eſt du genre des Raies, appartient à la claſſe des Poiſſons *cartilagineux*. (Voy. Part. III, Chap. XXV, Note 7.) Un Voyageur célebre fait mention d'une très-grande Raie de l'Amérique, qui n'a pas, comme la Torpille, la propriété d'engourdir ſa proie ; mais qui a un autre moyen bien remarquable de s'en ſaiſir. Les Américains la nomment *Manta* ou *Couverture*, & ce nom lui convient à merveille : elle ſe roule comme une couverture autour de ſa proie & l'étouffe. Il arrive quelquefois aux Plongeurs d'être enveloppés ſubitement par cette couverture vivante, & d'en être étouffés. Elle a neuf à dix pieds de longueur ſur une largeur proportionnée. On pourroit douter néanmoins que ce Poiſſon ſoit une véritable Raie ; car le Voyageur rapporte qu'il

s'élance hors de l'eau, pour ſe réfugier dans l'air, où il ſe ſoutient à l'aide de ſes grandes nageoires (6).

C'EST encore une choſe intéreſſante, que la maniere dont divers Poiſſons fraient. Pluſieurs quittent alors les Mers ou les Lacs, & entrent dans les Rivieres. Le Mâle joue avec la Femelle, & après qu'ils ſe ſont livrés à leurs chaſtes amours, ils rentrent dans leurs anciennes demeures (7).

ſe laiſſe tomber ſur ſa proie ou ſur le Plongeur pour l'envelopper & s'en rendre maître: il faut donc que ce Poiſſon puiſſe quitter le fond de l'eau pour en agir ainſi; & l'on ſait que les Raies ſont des Poiſſons *rampans*, qui ne quittent pas le fond de l'eau. (Ibid.)

(6) †† Voyez ſur le Poiſſon-volant la Note 1 du Chapitre XXVI de la Partie III.

(7) †† On ſait que les vrais Poiſſons ou les Poiſſons à ouies ne s'accouplent point. Le Mâle & la Femelle ſont privés des parties propres à la copulation: mais la Femelle contient des uves, qui ſont des amas d'œufs renfermés ſous une enveloppe commune, & qu'elle laiſſe tomber au temps du frai. Les laites du Mâle contiennent la liqueur deſtinée à féconder ces œufs. Il les en arroſe, après s'être joué quelque temps avec la Femelle. On veut qu'il ſe renverſe ſur le dos pour rencontrer le ventre de celle-ci & le frotter à pluſieurs repriſes: mais il faut convenir, que nous ſommes fort peu éclairés encore ſur les amours des Poiſſons. Il ſemble même que le Mâle ſoit plus attaché aux œufs qu'à la Femelle qui les a pondus. On le voit paſſer &

On ſait qu'on apprivoiſe les Carpes & qu'elles

repaſſer bien des fois ſur ceux qui ont été dépoſés à l'aventure par des Femelles qu'il n'a point connues. Il eſt au moins très-ſûr que la fécondation des œufs des vrais Poiſſons ne s'opere qu'après qu'ils ont été pondus. On peut même les féconder artificiellement comme ceux de quelques Amphibies en les arroſant de la liqueur ſpermatique du Mâle. (Part. VII, Chap. X, Note 2, Part. X, Chap. XXIII, Note 9.)

Parmi les Poiſſons de Mer, il en eſt qui jettent leurs œufs ſur le rivage, tout près de l'endroit où le flot va mourir, & où ils peuvent être échauffés par le Soleil. Là ſe rencontrent une multitude de petits Inſectes qui ſont la pâture appropriée au Fretin. L'inſtinct naturel qui porte les Meres à aller faire leur ponte dans ces lieux, aſſure la conſervation des différentes Eſpeces. Mais les Poiſſons qui habitent la haute Mer n'étoient pas appellés à pondre près des rivages : ils devoient en être toujours trop éloignés : ils jettent donc leur fraï dans la Mer, & il ſurnage à la ſurface où il participe aux douces influences de l'Air & du Soleil.

Les Morues, qui ſont un ſi grand objet de navigation & de commerce; les Morues, qu'on pêche & qu'on prépare de tant de manieres différentes, & qui alimentent tant de Peuples divers; les Morues, dis-je, prennent leur naiſſance dans les Mers du Nord de l'Europe, & ſe répandent dans toutes les Mers qui ceignent les grands Continens. Elles nagent par grandes troupes, & leurs marches n'offrent rien de bien conſtant. En général, les Morues de l'Amérique abandonnent au Printemps les profondeurs de l'Océan où elles s'étoient retirées pendant l'Hiver, pour s'approcher des côtes & des bancs : elles y ſont attirées par les Harengs & par d'autres petits Poiſſons dont elles ſont friandes. Des légions innombrables de ces gros Poiſſons accourent en Été vers le grand banc de Terre-neuve, & procurent à des milliers de Pêcheurs de toutes les Nations les pêches les plus abondantes. Un ſeul Pêcheur en prend dans un ſeul jour pluſieurs centaines. A la vue de ces pêches preſque

accourent,

accourent, comme les Poules, à un certain ſignal

miraculeuſes, exercées annuellement par un ſi grand nombre de Nations & dans tant de parages différens, on a peine à comprendre comment la fécondité des Morues peut ſuffire à la prodigieuſe conſommation que les Hommes & les Animaux de Mer font chaque jour de ces Poiſſons. Mais, quand on vient à apprendre de l'infatigable LEUWENHŒK qu'une ſeule Morue peut pondre environ dix millions d'œufs, on n'eſt plus ſurpris que la fécondité de ce Poiſſon puiſſe fournir aux beſoins de tant de Peuples, & on n'eſt plus frappé que de l'étonnante magnificence de la Nature dans la multiplication des Êtres vivans. Le Hareng nous a déja donné lieu de faire la même réflexion. (Part. XI, Chap. XIV, Note 1.)

Le Saumon, dont la chair ne le cede guere en délicateſſe à celle de la Morue, mais qui n'eſt pas un ſi grand objet de commerce, eſt comme elle un Poiſſon de paſſage. Les Saumons émigrent d'une Mer dans une autre. Ils abondent dans les Mers du Nord de l'Europe & en Amérique. Mais ils ne ſe tiennent pas conſtamment dans les Mers: ils remontent les fleuves juſques vers leur origine pour y chercher les nourritures qu'ils aiment le plus & pour y frayer. Ils ſe plaiſent dans les eaux vives & claires qui courent ſur un lit de gravier. Ils nagent avec une grande célérité & ne ſont point arrêtés dans leur courſe rapide par des cataractes aſſez hautes. Ils ſavent les franchir avec autant d'adreſſe que de force, & la manœuvre à laquelle ils ont alors recours eſt bien remarquable. Ils ploient leur corps en arc de cercle, ils le bandent comme un reſſort, & en frappant l'eau de leur queue ils s'élancent à une hauteur conſidérable, & ſurmontent ainſi en bondiſſant l'impétuoſité de la cataracte. Après qu'ils ont frayé dans les fleuves, la plupart les deſcendent pour regagner la Mer & ſe mettre à l'abri des fortes gelées. Les Naturaliſtes ſont fort diviſés ſur les marches des Saumons, & on ne peut pas trop compter ſur ce qu'ils nous racontent de quelques particularités de leur vie. Il en eſt qui nous aſſurent que les Saumons ont l'adreſſe de

pour recevoir la pâture des mains de leur Pourvoyeur (8).

creuſer dans le lit des fleuves des foſſes ſpacieuſes pour y dépoſer leurs œufs, & empêcher ainſi que le courant ne les entraîne. Et comme ſi ce n'étoit pas déja là une aſſez grande adreſſe pour un Poiſſon, ces Naturaliſtes veulent encore que le Mâle & la Femelle travaillent de concert à élever une petite digue de gravier autour des foſſes pour garantir mieux les œufs de l'effort du courant. Il y a ſûrement beaucoup à rabattre d'un récit ſi embelli; & nous nous bornerons à admettre avec le plus ſage des Hiſtoriens (†) des Poiſſons, que l'amour du merveilleux ne ſéduiſit jamais, que toute l'adreſſe des Saumons ſe réduit ici à creuſer dans le ſable ou le gravier des ſillons plus ou moins profonds, où ils dépoſent leur frai.

La Truite, qui eſt de la famille des Saumons, paſſe, comme eux, de la Mer dans les fleuves pour y frayer. Mais toutes les Truites n'habitent pas également les eaux ſalées & les eaux douces. Il en eſt qui n'habitent que les eaux douces : ce ſont les Truites *fluviatiles*. Elles ſe plaiſent auſſi dans les eaux vives & claires, & ont peut-être plus de force que les Saumons pour rompre les courans les plus rapides & franchir les cataractes. Les Truites du Lac de Geneve, fameuſes par l'excellence de leur chair & par leur groſſeur, commencent au Printemps à abandonner le Lac pour deſcendre dans le Rhône & y frayer : mais les plus groſſes ne deſcendent dans le fleuve qu'en Automne. Il eſt néanmoins des raiſons de penſer que quelques-unes fraient dans le Lac.

L'Anguille, qui ſemble ſe rapprocher plus des Reptiles que des Poiſſons, & qui eſt vivipare comme la Vipere, paſſe des rivieres dans la Mer pour y mettre bas ſes Petits. La plupart des Meres rentrent enſuite de la Mer dans les rivieres, & les jeunes Anguilles les y ſuivent.

D'autres Eſpeces de Poiſſons entrent dans les marais ſalans

(†) Mr. DUHAMEL.

QUE n'a-t-on point débité en ce genre ſur

pour y dépoſer leur frai, & retournent enſuite à la Mer.

Preſque tous les Poiſſons ſont très-voraces; & leurs migrations ont toujours pour objet de faire la guerre à d'autres Poiſſons, & de chercher des lieux propres à fournir au Fretin des nourritures convenables. Dans cette claſſe ſi nombreuſe d'Animaux aquatiques, nous ne connoiſſons point encore d'Eſpeces qui pourvoient à l'éducation des Petits. L'amour maternel, qui ſe fait tant admirer dans diverſes Eſpeces d'Oiſeaux & de Quadrupedes, ne ſe retrouve point chez les Poiſſons. Les Femelles abandonnent à la Nature le ſoin de leurs Petits, & cette bonne Mere a bien pourvu à leurs beſoins. Quelques Cétacées néanmoins prennent un grand ſoin de leur Progéniture; mais les Cétacées qui ſont tous vivipares & qui tous alaitent leurs Petits, ſe rapprochent bien plus à cet égard des Quadrupedes que des vrais Poiſſons. Les Femelles chez les vrais Poiſſons ne connoiſſent point leurs Progénitures, & les dévorent comme toute autre proie. Ainſi chez cette grande Famille d'Êtres vivans, il n'y a pas plus de tendreſſe maternelle qu'il n'y a d'amour conjugal.

Au reſte, il eſt rigoureuſement prouvé qu'on rencontre quelquefois chez les Poiſſons de vrais hermaphrodites ou des Individus qui portent d'un côté des uves & de l'autre des laites. La Carpe, le Brochet & le Merlan en ont fourni des exemples à des Naturaliſtes célebres, qui ne pouvoient s'en laiſſer impoſer par des apparences trompeuſes. Ce ſont des Monſtres d'un genre ſingulier.

Si le Poiſſon de l'Iſle-de-Bourbon, dont Mr. de REAUMUR avoit parlé à l'Académie de Paris, étoit bien un vrai Poiſſon, l'art de filer ne ſeroit pas inconnu aux Animaux de cette claſſe; car ce Poiſſon ſe renferme avec ſes œufs dans une enveloppe de ſoie. Mais il me paroît plus probable que cet Animal marin appartenoit au genre des Teſtacées ou des Inſectes, avec leſquels on a trop ſouvent confondu les Poiſſons.

(8) †† Les Carpes apprivoiſées dans les viviers accourent

le Dauphin ! Combien les Anciens, amateurs nés du merveilleux, nous ont-ils vanté ſon adreſſe, ſon agilité, ſes jeux, ſa tendreſſe pour l'Homme, ſa conſtance, & même ſa gratitude ! Mais il faut laiſſer aux Poëtes à célébrer ce PILADE marin (9).

VRAISEMBLABLEMENT les Poiſſons ſont de tous les Animaux ceux à qui il a été donné de vivre le plus long-temps. On a vu des Carpes de cent cinquante ans (10). Les Poiſſons tranſ-

au ſon d'une clochette pour recevoir leur nourriture. On pouvoit douter de ce fait avant qu'on eût exécuté les expériences qui prouvent que l'eau tranſmet les ſons, & qu'on eût démontré l'exiſtence de l'organe de l'ouie dans les Poiſſons. Conſultez la Note 4 du Chap. XXV de la Part. III. Il ſemble même que les Carpes aient l'ouie aſſez fine : elles fuient dès qu'on fait quelque bruit & vont ſe cacher dans la vaſe.

(9) †† Voyez ſur le Dauphin la Note 6 du Chap. XXV de la Partie X.

(10) †† L'Auteur des *Époques de la Nature* parle de Carpes de plus de deux cents ans ; & il dit à ce ſujet, que puiſqu'une Carpe vit plus de deux cents ans, une Baleine peut bien vivre mille ans. Mais il n'y a probablement qu'un très-petit nombre de Baleines qui meurent de vieilleſſe : la carriere de la plupart eſt fort abrégée par les armes des Pêcheurs, ou par celles des Monſtres marins qui leur font une guerre éternelle.

On aſſigne différentes cauſes de la longue durée de la vie des Poiſſons : celles que j'indique dans mon Texte paroiſſent être les principales. Mais cette partie ſi conſidérable de l'Hiſtoire des

pirent & s'endurciſſent peu : ils n'ont pas proprement des os. Mais ils vivent dans un état de guerre perpétuelle. Tous dévorent ou ſont dévorés. Ceux qui vivent âge de Poiſſon, doivent acquérir une grande expérience des affaires de la Mer. Ce ſeroient de tels NESTORS qui pourroient nous valoir de bons Mémoires ſur l'Hiſtoire ſecrete d'un Peuple ſi peu connu (11).

Animaux eſt bien imparfaite encore, & nous n'avons ſur la vie & ſur les procédés des Poiſſons, que des obſervations détachées qui ne ſuffiſent point pour nous donner leur hiſtoire L'élément qu'ils habitent & les profondeurs dans leſquelles ils ſe retirent, les mettent trop hors de la portée des Obſervateurs. Nous avons au moins de bonnes deſcriptions d'un aſſez grand nombre d'Eſpeces & des notices aſſez exactes des marches de quelques-unes.

On peut juger juſqu'à un certain point de l'accroiſſement des Poiſſons par une obſervation qu'on a faite ſur celui des Carpes. Des Poiſſons de cette Eſpece, qui n'ont encore que cinq à ſix pouces de long, acquierent au bout de quatre à cinq ans une longueur d'un pied. On a vu des Carpes de trois pieds & demi de long, & qui peſoient quarante-cinq livres. Il n'eſt guere de Poiſſons qui aient d'auſſi grandes écailles que celui-ci. Sa fécondité eſt merveilleuſe, ſans l'être néanmoins autant que celle de la Morue. Le célebre PETIT, Médecin, avoit calculé qu'une Carpe de grandeur moyenne contenoit plus de trois cents quarante mille œufs.

(11) †† Il eſt ſingulier qu'il y ait de petits Poiſſons qui vivent & multiplient dans une eau thermale de ſoixante-deux degrés du thermometre de REAUMUR : c'eſt pourtant un fait dont Mr. SONNERAT s'eſt aſſuré, & qu'il a obſervé dans l'Iſle-de-Luçon, qui eſt une des Philippines. Les petits Poiſſons qui

CHAPITRE XXVIII.

Procédés des Oiſeaux.

NOUS avons entrevu les émigrations des Oiſeaux, & nous avons conjecturé qu'elles dépendent principalement des vents (1). Un Naturaliſte exact s'en eſt aſſuré à Malte. Toutes ſes obſervations prouvent, que les mêmes Eſpeces émigrent toujours par des vents déterminés. En Avril le ſud-oueſt amene dans cette Isle des eſpeces de Pluviers, & le nord-oueſt des Cardinaux & des Cailles. A-peu-près dans le même temps, les Faucons, les Buſes, & autres Oiſeaux de proie paſſent avec le nord-oueſt, ſans ſéjourner, & repaſſent en Octobre, avec le ſud ou l'oueſt. En Eté, le vent d'eſt conduit à Malte les Bécaſſines, & vers le milieu de l'Automne, le nord & le nord-oueſt y conduiſent de nombreux eſcadrons de Bécaſſes. Ces Oiſeaux ne peuvent point voler, comme les Cailles, vent arriere : puiſque le vent du nord qui pourroit les porter en Barbarie, les oblige de demeurer

habitoient une eau ſi chaude, étoient très-agiles. On a vu à-peu-près la même choſe dans de très-petits Coquillages.

(1) Part. XI, Chap. XIII.

dans les Isles. Les Cailles, au contraire, émigrent vent arriere d'un Pays dans un autre. Le ſud-eſt les fait paſſer au mois de Mars de Barbarie en France. Elles reviennent de France en Septembre, & paſſent à Malte par un ſud-eſt. Les vents ſont donc les ſignaux que la Nature emploie pour annoncer à divers Oiſeaux le temps de leur départ. Fideles à cette voix, ils ſe mettent en route & ſuivent la direction qu'elle leur indique (2).

Nous ne finirions point ſi nous voulions parcourir les procédés propres à chaque Eſpece d'Oiſeaux : ſuivre les Oiſeaux de proie dans leurs chaſſes preſque ſavantes ; les Oiſeaux aquatiques dans leurs pêches ingénieuſes ; les Oiſeaux domeſtiques dans leur petit ménage ; les Oiſeaux nocturnes dans leurs retraites ſombres, &c. (3).

(2) Conſultez ſur les migrations des Oiſeaux & ſur leurs différentes cauſes, les Notes 1 & 2 du Chapitre XIII de la Partie XI.

(3) †† Les Oiſeaux, beaucoup plus nombreux en Eſpeces que les Quadrupedes, & bien autrement induſtrieux que les Poiſſons, offrent une grande perſpective aux yeux du Contemplateur de la Nature : mais un ſi vaſte tableau ne ſauroit être renfermé dans l'eſpace étroit de quelques Notes : je me bornerai donc à en détacher un petit nombre de traits, & je renvoierai mon Lecteur à la belle Hiſtoire des Oiſeaux des deux illuſtres François, où les mœurs, les inclinations & les procé-

Je ne m'arrêterai donc pas à vous faire admirer la longue langue du Pic-vert, le reſſort

dés de ces nombreux Habitans de l'air ſont décrits avec tant de nobleſſe, d'agrément & de vérité.

L'Aigle, qui domine ſur les Oiſeaux comme le Lion ſur les Quadrupedes, ſoutient avec ce noble Animal bien des rapports phyſiques & moraux, qu'on ſe plaît à contempler. Tous deux regnent en Monarques, l'un ſur les hautes Montagnes & dans les régions les plus élevées de l'Atmoſphere, l'autre, dans les déſerts brûlans ou dans l'épaiſſeur des forêts. Tous deux ſe plaiſent dans ces lieux ſolitaires & inacceſſibles où l'antique & vénérable Nature ne ſe montre que par ſes faces les plus agreſtes. Appellés tous deux à vivre de proie & de carnage, ils ne ſouffrent point qu'aucun autre Animal de leur Eſpece oſe s'introduire dans leur domaine, & l'amour ſeul, le plus doux & le plus impérieux des tyrans, force le Mâle & la Femelle à s'unir pour ſatisfaire à des beſoins communs. Fiers & magnanimes, autant qu'intrépides & courageux, ils dédaignent de foibles ennemis & répugnent de s'en venger. Tous deux enfin ne veulent que du butin qu'ils ont eux-mêmes conquis, & de proie, que celles qu'ils ont immolées à leur appétit toujours renaiſſant. Ils ne les dévorent pas même en entier, en abandonnent les reſtes aux autres Animaux, & ne touchent jamais aux cadavres.

Chez la race impériale de l'Aigle, les nœuds que l'amour a cimentés entre le Mâle & la Femelle ſubſiſtent encore après la jouiſſance. Le Couple guerrier demeure uni & pourvoit à l'éducation de la Famille. Il fait une guerre perpétuelle aux gros Oiſeaux & à divers Quadrupedes, fond ſur eux avec impétuoſité, les ſaiſit avec ſes fortes ſerres, & les tranſporte d'un vol hardi dans ſa haute retraite. C'eſt-là que dans l'enfoncement d'un rocher eſt un nid ſpacieux, proportionné à la grandeur & à la force des Oiſeaux qui l'ont conſtruit. Très-différent de celui des Oiſeaux ſubalternes, ſa forme n'eſt point hémiſphé-

rique & il n'eſt point creux pour concentrer la chaleur. C'eſt une ſorte d'*aire* ou de plancher, formé de perches de cinq à ſix pieds de longueur, fixées par leurs extrémités & croiſées par des branches ſouples, ſur leſquelles repoſent pluſieurs lits d'herbes & de bruyeres. Cette aire, qui n'a d'autre recouvrement que les avances du rocher, eſt ſi ſolidement conſtruite, qu'elle ſuffit à porter toute la Famille & une grande quantité de proviſions.

Le Faucon, auſſi fier, auſſi indépendant, auſſi courageux que l'Aigle, mais qui lui eſt bien inférieur en grandeur & en force, ſe plaît, comme lui, dans les lieux ſolitaires & agreſtes, & niche de même dans l'intérieur des rochers les plus élevés. Il ſe perd comme l'Aigle dans la nue, & ſon vol eſt ſi rapide que ſon apparition eſt toujours ſubite & imprévue. Son courage franc & mâle lui interdit la ruſe & les détours : il fond à-plomb ſur ſa proie, & en ſe relevant dans la même direction, il l'emporte dans les airs. Il fait la guerre au Milan ; mais parce qu'il ſe défend en lâche, le Faucon généreux le traite avec dédain & ne le tue point.

L'Homme, dont la raiſon ſupérieure à tous les inſtincts fait ſervir tous les Êtres à ſes plaiſirs & à ſes beſoins, ſait mettre à profit les nobles qualités du Faucon, & en les perfectionnant par une éducation bien entendue, transforme en art l'inſtinct du fier Oiſeau, & ſoumet à des loix conſtantes cet Être indépendant qui ſembloit né pour n'obéir qu'à la Nature.

Au dernier rang des Oiſeaux de proie paroît un Oiſeau qui n'eſt guere plus gros qu'une Alouette, dont le courage eſt tel qu'il ne craint point d'attaquer des Oiſeaux qui lui ſont ſupérieurs en force & en grandeur, & même des Oiſeaux de proie ; qui oſe voler de pair avec ces Tyrans de l'air & chaſſer juſques dans leur domaine. Mais c'eſt ſur-tout dans la défenſe de ſes Petits que l'intrépidité de ce petit Oiſeau ſe fait le plus admirer : il n'attend pas pour commencer le combat, que l'Oiſeau de rapine s'approche de ſon nid ; il ſuffit qu'il paroiſſe vouloir s'en approcher ; il lui va au-devant, fond ſur lui, le bleſſe cruellement, le force à fuir, & dans une lutte ſi inégale il eſt aſſez

rare que le petit Oiſeau cede à la force ou qu'il ſe laiſſe emporter : auſſi eſt-il reſpecté de tous les Oiſeaux de proie ſubalternes. Ce petit ACHILLE eſt la Pie-grieche.

Tandis que les Oiſeaux de proie ſe jouent dans les nues & qu'ils exercent leurs brigandages dans les airs, les Oiſeaux aquatiques ſe jouent ſur les eaux & y font la guerre aux Poiſſons. Les uns fendent les flots & s'y enfoncent; les autres ne font que les raſer par un vol rapide. L'élément mobile eſt pour tous un domicile aſſuré : tranquilles au milieu des orages, ils s'y raſſemblent en grandes troupes, luttent contre les vents, badinent avec les vagues, & n'ont point à redouter les naufrages.

Ces Oiſeaux, dont les Eſpeces ſont très-nombreuſes, ne quittent la Mer que pour aller pondre ſur le rivage. Ils y retournent ſouvent pour fournir les nourritures à leurs Petits; & dès qu'ils ont pris un certain accroiſſement, ils les conduiſent à la Mer, & leur enſeignent par leur exemple le double art de nager & de voler. Navigateurs nés, leurs corps & leurs membres ſont merveilleuſement appropriés à l'élément liquide qu'ils devoient habiter de préférence; & l'on croiroit que c'eſt ſur ce modele naturel que les Hommes ont conçu l'heureuſe idée de leurs navires. Le corps de l'Oiſeau aquatique eſt bombé comme la carene d'un vaiſſeau : ſon col qui s'éleve ſur une poitrine éminente, repréſente aſſez la proue du navire : ſa queue courte & raſſemblée en pinceau ſemble être un gouvernail : ſes pieds palmés ſont de vraies rames : enfin, le duvet fin, épais & verni qui revêt tout le corps, eſt une ſorte de goudron naturel qui le défend contre l'impreſſion de l'eau.

En général, les eaux ſont pour les Oiſeaux de Mer un ſéjour de repos & de plaiſir, & où ils exercent toutes leurs facultés avec plus d'aiſance encore que les Oiſeaux de l'air ne les exercent dans cet élément léger. „ Voyez ces Cignes nager avec „ molleſſe, ou cingler ſur l'onde avec majeſté; ils s'y jouent, „ s'ébattent, y plongent & reparoiſſent avec les mouvemens „ agréables, les douces ondulations & la tendre énergie qui „ annoncent & expriment les ſentimens ſur leſquels tout amour „ eſt fondé : auſſi le Cigne eſt-il l'emblême de la grace,

„ premier trait qui nous frappe, même avant ceux de la „ beauté.

„ La vie de l'Oiſeau aquatique eſt donc plus paiſible & moins „ pénible que celle de la plupart des autres Oiſeaux. . . L'élé- „ ment qu'il habite lui offre à chaque inſtant ſa ſubſiſtance ; il „ la rencontre plus qu'il ne la cherche . . . & cette vie plus „ douce, lui donne en même temps des mœurs plus innocentes „ & des habitudes plus pacifiques. Chaque eſpece ſe raſſemble „ par le ſentiment d'un amour mutuel ; nul des Oiſeaux n'at- „ taque ſon ſemblable, nul ne fait ſa victime d'aucun autre „ Oiſeau, & dans cette grande & tranquille Nation, on ne voit „ point le plus fort inquiéter le plus foible. . . Le Peuple aîlé „ des eaux, par-tout en paix avec lui-même, ne s'eſt jamais „ ſouillé du ſang de ſon Eſpece. Reſpectant même le genre „ entier des Oiſeaux, il ſe contente d'une chere moins noble, „ & n'emploie ſa force & ſes armes que contre le genre abject „ des Reptiles & le genre muet des Poiſſons ".

Parmi les Oiſeaux qui vivent de pêche, il en eſt de plongeurs, qui ſavent ſurprendre leur proie ſous l'eau ; d'autres la ſaiſiſſent leſtement à la ſurface ou lorſqu'elle bondit en l'air. Souvent même ils n'ont qu'à la recevoir dans leur bec, parce que le flot complaiſant la leur apporte. Tous ſont très-voraces : & il en eſt dont l'appétit eſt ſi véhément qu'ils ſe jettent ſur tout ce qu'ils rencontrent. Les Oies & les Canards de nos baſſes-cours nous en fourniſſent des exemples. Quelquefois néanmoins la pêche eſt funeſte à l'Oiſeau pêcheur, & il eſt avalé lui-même par le Poiſſon ; car il faut bien que les Animaux qui détruiſent ſoient détruits à leur tour.

Des Oiſeaux dont le corps eſt comme élancé, dont le col & les jambes ſont démeſurément longs, & qu'on diroit montés ſur des échaſſes ; des Oiſeaux enfin, dont les pieds ſont entiérement dépourvus de membranes, ne ſont aſſurément pas faits pour nager ſur les eaux, mais ils ſont admirablement bien faits pour marcher dans les marais & dans les eaux baſſes : auſſi la Nature les a-t-elle placés ſur les rivages, &, pour ainſi dire, ſur les confins de la terre & des eaux. Ils vivent de Poiſſons, de Rep-

tiles & d'Inſectes. Leur bec, pour l'ordinaire long & aſſez effilé, paroît façonné tout exprès pour fouiller dans le limon vaſeux, & y chercher la pâture qui leur convient.

N'oublions pas de remarquer un petit procédé commun à divers Oiſeaux pêcheurs : comme ils avalent les Poiſſons ſans les mâcher, on juge facilement qne les ailerons & les nageoires s'oppoſeroient à la déglutition s'ils ſe préſentoient à contre-ſens à l'ouverture du goſier : quand donc l'Oiſeau a ſaiſi un Poiſſon par la queue ou par le ventre, il le rejette en l'air, lui fait faire un demi-tour ſur lui-même, qui le ramene la tête la premiere dans le bec de l'Oiſeau, & celui-ci exécute cette petite manœuvre avec tant de promptitude & d'adreſſe, qu'il ne manque préſque jamais ſon coup. Ce tour d'adreſſe ſe fait ſur-tout admirer dans le Cormoran, grand Oiſeau aquatique, auquel la conformation ſinguliere & très-avantageuſe de ſes jambes & de ſes pieds donne une merveilleuſe facilité pour nager, & qui n'eſt pas moins bon plongeur que bon nageur. Il eſt ſuſceptible d'une ſorte d'éducation, & on le dreſſe à la pêche comme le Faucon au vol. Un anneau de fer ou tout autre lien placé au bas du col de l'Oiſeau pêcheur, empêche que le Poiſſon qu'il a ſaiſi ſous l'eau ne deſcende dans l'eſtomac, & le conſerve pour la table du Maître.

Le Martin-pêcheur ou l'Alcyon ſuit le cours des ruiſſeaux, ſe perche ſur une branche qui incline ſur l'eau, attend le moment du paſſage d'un petit Poiſſon, fond ſur la proie en ſe laiſſant tomber dans l'eau, en reſſort la tenant au bec, la porte ſur le terrein voiſin contre lequel il la bat avant que de l'avaler. S'il ne trouve pas de branches pour ſe percher, notre Pêcheur ſe poſe ſur quelque pierre du rivage, & au moment qu'il découvre un petit Poiſſon, il bondit à douze ou quinze pieds de hauteur, & ſe laiſſe retomber ſur la proie.

Ennemis de la lumiere, les Oiſeaux nocturnes ne peuvent en ſupporter l'éclat. Ils dérobent pendant le jour leur triſte & laide figure aux regards de l'Homme & des autres Animaux, & ſe cachent dans des troncs d'Arbres, dans de vieilles maſures ou dans les réduits les plus obſcurs. Ils en ſortent à l'approche

qui la met en jeu, & la maniere dont il la darde dans les trous des Arbres pour saisir adroitement les petits Insectes qui y sont logés (4).

de la nuit & vont à la chasse des petits Oiseaux, des Rats, des Mulots, des Campagnols, &c. Ils les avalent tout entiers & en rejettent ensuite toutes les parties cornées ou osseuses, & la peau toujours roulée en maniere de tuyau ou de cornet. Quelques-uns néanmoins plument adroitement les Oiseaux avant que de les avaler. Comme ils chassent en silence & au milieu des ombres de la nuit, ils ont beaucoup de facilité à surprendre les autres Oiseaux pendant leur sommeil. Il en est même qui, malgré leur grosse corpulence, chassent avec assez de légéreté & d'adresse, & c'est ce qu'on remarque en particulier dans le gros Oiseau de nuit nommé le *Grand-duc*. Il est assez courageux & assez puissant pour attaquer les Oiseaux de rapine & leur enlever leur proie. Il n'est, pour ainsi dire, que demi nocturne, & une lumiere qui blesseroit les yeux de la plupart des Oiseaux de sa classe, ne blesse pas les siens. Mais celle de la Lune est agréable à tous, & c'est à sa clarté qu'ils font les meilleures chasses; car il ne faut pas s'imaginer que les Oiseaux qu'on nomme *nocturnes*, chassent dans les ténebres les plus profondes. ils ont toujours besoin d'un certain degré de lumiere pour diriger leur vol; mais parce que leur prunelle est susceptible d'une très-grande dilatation, ils voient mieux à une lumiere très-foible que les autres Oiseaux.

(4) †† Il est des Animaux si heureusement nés, qu'ils semblent être les Enfans gâtés de la Nature : sans cesse environnés d'un riche fond de subsistances, ils jouissent sans fatigue & sans trouble des biens qu'elle leur prodigue. D'autres Animaux, au contraire, semblent des Enfans disgraciés, qu'elle a condamnés au genre de vie le plus pénible & le plus laborieux, & qui ne se procurent la subsistance qu'à force de recherches, de peine & de travail. Tel est, en particulier, le genre de vie du Pic-

QUELLE foule de traits intéreſſans la conſtruction des nids ne nous offriroit-elle point

vert, dont le triſte ſort differe peu de celui du galérien. Son air rude & demi-farouche répond bien au genre de vie groſſier qui lui a échu en partage, & ſes accens plaintifs annoncent au loin ſes efforts & ſes peines. Il vit ſolitaire, ordinairement cramponné à l'écorce des Arbres, qu'il travaille ſans relâche à percer pour ſaiſir les petits Inſectes qu'elle recele : ſouvent même il faut qu'il perce juſqu'au bois pour faire un chétif repas ; & ſouvent encore dans ce pénible travail, il eſt placé à la renverſe & dans la ſituation la plus fatigante. Mais, la Nature qui avoit impoſé au malheureux Pic une tâche ſi rude, n'a pas négligé de le munir de tous les inſtrumens qui pouvoient lui en faciliter l'exécution. Ses jambes aſſez groſſes, courtes & muſculeuſes, ſont terminées par quatre forts doigts bien arqués & garnis d'ongles très-crochus. Sa queue, courte & formée de plumes roides & courbées en dedans, paroît bien faite pour lui ſervir de point d'appui. Son bec droit, dur, tranchant & pointu eſt un excellent inſtrument pour entamer l'écorce & le bois. Mais c'eſt ſur-tout ſa langue qui eſt ſon plus bel inſtrument, & qui mérite le plus d'être admirée ; auſſi l'a-t-elle été par des Hommes dont l'admiration étoit très-éclairée, par les BORELLI, les MERY, les CAMPER. Elle paroît fort longue, & ſa ſtructure très-recherchée renferme une multitude de particularités anatomiques qu'une ſimple deſcription ne ſauroit bien rendre. Je dis qu'elle *paroît fort longue ;* c'eſt que ce qui ſe montre hors du bec & que l'Oiſeau darde dans les trous qu'il pratique, & qu'on prendroit pour un long Ver, n'eſt pas en entier une langue ; il n'y a proprement que l'extrémité cornée de ce ſingulier organe qui en ſoit une. Le reſte eſt l'oſſelet nommé *hyoïde*, renfermé dans une ſorte de gaîne membraneuſe, qui après s'être diviſé en deux rameaux ſe courbe ſur la tête, ſe couche dans une rainure creuſée dans le crâne, & va s'implanter dans le front à la racine du bec. Ce ſont ces rameaux, partie oſſeux, partie car-

encore ! Quelle ne ſeroit point notre admiration à la vue de ces petits bâtimens ſi réguliers, compoſés de tant de matériaux différens, raſſemblés les uns après les autres avec tant de peine & de choix, mis en œuvre & arrangés avec tant d'induſtrie, d'élégance & de propreté, par un Animal, qui n'a pour tout inſtrument qu'un bec

tilagineux & élaſtiques, qui operent l'alongement & le jeu de la langue du Pic. Tout l'appareil ſe déroule comme un reſſort quand l'Oiſeau fait jouer ſa langue. L'extrémité cornée de celle-ci eſt armée de petits crochets deſtinés à ſaiſir & à retenir les petites proies vivantes dont le Pic ſe nourrit. Une humeur viſqueuſe qui enduit extérieurement tout l'inſtrument, eſt très-propre encore à retenir les Vermiſſeaux qu'il vient à toucher.

Il n'arrive pas toujours néanmoins que notre petit galérien pourvoie à ſa ſubſiſtance avec autant de peine & de labeur que lorſqu'il eſt forcé de la chercher ſous la dure écorce des Arbres : nous avons vu que les Fourmis marchent à la file dans des ſentiers qu'elles ont elles-mêmes tracés & qui ſe rendent tous à la fourmiliere : (Part. XI, Chap. XXII.) le Pic ruſé attend les Fourmis au paſſage, couche ſa longue langue dans le ſentier, & quand il la ſent bien chargée de proies, il la retire & les avale. Mais lorſque le mauvais temps retient les Fourmis dans leur domicile, le Pic s'y prend d'une autre maniere : il va ſe camper ſur la fourmiliere, y fait une grande breche avec ſon bec & ſes pieds, & y dévore bien à l'aiſe les Fourmis & leurs Nymphes.

Le Pic niche dans des trous d'Arbres, qu'il élargit & approfondit à grands coups de bec. Le Male & la Femelle s'entr'aident dans ce rude travail, & à peine les Petits ſont-ils en état de marcher, qu'on les voit grimper comme des Rats le long des Arbres.

cartilagineux & deux pieds ! Un nid de Pinſon ou de Chardonneret nous occuperoit des heures entieres. Nous chercherions dans quel lieu le Chardonneret a pu ſe fournir de ce coton ſi fin, ſi ſoyeux, ſi doux, qui tapiſſe l'intérieur de ſon joli nid, & qui en fait un lit ſi mollet & ſi chaud. Après bien des recherches, nous découvririons enfin, qu'en enveloppant d'un coton très-fin les graines de certains Saules, la Nature a préparé au Chardonneret le duvet qu'il emploie avec tant d'art. Nous ne nous laſſerions point de conſidérer l'eſpece de broderie dont le Pinſon orne ſi agréablement les dehors de ſon nid, & en la regardant de près, nous reconnoîtrions qu'elle eſt dûe à une infinité de petits Lychens, liés artiſtement les uns aux autres, diſtribués & appliqués avec la plus grande propreté ſur toute la ſurface du nid. La couleur de ces Lychens qui eſt ſouvent celle de l'écorce de l'Arbre ſur lequel le nid eſt aſſis, nous apprendroit que le Pinſon ſemble avoir voulu que l'on confondît ſon nid avec la branche qui le porte (5).

(5) †† De tous les Oiſeaux Architectes qui habitent nos Contrées, il n'en eſt point, au jugement de Mr. de BUFFON, qui bâtiſſent avec autant d'adreſſe, de propreté & d'élégance, que le Chardonneret & le Pinſon. Je m'étois donc rencontré avec ce grand Naturaliſte, lorſque je leur avois donné dans mon Texte la préférence ſur beaucoup d'autres Oiſeaux des

Nous

Nous obſerverions d'autres Eſpeces qui ſe nichent dans les trous des Arbres, dans les fentes

mêmes Contrées, auxquels la Nature a enſeigné l'art de bâtir. Je fus ſur-tout frappé des talens du Chardonneret & du Pinſon lorſqu'au Printemps de 1746 j'entrepris de faire une petite collection des nids des Oiſeaux de nos Campagnes. En comparant les nids de nos deux petits Architectes avec ceux de pluſieurs de leurs Émules, la ſupériorité me parut bien décidée en faveur des premiers, ſoit que je les conſidéraſſe dans le rapport au choix & à l'emploi induſtrieux des matériaux, ſoit que je les conſidéraſſe relativement à la forme, au contour & aux proportions. Je vis des nids de Chardonneret, conſtruits ſur les plus petites proportions, dont les contours étoient ſi exactement circulaires, qu'ils ſembloient tracés au compas, & dont l'extérieur & l'intérieur étoient formés de matériaux ſi proprement & ſi artiſtement arrangés, que je ne pouvois me laſſer de les admirer. Une mouſſe fine, de petits Lychens, de menues racines, de petites feuilles, de la bourre de Chardons, entrelacés fort adroitement, revêtoient tout l'extérieur de ces jolis nids: l'intérieur, qui repréſentoit une demi-ſphere creuſe, étoit garni de crin & d'un duvet cotonneux très-fin, très-ſerré & très-mollet.

Le Roitelet, le Pouillot & le Troglodyte, qui ſont au nombre des plus petits Oiſeaux de notre Europe, donnent tous trois à leurs nids la forme d'une boule creuſe, comme pour concentrer mieux la chaleur pendant l'incubation. C'eſt ſur un des côtés de la boule qu'eſt pratiquée l'ouverture du nid. Les dehors de celui du Roitelet ſont tiſſus de mouſſe fine & de toiles d'Araignée, & au-dedans il eſt garni du duvet le plus fin & le plus doux. Il en eſt à-peu-près de même de la conſtruction du nid du Pouillot. Mais le Troglodyte qui ſemble bâtir avec moins d'art & de propreté, n'en réuſſit que mieux à dérober ſon nid aux regards des curieux: il en enveloppe tout l'extérieur d'un

des rochers, dans des cavités qu'elles creuſent ſous terre : nous en verrions qui travaillent en bois, d'autres en maçonnerie. L'Hirondelle nous offriroit un exemple familier de ces dernieres : nous verrions avec plaiſir comment elle prépare ſon mortier, comment elle le détrempe, & l'emploi induſtrieux qu'elle ſait en faire pour donner

amas informe de mouſſe, qui ſemble ſe trouver là par haſard, & ſous lequel on ne s'aviſe pas de le chercher.

La Méſange, qui eſt encore un très-petit Oiſeau, ne montre pas moins d'induſtrie dans la conſtruction de ſon nid. Elle l'établit dans un trou d'Arbre, dont elle a ſoin d'arrondir, de polir & de façonner avec ſon bec tout l'intérieur.

Mais, puiſque je touche aux Méſanges, je dirai un mot d'une Méſange du Cap de Bonne-Eſpérance, qui offre un procédé bien remarquable. Elle conſtruit ſon nid avec des matieres cotonneuſes, & le place dans les buiſſons les plus épais. Sa forme imite celle d'une bouteille dont le col ſeroit étroit. A l'extérieur du nid & ſur un de ſes côtés, l'Oiſeau pratique un petit enfoncement en maniere de logette où le Mâle ſe retire pendant que la Femelle couve.

Quand celle-ci ſort du nid, le Mâle qui l'accompagne frappe avec force de ſes aîles ſur les côtés du nid : par ces coups réitérés, il force les bords de l'ouverture à ſe rapprocher de plus en plus & à fermer l'entré du logement : précaution ingénieuſe par laquelle l'Oiſeau pourvoit à la conſervation de ſa Famille. Mais nous verrons bientôt d'autres Méſanges dont l'induſtrie en ce genre & les précautions ſe font bien plus admirer encore. On n'eſt embarraſſé que du choix quand on traite des procédés des Oiſeaux, tant ce ſujet eſt riche & fécond.

à ſon petit édifice toute la ſolidité qui lui eſt néceſſaire (6).

(6) †† La Pie, qui a beaucoup de tendreſſe pour ſes Petits, & qui paroît ſavoir qu'ils ſont fort menacés par les Oiſeaux de proie, met beaucoup d'art & de compoſition dans la conſtruction de ſon nid, & ſemble multiplier les précautions en raiſon de ſa tendreſſe & des dangers que courent ſes Nourriſſons. Elle l'aſſied ordinairement au ſommet des plus grands Arbres, & ne néglige rien pour l'aſſurer & lui donner la plus grande ſolidité. Le Male aide la Femelle dans ce travail. La Pie fortifie tout l'extérieur de l'édifice avec des buchettes & un mortier de terre gâchée, ſemblable à celui qu'emploie l'Hirondelle; & elle lui donne une ſorte d'enveloppe à claire voie, qui le recouvre en entier, dans la fabrique de laquelle elle fait entrer de petites branches épineuſes entrelacées les unes dans les autres: elle a encore l'attention de ne pratiquer l'ouverture que dans le côté du nid le mieux défendu & le moins acceſſible. Au-dedans l'induſtrieuſe Pie place une eſpece de matelas de figure arrondie, & ſur lequel les Petits repoſent mollement & chaudement. Tout cela fait un aſſez grand édifice; car il a au moins deux pieds en tout ſens.

Le Moineau, dont le cri perçant, monotone & ſans ceſſe répété eſt ſi déplaiſant à nos oreilles, & qui par ſa pullulation & ſa gourmandiſe cauſe ſouvent de ſi grands dégâts dans nos maiſons & dans nos champs, peut néanmoins nous intéreſſer par ſa fineſſe, ſes ruſes & ſon induſtrie. Quoique groſſiérement pétulant, il ne donne point en étourdi dans les pieges qu'on lui tend; il les reconnoît facilement, ſait les éviter & laſſe ſouvent la patience de l'Oiſeleur. Ce n'eſt guere que dans la mauvaiſe ſaiſon, que preſſé par la faim, il relâche de ſes précautions & ſe laiſſe ſurprendre. Infatigable dans le travail autant qu'induſtrieux, il ſe conſtruit en moins de deux jours un très-grand nid, en maniere de poche ou de ſac. Il l'établit pour l'ordinaire au ſommet des Arbres, en revêt tout l'extérieur

Mais les nids qui nous frapperoient le plus, ſeroient ceux que certains Oiſeaux des Indes ſuſpendent habilement à des btanches d'Arbres, pour ſe garantir des inſultes de divers Animaux. Nous nous aſſurerions qu'on a fort exagéré ici le merveilleux lorſqu'on a dit, qu'il y avoit de ſemblables nids à deux appartemens, l'un pour

de foin ou de paille, & en garnit l'intérieur de plumes; & ſi on le détruit, en vingt-quatre heures il en conſtruit un autre. Mais je n'ai pas dit encore ce que ce nid offre de plus curieux: pour en mettre l'intérieur à l'abri de la pluie, le prudent & adroit Moineau le recouvre d'une calotte, au-deſſous de laquelle il pratique une porte pour l'entrée & la ſortie. Mais ce qui fait le plus d'honneur à l'inſtinct du Moineau, & qui eſt aſſurément bien remarquable, c'eſt que lorſqu'il bâtit ſon nid ſous les tuiles ou ſous les entablemens des édifices, il ſe diſpenſe des frais de la calotte, qui ſeroit dans ce cas très-ſuperflue.

Le Todier, dont le genre ſe rapproche beaucoup de celui du Martin-pêcheur, nous fournit un exemple des Oiſeaux qui nichent dans la terre. Il la creuſe avec ſon bec & ſes pattes; il y fait une excavation qui va en s'évaſant dans le fond; & là il amaſſe de petites pailles, de la mouſſe, du coton & des plumes qu'il arrange avec art, en plaçant à l'extérieur les matieres les plus groſſieres, & à l'intérieur, les plus fines & les plus molles.

Le Motteux ou Cul-blanc niche, comme le Todier, ſous terre; mais d'une maniere différente, & avec des précautions que le Todier n'eſt pas obligé de prendre. C'eſt ſous une motte de terre que le Motteux établit ordinairement ſon nid: il le conſtruit de mouſſe & de menues herbes, & il en garnit l'intérieur de plumes, de laine ou de coton: mais il y ajoute une ſorte d'auvent ou d'abri qu'il aſſujettit à la motte ſous laquelle il repoſe.

le Mâle, l'autre pour la Femelle. En examinant la choſe de plus près, avec les yeux d'un Obſervateur, nous trouverions que ce prétendu appartement du Mâle, n'eſt qu'un vieux nid, le nid de l'année précédente (7), auquel l'Oiſeau a jugé plus commode ou plus expéditif d'en ajouter un autre que d'en faire un nouveau en entier.

CHAPITRE XXIX.

Continuation du même ſujet.

†† CES Oiſeaux, auſſi prudens qu'induſtrieux, qui ſuſpendent leur nid aux branches des Arbres, & qui lui donnent des formes & des proportions ſi différentes de celles des nids les plus connus, ſemblent avoir bien plus de droit à notre admiration que la plupart des autres Oiſeaux qui naiſſent Architectes. Il y a bien des Eſpeces (1) de ces Oiſeaux, auxquelles

(7) †† Ceci m'avoit été communiqué par Mr. de REAUMUR.

(1) Parmi ces Eſpeces il en eſt pluſieurs qui appartiennent au Nouveau Monde; de ce nombre ſont le Troupiale, le Caſſique, le Carouge, le Guit-guit, &c. Le Troupiale ſuſpend ſon nid à l'extrémité des plus hautes branches, & le laiſſe flotter au gré des vents; enſorte que les Petits y ſont continuellemen

la Nature a enſeigné l'art ingénieux de ſuſpendre leur nid pour ſouſtraire leur couvée à la dent meurtriere de quantité d'Animaux voraces : nous ne les parcourrons pas toutes ; mais nous nous arrêterons quelques momens à celles dont l'induſtrie ſe fait le plus admirer.

APPROCHONS-NOUS de ce ruiſſeau peuplé

bercés. La forme de ce nid eſt cylindrique. Celui du Caſſique reſſemble à une cucurbite. Il a juſqu'à dix-huit pouces de longueur ; mais la cavité n'en a guere que douze. La partie ſupérieure eſt pleine : elle n'eſt proprement qu'un cordon qui ſert à ſuſpendre le nid. De longs filamens qu'on prendroit pour des crins, & qui ſont adroitement entrelacés avec des feuilles de Plantes graminacées, compoſent le tiſſu du nid. Les Caſſiques nichent en ſociété, & on a vu juſqu'à quatre cents de leurs nids ſuſpendus aux branches du même Arbre. Le Carouge donne à ſon nid la forme d'une bourſe ; & ce qui le diſtingue beaucoup des nids précédens, ce ſont des ſéparations qui le partagent en différentes chambres appropriées à différentes nichées. Le Guit-guit, du genre des Grimperaux, & qui n'eſt pas moins remarquable par ſes belles couleurs que par ſon induſtrie, met beaucoup d'art dans la conſtruction de ſon logement. Il lui donne la forme d'une cornue, & c'eſt par ſa baſe que la cornue eſt ſuſpendue à l'extrémité d'une branche ſouple & mobile. Le col de la cornue, qui eſt à-peu-près droit & de la longueur d'un pied, regarde donc la terre. A ſon extrémité eſt l'ouverture qui permet à la Mere d'entrer & de ſortir pour ſatisfaire aux beſoins de ſa Famille. Elle grimpe le long du col de la cornue, & s'introduit dans le ventre où ſe trouve le nid proprement dit. La Mere & ſes Petits y ſont ainſi à l'abri des inſultes des Animaux mal-faiſans.

d'une multitude d'Inſectes : voyez cette ſorte de bourſe ſuſpendue par un cordon à cette branche qui s'incline ſur l'eau : c'eſt le nid d'une Eſpece de Méſange (2) qui ſavoit que ſes Petits trouveroient là une nourriture abondante. Remarquez que la bourſe eſt exactement fermée par le haut, mais qu'elle a une ouverture ſur le côté qui regarde la ſurface de l'eau : elle n'eſt point un ſimple trou rond ; ſes contours ſont façonnés en maniere de rebord un peu ſaillant ou de tuyau court. Mais examinons de plus près l'ouvrage de notre adroite Méſange ; il gagnera beaucoup à être mieux connu. Obſervez, je vous prie, avec quel art le nid eſt ſuſpendu. De longs filamens d'écorce, raſſemblés en forme d'écheveau, compoſent une ſorte de cordon que l'Oiſeau a ſu entortiller autour de la branche ſouple & mobile qui devoit porter le nid. Conſidérez attentivement l'extérieur de ce nid : vous n'êtes pas ſurpris de le trouver revêtu de menues racines, & de filamens plus ou moins groſſiers : vous avez fait la même obſervation ſur les nids les plus communs, & vous avez toujours remarqué que les Oiſeaux revêtent l'extérieur de leur édifice des matériaux les plus bruts ; tandis qu'ils placent les plus fins à l'in-

(2) Cette Méſange eſt le Remiz, aſſez commun en différentes Contrées de l'Europe, & particuliérement en Pologne.

térieur. Mais écartons la groſſiere enveloppe qui recouvre le nid que nous avons actuellement ſous les yeux : qu'appercevez-vous ? un tiſſu épais & ſerré, aſſez ſemblable à un drap ou à un feutre : vous êtes dans l'étonnement & vous avez peine à comprendre qu'une pareille étoffe ait pu être fabriquée par un Oiſeau ; car vous n'aviez point vu encore d'Oiſeau qui eût le talent d'ouvrer les matieres qu'il emploie dans ſon travail. L'art de notre Méſange vous paroît donc auſſi nouveau que recherché ; & vous tâchez de découvrir la ſorte de matiere qu'elle fait entrer dans la fabrique de ſon drap : vous vous aſſurez bientôt qu'elle n'eſt autre choſe que ce duvet fin & léger qui enveloppe les graines de diverſes Plantes qui croiſſent dans le voiſinage des eaux. Viſitez à préſent l'intérieur du nid, & vous verrez que c'eſt encore de ce même duvet qu'il eſt entiérement tapiſſé : mais prenez garde que la Méſange ne lui a point donné la forme d'un tiſſu ſerré : il n'auroit été ni aſſez mol ni aſſez chaud : elle l'a laiſſé tel qu'elle l'a recueilli, & s'eſt contentée d'en former un lit plus ou moins épais, ſur lequel ſes nourriſſons repoſent mollement & chaudement. Le nid eſt une eſpece de branle ou de hamac où ils ſont bercés doucement, & où ils ſont toujours à portée des nourritures qui leur conviennent.

VOYEZ cet autre nid preſqu'auſſi gros qu'un œuf d'Autruche, & qui en a aſſez la forme : ſon grand axe a environ ſix pouces, & le petit, trois à quatre. Il eſt ſuſpendu à la bifurcation d'une branche flexible de Peuplier. C'eſt encore l'ouvrage d'une petite Méſange (3), non moins induſtrieuſe que celle dont vous venez d'admirer le travail. Donnez votre attention à la maniere dont le nid eſt ſuſpendu : remarquez que pour le ſuſpendre plus ſolidement, la Méſange a entouré la branche d'un ruban de laine ſur une longueur de ſept à huit pouces. Comme la Méſange précédente, elle a fait entrer dans la conſtruction de l'édifice, de menus filamens, de petites racines & le duvet cotonneux de diverſes Plantes. Elle a pratiqué de même ſur le côté du logement une petite porte ronde ; & au lieu de ce rebord en maniere de tuyau, que vous avez obſervé dans l'autre nid, vous voyez ici une ſorte d'auvent qui ſaille au-deſſus de la porte de près de deux pouces, & qui, en même temps qu'il met les Petits à l'abri des intempéries de la ſaiſon, les dérobe aux regards de leurs ennemis.

L'ART du Gros-bec d'Abyſſinie vous paroî-

(3) Cette Méſange eſt la Penduline, très-connue en Languedoc, & qui a beaucoup de rapports avec le Remiz.

troit bien plus recherché encore que celui de nos Méſanges ; je n'oſerois dire bien plus raiſonné. Il ſuſpend auſſi ſon nid aux branches des Arbres inclinées ſur l'eau ; mais ce nid, d'une toute autre ſtructure, n'eſt ni une ſimple bourſe ni une ſorte de boule creuſe ; l'habile Architecte lui donne la forme d'une pyramide, & il en partage l'intérieur en deux chambres par une cloiſon verticale. La premiere eſt une eſpece de veſtibule où ſe trouve la porte du nid, qui eſt ordinairement tournée à l'eſt. Après s'être introduit dans cette premiere chambre, l'Oiſeau grimpe le long de la cloiſon juſques vers le haut du nid ; puis il redeſcend juſqu'au fond de la ſeconde chambre qui eſt l'appartement des Petits. Vous voyez d'un coup-d'œil, que par cette ingénieuſe conſtruction la couvée eſt à l'abri de la pluie, de quelque côté que le vent ſouffle ; & vous n'ignorez pas la ſaiſon des pluies dure pluſieurs mois en Abyſſinie : mais ce n'eſt pas ſeulement contre la pluie que l'art preſque raiſonné de l'Oiſeau défend ſa Famille ; il la met encore à couvert des attaques de bien des Animaux carnaſſiers (4).

(4) Mr. de BUFFON remarque, que différentes Eſpeces de Perroquets de l'Ancien Continent ſuſpendent leur nid à l'extrémité de branches flexibles. Il eſt ordinairement tiſſu de joncs & de racines, & revêtu de plumes à l'intérieur. Mais les Per-

QUAND nous conſidérons le nid du Roi des Oiſeaux, cette aire ſi ſpacieuſe, ſi plane, ſi ſolide, formée de longues perches entrelacées de branches ſouples en maniere de claie (5), nous nous plaiſons à lui oppoſer auſſi-tôt le joli petit nid du Chardonneret, ſi bien arrondi & ſi bien façonné en maniere de demi-ſphere creuſe, & mieux encore le nid ſphérique du Roitelet, qui n'eſt compoſé que de mouſſe fine, de toile d'Araignée & d'un duvet léger (6). Mais le Roitelet eſt preſque un gros Oiſeau en comparaiſon de ce merveilleux Oiſeau de l'Amérique, qui n'eſt guere plus gros qu'une Abeille, & qui en a pris le nom d'*Oiſeau-mouche*. Cette charmante miniature, ce petit Etre tout aérien, auſſi élégant par ſa forme que brillant par ſes couleurs, eſt un vrai bijou de la Nature, & l'on diroit qu'elle ait épuiſé ſon art dans cet admirable Chef-d'œuvre. L'émeraude, la topaſe, le rubis éclatent ſur ſon plumage demi-tranſparent, & il n'eſt point de Mouche ni de Papillon qui ſoit plus richement vêtu. Il ſemble même ſe

roquets du Nouveau Monde ne nichent pas d'une maniere auſſi induſtrieuſe : ils s'établiſſent dans des creux d'Arbres, qu'ils agrandiſſent avec leur bec & qu'ils garniſſent de plumes.

(5) Voyez ci-deſſus Chap. XXVIII, Note 3.

(6) Voyez ci-deſſus Chap. XXVIII, Note 5.

rapprocher encore de ces Inſectes aîlés par ſon genre de vie : il voltige ſans ceſſe de fleur en fleur, & en pompe, comme eux, le nectar à l'aide d'une ſorte de trompe ; car ſa langue, qui ne paroît qu'un fil délié, eſt un canal formé de la réunion de deux filets creuſés en gouttiere, & qui ſemble s'acquitter des fonctions d'une vraie trompe. L'Oiſeau la darde au dehors, & probablement par une méchanique analogue à celle de la langue du Pic (7). Son bec, long, preſque droit, eſt auſſi délié qu'une fine aiguille. Ses yeux ne ſont que deux points noirs très-brillans, & ſes jambes ſont ſi courtes & ſi menues qu'il faut y regarder de près pour les appercevoir. Son vol eſt d'une rapidité ſurprenante ; il fend l'air comme un trait, & on l'entend plus qu'on ne le voit. Il ne s'arrête qu'un inſtant ſur chaque fleur, ſe poſe rarement ; & la vie toute aérienne de ce Volatile plein de feu n'eſt, en quelque ſorte, qu'un mouvement perpétuel. Qui l'imagineroit néanmoins ! ſon courage, je dirai mieux, ſon audace ne le cede point à ſa vivacité : il oſe attaquer des Oiſeaux qui ſont à ſon égard de vrais Coloſſes ; il les pourſuit avec autant d'acharnement que de fureur, ſe cramponne à leur corps, ſe laiſſe emporter par leur vol, ne

(7) Voyez ci-deſſus Chap. XXVIII, Note 6.

ceſſe de les becqueter, & ne lâche point priſe qu'il n'ait aſſouvi ſa petite rage.

Mais ce qui pique le plus la curioſité dans l'Hiſtoire de l'Oiſeau-mouche, c'eſt ſon nid : on eſt preſſé de ſavoir comment il eſt fait & s'il répond à l'extrême petiteſſe du charmant Volatile. Heureuſement que ſes Hiſtoriens nous ſatisfont très-bien ſur ce point intéreſſant. Ce nid, tout mignon, n'eſt pas plus gros que la moitié d'un abricot, & taillé de même en demi-coupe. Il eſt attaché pour l'ordinaire à un brin d'Oranger ou de Citronnier, quelquefois à un fétu qui pend du toit de quelque hutte. On ne s'étonnera pas qu'un brin d'Oranger ou un fétu puiſſe le ſoutenir, quand on ſaura qu'il ne peſe, même avec l'Oiſeau, que vingt-quatre grains. C'eſt la Femelle qui le conſtruit, & c'eſt le Mâle qui en recueille les matériaux. L'intérieur préſente un joli tiſſu ſerré, ſoyeux, épais & fort doux, ſur lequel repoſent mollement deux ou trois œufs tout blancs, & qui ont à peine la groſſeur des plus petits pois. L'extérieur eſt, en quelque ſorte, un ouvrage de marqueterie ; il eſt formé de petites lames d'écorce, artiſtement collées au nid & les unes aux autres. La Femelle emploie brin à brin l'eſpece de bourre ſoyeuſe dont elle compoſe ſon tiſſu : elle arrange ces

brins avec ſon bec & ſes pieds, polit avec ſa gorge les contours ou les bords du très-petit berceau, & ſe ſert de ſa queue pour en polir de même le dedans. Les Nourriſſons écloſent au bout de douze à treize jours : qu'on juge de leur petiteſſe par celle de leur Mere, & on croira voir de petites Mouches d'une délicateſſe extrême. A proprement parler la Mere ne leur porte pas la becquée : on veut qu'elle ſe borne à leur donner ſa langue emmiellée à ſucer.

Le Colibri, compatriote de l'Oiſeau-mouche (8), auſſi riche que lui dans ſa parure, auſſi rapide dans ſon vol, auſſi léger, auſſi vif, auſſi aérien, qui a les mêmes mœurs, les mêmes inclinations, le même genre de vie, & qui eſt taillé à-peu-près ſur le même modele, n'en differe que par des caracteres peu ſaillans & qui ne ſont faits que pour les Nomenclateurs. En général, il eſt ſeulement un peu moins petit que l'Oiſeau-mouche, & ſa taille eſt plus alongée. Mais entre les Eſpeces des Colibris l'on en connoît qui ne ſurpaſſent pas en grandeur le plus

(8) Le Colibri & l'Oiſeau Mouche ne ſe plaiſent que dans les climats les plus chauds : ils vivent entre les Tropiques. Ce ſont des Oiſeaux ſolitaires & paſſionnés pour la liberté : on ne ſauroit parvenir à élever leurs Petits ; au moins n'y a-t-on point encore réuſſi.

grand Oiſeau-mouche. On a vu le Pere & la Mere Colibris continuer à prendre ſoin de leurs Petits, quoiqu'ils euſſent été enlevés avec le nid & réduits en captivité : la tendreſſe maternelle triomphoit de leur amour exceſſif pour la liberté.

CHAPITRE XXX.

Procédés des Quadrupedes. Le Lapin

VISITERONS-NOUS les rétraites des Rats, des Mulots, des Blaireaux, des Renards, des Loutres, des Ours, &c. ? Nous entreprendrions un trop long voyage, & d'autres objets plus intéreſſans nous appellent. Bornons-nous aux procédés du Lapin & de la Marmotte, comme les plus curieux, après ceux du Caſtor (1) dont nous nous ſommes fort occupés (2).

(1) Part. XI, Chap. XXIX, XXX. †† J'ajouterai ici que le Caſtor n'eſt pas propre au Canada, comme on l'avoit cru : on le trouve auſſi en Sibérie. On peut l'apprivoiſer & le dreſſer pour la pêche.

(2) †† Nous avons viſité les curieux ſouterreins de la Taupe. (Part. XI, Chap. VII, Note 1.) Ceux du Hamſter ou Rat de bled ne ſont pas moins curieux. Ce petit Quadrupede, du genre des Souris & qui multiplie à l'excès en divers Cantons de l'Allemagne, s'établit ordinairement à trois ou quatre pieds

Le Lapin & le Lievre, ſi ſemblables dans leur extérieur & dans leur intérieur, nous appren-

ſous terre. Les terriers qu'il s'y pratique ſont proportionnés à l'âge & au ſexe de l'Animal. Les plus ſpacieux ſont ceux que ſe creuſent les vieux Mâles, & qu'ils partagent en différentes chambres, qui ſont autant de magaſins où ils renferment juſqu'à cent livres de grains de différentes ſortes. Chaque terrier a deux ouvertures ou galeries : l'une deſcend obliquement, & c'eſt celle que le Hamſter a creuſée pour pénétrer ſous terre ; l'autre, qu'il pratique de dedans en-dehors, eſt perpendiculaire. Les terriers des Femelles, bien moins ſpacieux, n'ont pour l'ordinaire qu'un ſeul magaſin, parce que les Petits ne demeurent pas aſſez long-temps avec leur Mere pour qu'il ſoit néceſſaire qu'elle amaſſe une grande quantité de proviſions. Mais elle a une attention qui fait honneur à ſon inſtinct : au lieu d'une ſeule galerie perpendiculaire pour donner entrée & ſortie à la Famille, elle en pratique ſept à huit, comme ſi elle vouloit proportionner le nombre des galeries ou des portes à celui des Petits. L'éducation de ceux-ci eſt bientôt achevée, & alors la Mere les chaſſe hors du terrier qui leur avoit ſervi de berceau. Quelquefois elle y reſte après l'expulſion des Petits : d'autres fois, elle abandonne à ſon tour le terrier pour s'en creuſer un nouveau qu'elle remplit de proviſions.

Les Hamſters ont une grande facilité à amaſſer des grains & des proviſions de toute eſpece : la Nature les a pourvus de deux bourſes qui peuvent contenir chacune une once & demie de grains, & qu'elle a placées de chaque côté de l'intérieur de la bouche. Ces bourſes ou *bajoues* ſont propres à cette eſpece de Rats. Quand le Hamſter les a remplies de grains, il retourne à ſon terrier, & y vuide ſes poches en preſſant ſes joues des deux pieds de devant. Il amaſſe auſſi la paille la plus douce, & s'en fait un lit ſur lequel il repoſe mollement pendant ſon long ſommeil.

Les Hamſters ſont de petits Animaux d'une férocité éton-

nent

nent à nous défier des reſſemblances. Ils s'accouplent fort bien l'un avec l'autre, & ne produi-

nante, & dont l'audace égale la férocité. Ils ſe jettent ſur tous les Animaux qu'ils rencontrent, & ils ne s'effraient pas plus de la grandeur du Cheval ou de celle du Bœuf, qu'ils ne redoutent l'adreſſe du Chien ou les ruſes du Chat. Incapables de ſauver leur vie en ſe retirant du combat, ils ſe battent juſqu'à extinction, mordent cruellement & ne lâchent jamais priſe. Le Chien ſe plaît à donner la chaſſe au Hamſter : dès que celui-ci le découvre, il ſe hâte de vuider ſes poches ſi par haſard elles ſont pleines de grains ; car il ne pourroit autrement ſe ſervir de ſes dents ; puis il les enfle ſi prodigieuſement que la tête & le col ſurpaſſent de beaucoup le corps en groſſeur, & ſe dreſſant ſur ſes pieds de derriere, il s'élance courageuſement ſur l'ennemi, & ce combat ſi inégal ne finit que par la mort de l'un des Combattans. Les Hamſters ne ſont pas moins cruels envers leurs ſemblables qu'envers tout autre Animal : ils ſe livrent avec fureur des combats ſinguliers où le vaincu devient toujours la pâture du vainqueur.

L'amour ſeul triomphe pour un temps du naturel féroce de ces petits Quadrupedes ; mais ce temps eſt aſſez court. Les Mâles entrent alors dans le terrier des Femelles ; les deux ſexes s'uniſſent par les liens les plus doux, & tandis que cette union ſubſiſte, ils ſe ſoulagent réciproquement dans leurs beſoins & ſe défendent l'un l'autre contre leurs ennemis. La tendreſſe conjugale paroît même l'emporter chez ces Animaux ſur la tendreſſe maternelle : la Femelle combat avec courage pour ſon Mari, & ne combat pas pour ſes Enfans. Mais, lorſque la ſaiſon des amours eſt paſſée, les Hamſters reprennent leur férocité naturelle ; & ſi un Mâle & une Femelle qui avoient vécu dans la plus étroite & la plus tendre union, viennent enſuite à ſe rencontrer, ils ne manquent point de ſe livrer à pluſieurs reprîſes un furieux combat, dont la durée eſt d'autant plus longue que leurs forces ſont plus égales.

Il eſt heureux pour le Cultivateur que les Hamſters ſe dévorent les uns les autres; car leur exceſſive pullulation mettroit en péril toutes les récoltes. Dans certaines Contrées de l'Allemagne où le Magiſtrat met leur tête à prix, il y a eu des années qui ont coûté la vie à plus de quatre-vingt mille de ces Animaux deſtructeurs.

Vers le milieu ou la fin de l'Automne, nos Rats de bled ſe retirent dans leurs ſouterreins : ils en bouchent ſoigneuſement les ouvertures & vivent des proviſions qu'ils ont amaſſées pendant la belle ſaiſon. Ils n'en conſument avant l'Hiver qu'une petite partie, & ne conſument le reſte qu'au retour du Printemps. Pendant tout l'Hiver ils demeurent engourdis comme les Loirs & les Marmottes. L'eſpece de léthargie où ils tombent à cette époque de leur vie eſt ſi profonde, qu'elle differe peu d'une véritable mort. Tous leurs membres ſont d'une roideur extrême, leur corps paroît auſſi froid que la glace, & le cœur qui, dans la belle ſaiſon, bat cent ſoixante ou cent quatre-vingt fois par minute, ne bat plus alors que quinze fois. L'intérieur de l'Animal eſt auſſi froid que ſon extérieur, & les inteſtins, ces viſceres ſi irritables, ſtimulés par la puiſſante action de l'huile de vitriol, ne donnent pas le plus léger ſigne d'irritabilité : opération bien cruelle, & qui pourtant ne peut retirer l'Animal de ſa léthargie. Cet état ſingulier a bien de l'analogie avec celui de ces Inſectes qui, quoique deſſéchés depuis long-temps, ne laiſſent pas de conſerver un principe de vie. (Part. IX, Chap. II, Note 13.) Qu'on ne croie pas néanmoins que c'eſt uniquement le froid qui réduit les Hamſters à cet état ſingulier de mort apparente : expoſés en plein air à la gelée, ils ne s'engourdiſſent point; mais ils s'engourdiſſent au bout d'un certain temps, ſi on les renferme dans un lieu auſſi froid & où l'air n'ait point d'accès. C'eſt un ſpectacle intéreſſant que celui qu'offre le réveil d'un Hamſter. On voit ſes membres perdre peu-à-peu de leur roideur : bientôt ils ſe donnent quelque mouvement : l'Animal reſpire profondément & par de longs intervalles : il bâille à pluſieurs repriſes & fait entendre des ſons déplaiſans. Il ouvre enfin les yeux : ſon corps qui étoit replié ſur lui-même,

ſe déploie : il tâche de ſe mettre ſur ſes pieds : mais tous ſes mouvemens ſont peu aſſurés, & ne reſſemblent pas mal à ceux d'un Homme ivre. Il ſemble s'eſſayer à marcher : il y parvient en réitérant ſes eſſais, & bientôt il reprend avec ſes allures naturelles ſa premiere férocité. On peut endormir & réveiller à volonté le Hamſter, comme l'on peut deſſécher & reſſuſciter à volonté le Rotifere.

Les Mulots n'entendent pas moins bien que les Hamſters à faire de grands amas de graines & d'autres proviſions ; mais leurs terriers ne ſont ni auſſi profonds ni auſſi ſpacieux que ceux des Hamſters. Les terriers des Mulots ne vont guere qu'à douze ou quinze pouces ſous terre. Le plus ſouvent ils ſont partagés en deux loges ; la Mere & ſes Petits habitent dans l'une, & l'autre eſt le magaſin des proviſions. Il n'eſt pas rare de trouver dans ce magaſin juſqu'à un boiſſeau de glands, de noiſettes ou d'autres graines. Après avoir charié pendant l'Été & l'Automne ces différentes proviſions, & les avoir entaſſées dans leurs ſouterreins, les Mulots y jouiſſent en paix du fruit de leurs travaux : ils s'y retirent à l'entrée de l'Hiver, & comme ils ne s'engourdiſſent point alors, ils ne ceſſent point de manger & de profiter des proviſions qui abondent autour d'eux. Mais ſi elles viennent à leur manquer, ils ſe jettent impitoyablement les uns ſur les autres, & les gros dévorent les petits. Les Mulots, comme tous les autres Rats, multiplient au point de devenir ſouvent bien redoutables : ils mettent bas pluſieurs fois l'année, & leurs portées ſont toujours très-nombreuſes.

Le Blaireau, qui fuit la lumiere, paſſe la plus grande partie de ſa vie dans l'obſcurité d'un bois ou d'un terrier. Les galeries qu'il ſe creuſe ſous terre ſont profondes ou tortueuſes. Elles lui étoient bien néceſſaires ; car comme il ne peut courir bien vîte, il ne ſauroit échapper à ſes ennemis qu'en s'y retirant. Si on le force à déloger, il ſe creuſe à peu de diſtance un nouveau terrier. Ses jambes de devant ont une conformation & des proportions qui lui donnent une grande facilité à percer la terre, & cet Animal eſt un très-habile Mineur. Lorſque la Femelle eſt ſur le point de mettre bas, elle coupe l'herbe, la lie

ſent rien. Ce ſont deux Eſpeces très-diſtinctes, malgré toutes leurs affinités (3).

en botte, & la traîne juſqu'au fond de ſon terrier, où elle en fait un lit commode pour elle & ſes Petits. Quand ceux-ci ont pris un certain accroiſſement, elle leur apporte de petites proies, des Lapereaux, des Mulots, des Reptiles, &c.

Le Renard, moins habile Mineur que le Blaireau, profite ſouvent du terrier de celui-ci, ou des ſouterreins pratiqués par d'autres Animaux : il ſait ſe les approprier & les agrandir au beſoin.

La Loutre, qui ſait ſi bien faire la guerre aux Poiſſons, ne ſe creuſe point de domicile ; mais elle profite habilement des cavités qu'elle rencontre, ſoit dans les racines des vieux Arbres, ſoit dans les fentes des rochers. Ce qu'on avoit débité ſur le logement qu'elle ſe pratique & le plancher qu'elle y conſtruit, eſt purement fabuleux. La Femelle prépare un lit à ſes Petits, qu'elle garnit d'herbes, de racines ou de buchettes.

L'Ours, auſſi ſolitaire que ſauvage, ſe retire pendant l'Hiver dans des grottes profondes, au ſein des rochers les plus inacceſſibles, ou dans de vieux troncs d'Arbres au milieu d'une épaiſſe forêt. Il ne fait point de proviſions : il n'en a aucun beſoin : il porte dans ſon intérieur la nourriture qui le fait ſubſiſter pendant la mauvaiſe ſaiſon : la graiſſe qui ſurabonde chez lui à la fin de l'Automne, rentre dans le ſang & le ſuſtente pendant ſon long ſommeil qui n'eſt point léthargique.

(3) †† Un Naturaliſte Anglois, Mr. BARRINGTON, voudroit que Mr. de BUFFON eût indiqué l'âge des Lapins & des Lievres qu'il avoit renfermés enſemble pour s'aſſurer s'ils peuvent s'unir & produire. L'Obſervateur Anglois remarque avec raiſon, que l'âge doit beaucoup influer ſur les réſultats de ces ſortes d'aſſociations. L'Obſervateur François avoit décidé ſur ſes premieres expériences, que le Chien & la Louve ne peuvent procréer enſemble : les Individus qu'il avoit tâché d'aſſocier étoient apparemment trop jeunes, puiſque la même tentative a

Il y a plus ; le Lievre imbécille ſe contente du gîte qu'il ſe pratique à la ſurface de la terre (4) : le Lapin, plus induſtrieux, perce la terre & s'y procure un aſyle aſſuré. Le Mâle & la Femelle vivent enſemble dans cette retraite paiſible : ils y élevent leur petite Famille, ſans craindre le Renard ni l'Oiſeau de proie. Inconnus au reſte du Monde, ils paſſent des jours heureux & tranquilles, & goûtent dans les douceurs domeſtiques les plaiſirs les plus touchans de la vie.

Le Lievre pourroit auſſi creuſer la terre, & ne la creuſe point. Le Lapin clapier (5) ne la creuſe point non plus. Il n'en a pas beſoin : ſon domicile eſt tout fait : il ſe conduit comme s'il le ſavoit. Le Lapin *de garenne* ſemble ſavoir qu'il n'eſt pas logé, & il ſe loge. Les Lapins clapiers

bien réuſſi depuis à d'autres Curieux. Il pourroit en être de même du Chien & du Renard, du Lapin & du Lievre.

(4) Il y a lieu de penſer que les Lievres de toutes les Contrées ne ſe bornent pas à ſe faire un gîte à la ſurface de la terre, & qu'il en eſt qui, comme les Lapins, ſavent ſe creuſer des terriers : c'eſt ce qu'on a déja découvert chez les Lievres des Pyrénées, au rapport de Mr. de Buffon lui-même, dont j'extraiſois ce que je diſois dans ce Chapitre du Lievre & du Lapin.

(5) Le Lapin domeſtique.

dont on peuple les garennes, ſe gîtent comme le Lievre : mais au bout de quelques générations, ils commencent à ſe faire des terriers. Les inſultes de leurs Ennemis, les injures de l'air, & les divers inconvéniens attachés à la vie errante, les inſtruiroient-ils de la néceſſité de ſe pratiquer des retraites ſouterreines ? Mais, appercevoir les rapports de ces retraites à leur propre conſervation, juger qu'elles les mettront à l'abri de tous les inconvéniens qu'ils éprouvent, c'eſt une opération de l'Ame, qui eſt bien voiſine de la réflexion, ſi elle n'eſt la réflexion même. Et comment accorder la réflexion à des Brutes ? Ne ſeroit-il pas plus philoſophique de ſuppoſer que le genre de vie des Lapins clapiers affoiblit & détériore un peu leur tempérament, relâche leurs organes, & leur ôte la force de creuſer la terre ? Le plein air rétablit en eux la Nature, & leur rend la vigueur propre à l'Eſpece : mais ce rétabliſſement exige un temps plus ou moins long ; & ce n'eſt qu'après un certain nombre de générations qu'il eſt complet. Une Famille de Sauvages élevée dans nos demeures, y dégénéreroit bientôt, & la ſeconde génération ne pourroit ſoutenir les travaux pénibles, & la vie dure des Ayeux, &c.

LORSQUE la Lapine eſt près de mettre bas,

elle ſe creuſe un nouveau terrier. C'eſt un boyau tortueux ou pratiqué en zig-zag. Au fond de ce boyau elle ménage une grande cavité, qu'elle tapiſſe de ſes propres poils. Voilà un lit très-mol qu'elle prépare à ſes Petits. Elle ne les quitte point les premiers jours ; elle ne ſort enſuite que pour prendre de la nourriture. Le Pere ne connoît point encore ſa Famille : il n'oſeroit entrer dans le terrier. Quand la Mere va aux champs, elle pouſſe ſouvent la précaution juſqu'à boucher l'entrée du terrier avec de la terre détrempée de ſon urine. Devenus un peu plus grands, les Laperaux commencent à brouter l'herbe tendre. Le Pere les reconnoît alors, les prend entre ſes pattes, leur leche les yeux, leur luſtre le poil, & partage ſes careſſes & ſes ſoins également entre tous.

Des obſervations qui paroiſſent exactes, prouvent que la paternité eſt fort reſpectée chez les Lapins. L'Ayeul demeure le Chef de toute la nombreuſe Famille, & il ſemble la gouverner en Patriarche.

CHAPITRE XXXI.

La Marmotte.

LES gentillesses de la Marmotte sont connues de tout le monde. L'on sait qu'elle s'apprivoise facilement, & qu'on la dresse à danser & à gesticuler sur un bâton. Ce qui n'est pas si généralement connu, ce sont ses procédés ingénieux dans les hautes Alpes, où elle fait sa demeure, au milieu des neiges & des frimats.

VERS le mois d'Octobre, elle entre en quartier d'Hiver & se renferme pour ne plus sortir. Sa retraite mérite d'être observée. Elle est faite avec un art & des précautions qui sembleroient partir d'une sorte d'intelligence, si l'intelligence ne combinoit & ne varioit sans cesse ses plans. Sur le penchant d'une Montagne, l'industrieuse Marmotte établit son domicile. C'est une grande galerie, creusée sous terre & faite en maniere d'Y. Ces deux branches qui ont chacune une ouverture, aboutissent à une espece de cul-de-sac. Là, est l'appartement de la Marmotte. Une des branches descend au-dessous de l'appartement, en suivant la pente de la Montagne; elle est une

ſorte d'Aqueduc qui reçoit & charie les excrémens & les immondices. L'autre branche, qui s'éleve au-deſſus du domicile, ſert d'avenue & de ſortie (1). L'appartement eſt la ſeule partie de la galerie qui ſoit horizontale. Il eſt tapiſſé d'une épaiſſe couche de Mouſſe & de foin. Il eſt ſûr que les Marmottes ſont ſociables, & qu'elles travaillent en commun à ſe loger. Elles font pendant l'Eté d'amples proviſion de mouſſe & de foin. Les unes, à ce qu'on dit, fauchent l'Herbe, d'autres la recueillent, & tour-à-tour elles ſervent de char pour la voiturer au gîte. Une des Marmottes ſe couche ſur le dos, dreſſe ſes pattes pour tenir lieu de ridelles, ſe laiſſe charger de foin & traîner par les autres, qui la tirent par la queue, & prennent garde que le char ne verſe ſur la route. Leurs pieds ſont armés de griffes, qui leur donnent une grande facilité de creuſer la terre, & elles le font avec une célérité merveilleuſe. A meſure qu'elles excavent, elles jettent derriere elles la terre qu'elles tirent de la mine. Elles paſſent la plus grande partie de leur vie dans leur habitation; elles s'y retirent pendant la pluie ou à l'approche de l'orage, ou à la vue de quelque danger. Elles n'en ſortent guere que dans les beaux jours, &

(1) Lorſque la ſaiſon devient rude, les Marmottes ont ſoin de fermer exactement les ouvertures de leur terrier.

ne s'en éloignent que peu. Tandis que les unes jouent ſur le gazon, les autres s'occupent à le couper, & d'autres ſont en ſentinelle ſur des lieux élevés, pour avertir par un coup de ſifflet les Fourageurs de l'approche de l'Ennemi (2††).

PENDANT l'Hiver, les Marmottes ne mangent point & ne peuvent manger. Le froid les engourdit, ſuſpend ou diminue beaucoup la tranſpiration & les autres excrétions. La graiſſe dont leur ventre eſt très-fourni, paſſe dans le ſang & le répare. On diroit qu'elles prévoient leur léthargie, & qu'elles ſavent qu'elles n'auront alors nul beſoin de nourriture; car elles ne s'aviſent point d'amaſſer des proviſions de bouche, comme elles amaſſent des matériaux pour en revêtir l'in-

(2) †† Les Naturaliſtes racontent la même choſe des Lions-marins, eſpeces de Phoques de la plus grande taille. La couche énorme de graiſſe dont tout leur corps eſt enveloppé, & qui a un pied d'épaiſſeur, les rends lourds, peſans & grands dormeurs: mais ils prennent, dit-on, la précaution de placer des Sentinelles autour du lieu où ils repoſent, & qui ont grand ſoin de les éveiller à l'approche du danger. Cela ſe réduit, ſans doute, à ce que tous ces Phoques ne s'endorment pas à la fois: ceux qui veillent encore, effrayés par le danger, pouſſent des cris qui éveillent les autres. Ces cris ſont fort bruyans & reſſemblent au grognement du Cochon ou à l'henniſſement du Cheval. Ils vivent en ſociété. Les Mâles les plus puiſſans s'aſſujettiſſent pluſieurs Femelles, & empêchent les autres Mâles d'en approcher. (Voy. Part. III, Chap. XXVI, Note 2.)

térieur de leur domicile. Elles ſe conduiſent donc à cet égard comme les Fourmis (3).

(3) †† Ce n'eſt qu'à un aſſez grand degré de froid que la Marmotte s'engourdit. Mr. de REAUMUR avoit vu un de ces Animaux qui avoit conſervé toute ſon agilité à un froid de cinq degrés au-deſſous de la congelation. Il faut ſavoir gré à Mr. de BUFFON d'avoir recherché le premier la cauſe ſecrete de l'engourdiſſement de divers Animaux, tels que la Marmotte, le Hériſſon, le Loir, la Chauve-ſouris, &c. Ce point ſi intéreſſant de Phyſiologie comparée méritoit bien l'attention d'un Phyſicien de cet ordre. Il croit s'être bien aſſuré que l'eſpece de torpeur dont il s'agit, eſt due uniquement au refroidiſſement du ſang, occaſioné par le froid de l'air ambiant. Il penſe que la chaleur naturelle de ces Animaux eſt pour l'ordinaire à-peu-près égale à celle de l'athmoſphere, & qu'elle augmente ou diminue dans le rapport aux variations de température de cette derniere. Il fonde cette aſſertion ſur des expériences thermométriques, qui paroiſſent au premier coup-d'œil bien déciſives. Elles lui ont appris, que ſi à une température de dix degrés, on introduit la boule d'un petit thermometre dans l'intérieur de pluſieurs Loirs vivans, l'inſtrument indiquera à-peu-près le même degré de chaleur naturelle dans l'Animal. Mr. de BUFFON regarde donc comme des Animaux à ſang froid, tous ces Animaux qui s'engourdiſſent pendant l'Hiver. Mais Mr. SPALLANZANI, qui a répété l'expérience avec le plus grand ſoin ſur des Hériſſons, ſur des Marmottes, ſur des Chauve-ſouris, s'eſt convaincu que ces Animaux ne ſont point du tout des Animaux à ſang froid, & que leur chaleur naturelle eſt la même que celle de l'Homme. Il a vu la liqueur du thermometre s'élever à 31 degrés dans la bouche d'une Marmotte, lorſque la température de l'air extérieur étoit de 15 degrés, & ſes expériences ſur les Hériſſons & les Chauve-ſouris lui ont donné préciſément les mêmes réſultats. Mais l'habile Naturaliſte, toujours inventif, ne s'en eſt pas tenu là: il a démontré de la

maniere la plus rigoureuſe, que l'engourdiſſement en queſtion ne dépend point du tout du refroidiſſement du ſang. On ſait que les Grenouilles, les Crapauds, les Salamandres aquatiques, s'engourdiſſent auſſi pendant l'Hiver, & qu'ils deviennent alors auſſi roides que les Loirs, les Hériſſons ou les Marmottes. Mais, ce qui n'eſt pas auſſi connu, c'eſt qu'on peut ouvrir le cœur de ces Amphibies ou en couper l'aorte ſans qu'ils ceſſent de ſauter, de courir & de plonger. Mr. SPALLANZANI a ſu mettre à profit ce fait ſingulier dont il s'étoit aſſuré bien des fois par ſes propres expériences : il a évacué ainſi tout le ſang contenu dans le corps de ces Amphibies ; il les a enſuite enſevelis dans la neige : ils s'y ſont tous engourdis comme les Animaux de leur Eſpèce ; & après les avoir expoſés dans cet état à une température convenable, il les a vu reprendre le ſentiment & le mouvement. Il n'a même obſervé à cet égard aucune différence entre les Amphibies entiérement privés de ſang, & les Amphibies qui n'avoient point ſubi l'opération de la ſaignée.

Quelle eſt donc la véritable cauſe de cette étrange torpeur, de cette ſorte de léthargie plus ou moins profonde, qui ſurvient à différentes Eſpeces d'Animaux pendant la mauvaiſe ſaiſon, & qui dure des mois entiers ? Notre Obſervateur paroît avoir percé ce myſtere : il remarque, que tous les muſcles de l'Animal engourdi ſont d'une rigidité extrême : les plus puiſſans ſtimulans chymiques, l'étincelle électrique, les piquures, les inciſions y produiſent à peine quelque léger ſigne d'irritabilité. Toutes les fibres muſculaires ſont alors trop fortement contractées pour qu'elles puiſſent céder à l'action de la puiſſance vitale : cette action eſt donc ſuſpendue, & de cette ſuſpenſion naît l'engourdiſſement ou la torpeur. Au reſte, tous les Animaux ne s'engourdiſſent pas au même degré de froid : les variétés qu'on obſerve en ce genre tiennent, ſans doute, à la nature particuliere des fibres muſculaires & au degré d'énergie de la puiſſance vitale. Les Loirs, par exemple, commencent à s'engourdir dès que le thermometre deſcend au-deſſous du degré de la température ; les Crapauds, les Salamandres, &c. ne s'engourdiſſent que par un degré de froid très-voiſin de celui de la congelation.

CHAPITRE XXXII.

Du langage des Bêtes.

CE ſujet n'a pas toujours été traité aſſez philoſophiquement. Comme l'on a accordé de l'intelligence aux Bêtes, il s'en faut peu qu'on ne leur ait accordé auſſi la parole, & qu'on n'ait entrepris de nous donner leur Dictionnaire. L'on nous a traduit leurs entretiens préciſément comme les Voyageurs nous ont rendu ceux de quelques Nations ſauvages. Ici le vrai a été diſſous dans une grande quantité de faux. Eſſayons d'en faire la ſéparation.

QUAND on demande, ſi les Bêtes ont un langage, il faut diſtinguer ſoigneuſement deux ſortes de langages, le *naturel* & l'*artificiel*. Dans la premiere eſpece doivent être rangés tous les ſignes par leſquels l'Animal donne à connoître ce qui ſe paſſe dans ſon intérieur. Mais, ſi nous voulons nous borner aux ſeuls ſons, le langage naturel ſera un aſſemblage de ſons non-articulés, uniformes dans tous les Individus de la même Eſpece, & liés tellement aux ſentimens qu'ils expriment, que le même ſon ne repréſente ja-

mais deux ſentimens oppoſés. Le langage artificiel, au contraire, ſera un aſſemblage de ſons articulés & arbitraires, qui n'ont d'autre liaiſon avec les idées qu'ils repréſentent, que celle que leur donne l'inſtitution ou la convention; enſorte que le même ſon peut être ſigne d'idées très-différentes & même oppoſées (1).

(1) †† Si tout a ſa cauſe ou ſa raiſon, le langage artificiel n'a pu être arbitraire dans ſon origine. Il a fallu un motif pour que les premiers Hommes déſignaſſent un certain objet par un certain ſon articulé, & ce motif n'a pu exiſter que dans la Nature ou dans la conſtitution de l'Homme & dans ſes rapports aux divers Êtres. L'imitation eſt naturelle à l'Homme, & ſon inſtrument vocal, comme ſon inſtrument auditif, eſt ſuſceptible d'une multitude de modifications diverſes. Les premiers Hommes frappés des ſons que rendoient certains objets, imiterent ces ſons, & les ſons plus ou moins articulés que produiſit cette imitation, furent les premiers mots de la langue primitive. Plus l'imitation fut parfaite, & plus les mots furent pittoreſques ou repréſentatifs; & plus ils furent repréſentatifs, plus ils furent durables. Mais, comme l'inſtrument vocal étoit ſoumis à l'influence du climat, du genre de vie, de l'éducation, &c. il devoit naturellement en réſulter chez différentes Peuplades des variations dans l'articulation, qui modifierent plus ou moins les mots primitifs, & déguiſerent plus ou moins leur premiere origine. Les mots primitifs furent des racines fécondes qui produiſirent d'autres mots, & ces mots furent des *dérivés*, &c. Ainſi le langage artificiel fut à ſa naiſſance une peinture appropriée à l'oreille: mais dans la ſuite, par une autre imitation tout auſſi naturelle, on appropria cette peinture aux yeux, en eſquiſſant groſſiérement les principaux traits de l'objet, & cette eſquiſſe groſſiere donna naiſſance à l'écriture alphabétique, qui ſe perfectionna de plus en plus par le retranchement ſucceſſif

Le langage artificiel eſt proprement ce que nous nommons la *parole*. L'Homme eſt le ſeul Animal qui parle, & cette admirable prérogative lui donne l'empire ſur tous les Animaux. Par la parole, il regne ſur la Nature entiere, remonte à ſon Divin Auteur, le contemple, l'adore, & lui obéit. Par la parole, il ſe connoît lui-même, connoît les Etres qui l'environnent, & les tourne à ſon uſage : il peut dire *Moi*, juger de ſes relations, s'y conformer, & accroître ainſi ſon bonheur. Par la parole, il devient un Etre vraiment ſociable, & les Sociétés qu'il forme, il les gouverne par des loix qu'il crée, change ou modifie ſelon les temps, les lieux & les occurrences.

La Brute, bornée au langage naturel, ignore tout, hormis ſes beſoins & les objets qui peuvent les ſatisfaire : mais une multitude de ſenſations tient à ces beſoins divers, & toutes ou preſque toutes ont leurs ſignes naturels. L'eſpece de ces ſignes, leur nombre, leur emploi, l'ordre dans lequel ils ſe ſuccedent, la maniere dont ils ſont variés & combinés, conſtituent le génie

de différens traits de la peinture ou de l'eſquiſſe originelle. Il faut voir dans l'intéreſſante *Hiſtoire de la parole* du ſavant & eſtimable Gebelin le développement de ces idées, que je ne fais qu'ébaucher.

de la langue des différens Animaux, & fourniſſent aux Naturaliſtes une ſource intariſſable d'obſervations curieuſes, de recherches fines, de détails intéreſſans ; mais s'il veut éviter l'erreur, il ne puiſera dans cette ſource féconde, qu'à l'aide d'une ſaine Logique.

Les obſervations qui prouvent que les Bêtes ont un langage naturel, ſont en grand nombre. Nous ne ſerons embarraſſés que ſur le choix. Nous ne reſtreindrons pas ce langage aux ſons : nous y joindrons tous les ſignes par leſquels la Brute exprime ce qu'elle ſent. Il n'eſt pas beſoin d'aller bien loin pour étudier cette langue : une baſſe-cour eſt l'école où l'on peut le mieux s'en inſtruire. Prêtons donc une oreille attentive aux Animaux domeſtiques, & prenons-les pour nos Maîtres.

Suivons une Poule qui conduit des Pouſſins. A-t-elle fait quelque trouvaille ? elle les appelle pour leur en faire part : ils l'entendent & accourent auſſi-tôt. Viennent-ils à perdre de vue cette Mere chérie ? leurs cris plaintifs témoignent aſſez leurs peines & leurs beſoins.

Remarquons encore les différens cris du Coq quand il entre un Homme ou un Chien dans

la

la baſſe-cour ; ſoit quand il découvre l'Epervier ou quelqu'autre objet qui l'effraie ; ſoit enfin quand il raſſemble ſes Poules ou qu'il leur répond.

QUE veulent dire ces ſons lugubres de cette Poule-d'Inde ? Voyez ſes Petits ſe cacher & ſe tapir à l'inſtant. On les diroit morts. La Mere regarde vers le Ciel, & redouble ſes gémiſſemens. Qu'y découvre-t-elle ? un point noir que nous avons peine à démêler, & ce point noir eſt un Oiſeau de proie, qui n'a pu tromper la vigilance & la pénétration de cette Mere inſtruite de loin par la Nature. L'Ennemi diſparoît, la Poule pouſſe un cri de joie ; les alarmes ceſſent, les Petits reſſuſcitent ; & les voilà tous rendus auprès de leur Mere & à leurs plaiſirs (2).

OBSERVONS les Canards lorſqu'ils veulent aller au bain. Ne ſemble-t-il pas qu'ils en con-

(2) †† L'Hirondelle qui habite avec nous, eſt un autre exemple familier de la maniere dont les Oiſeaux varient leurs cris ſuivant leurs beſoins ou leurs circonſtances. „ Outre ſon „ chant le plus ordinaire, elle a encore, dit Mr. de MONT-„ BEILLARD, le cri d'aſſemblée, le cri de plaiſir, le cri d'ef-„ froi, le cri de colere, celui par lequel la Mere avertit ſa „ couvée des dangers qui la menacent, & beaucoup d'autres „ expreſſions compoſées de toutes celles-là : ce qui ſuppoſe une „ grande mobilité dans leur ſens intérieur ".

viennent entr'eux par des ſignes de tête réitérés, analogues à ceux que nous faiſons nous-mêmes quand nous approuvons ?

Le Chat par ſes miaulemens divers, exprime à ſon Maître ſes beſoins, à ſa Femelle, ſon amour, & à ſon Rival, ſa colere.

Ecoutez cette Chatte qui ſollicite ſes Petits à quitter le galetas où ils ont été élevés, & à deſcendre dans les offices, pour partager avec elle les avantages de ce nouveau ſéjour. Voyez-la encore jouer avec eux. Elle vient de prendre une Souris : elle les appelle ; ils accourent à ſa voix. Elle leur lâche la proie vivante, & leur apprend à s'en jouer. Quel concert dans leurs jeux ! quelle vivacité & quelle variété dans leurs mouvemens ! quelle expreſſion dans leurs geſtes, dans leurs contorſions, dans leurs attitudes ! Que d'eſprit dans tout cela ! paſſez-moi ce mot, que ma Logique a beau réprouver.

Le langage du Chien, le plus expreſſif de tous, eſt ſi varié, ſi fécond, ſi riche, qu'il fourniroit ſeul à un long Vocabulaire. Qui pourroit demeurer inſenſible à la maniere dont ce Domeſtique fidele fait éclater la joie que lui donne le retour de ſon Maître ? Il ſaute, danſe, va,

revient, retourne, circule rapidement & avec grace autour de ce Maître chéri; s'arrête tout-à-coup au milieu de ſa courſe, fixe ſur lui des regards pleins de tendreſſe, s'en approche, le leche à pluſieurs repriſes, reprend ſa courſe, diſparoît, reparoît un inſtant après pour mettre à ſes pieds quelque choſe, geſticule, aboie, conte à tout le monde ſa bonne fortune; ſa joie s'extravaſe par mille endroits & de mille façons; il ne ſe poſſede plus, il redouble ſes aboiemens; on diroit qu'il va parler: mais, quelle différence du ton qu'il prend à préſent, à celui qu'il prendra la nuit, lorſque placé en ſentinelle ſur la porte du logis, il appercevra un Voleur! quelle différence encore entre ce nouveau ton & celui dont il uſera à la vue du Loup! Suivez ce Chien à la chaſſe: quelle expreſſion dans tous ſes mouvemens, & ſur-tout dans ceux de ſa queue! Quelle ſage ardeur! quelle meſure! quelle ſagacité! quel accord avec le Chaſſeur! quel art à ſe faire entendre, à modifier à propos ſes allures, à diverſifier ſes indications! Un Lievre eſt lancé; le Chien donne de voix, & qui pourroit ſe méprendre aux ſons redoublés qu'il rend alors!

Je côtoie un bois: j'entends deux Oiſeaux qui ſe répondent l'un à l'autre. Je les vois ſe rapprocher peu-à-peu: je reconnois que ce ſont

deux Fauvettes. Après avoir ſauté quelque temps de branches en branches, je les vois ſe poſer l'un auprès de l'autre, commencer à ſe becqueter, & en venir à de petites agaceries : les careſſes redoublent : rien de plus expreſſif que tout cela, l'heureux Couple s'unit. Le Mâle gazouille tout bas ; la Femelle l'écoute & lui répond par intervalles. Ils ne doivent plus ſe ſéparer, & tous deux vont travailler de concert à conſtruire le nid qui recevra le Fruit de leurs amours. Ils l'ont conſtruit, la Femelle a pondu ; & elle couve. Le Mâle ſe tient auprès d'elle, & ſemble vouloir charmer par ſes accens l'ennui de l'incubation. Les Petits écloſent ; le Pere & la Mere pourvoient à leur éducation & les ſoignent tour-à-tour. Je les entends demander la pâture ; ils l'ont reçue ; ils ſe taiſent (3).

(3) †† Vive, gaie, légere, preſque volage, l'aimable Fauvette ne ſembleroit pas ſuſceptible d'un grand attachement, & pourtant elle eſt très-aimante ; & l'union que le Mâle & la Femelle contractent dans la ſaiſon des amours, ſubſiſte encore lorſque les Petits n'ont plus beſoin de leurs tendres ſoins. Toujours fideles l'un à l'autre, toujours empreſſés, ils ne ceſſent de ſe prodiguer réciproquement les marques de leur tendreſſe. Ils partagent également leurs peines & leurs plaiſirs, & tout eſt commun entr'eux. Le Mâle couve alternativement avec la Femelle, & partage avec elle tous les ſoins de l'éducation des Petits.

La Fauvette a bien plus de diſcernement que la Poule & bien d'autres Oiſeaux ; on ne la trompe point, comme eux, & ſi l'on tente de lui donner à couver des œufs étrangers, elle les reconnoît auſſi-tôt, les caſſe ou les rejette.

Je chaſſe à la *pipée*, & je me ſers d'une Chouette. Une Hirondelle l'apperçoit, crie & vole quelque temps autour du triſte Oiſeau, & diſparoît. Au bout d'un quart-d'heure, je vois accourir des eſcadrons d'Hirondelles, qui me forcent d'abandonner la chaſſe. La premiere Hirondelle avoit donc été ſonner le tocſin !

J'entre dans la Ville ; j'entends un Chien qui aboie avec force & preſque ſans interruption : d'autres Chiens le joignent bientôt, & tous ne ceſſent d'aboyer. Je cherche ce qui peut les ameuter ainſi : je découvre un Homme vêtu d'une ſorte d'uniforme & appuyé ſur un bâton. Cet Homme eſt un de ces Archers prépoſés par la Police pour tuer & empoiſonner les Chiens dans certains temps de l'année : ces Animaux les connoiſſent, & leur rendent guerre pour guerre.

Après le Roſſignol, la Fauvette eſt le plus grand Muſicien des bois, & nous annonce par ſa douce mélodie le réveil de la Nature & le retour des beaux jours. Elle eſt au nombre des Oiſeaux de paſſage : elle nous quitte en Automne, & revient au Printemps charmer de nouveau nos oreilles & animer nos bocages.

CHAPITRE XXXIII.

Continuation du même ſujet.

SI nous deſcendions des Eſpeces ſupérieures aux Eſpeces inférieures, & ſi nous nous arrêtions aux Inſectes, nous trouverions qu'il en eſt qui ne ſont pas mal habiles à peindre leurs petites paſſions, & à exprimer leurs plaiſirs ou leurs beſoins. Les amours des Araignées, des Demoiſelles, des Papillons nous préſenteroient bien des traits qui ne nous permettroient pas de douter que le Mâle & la Femelle n'aient une maniere de s'entendre, & même très-expreſſive. Leur manege adroit, leurs tours variés, leurs petites ruſes nous prouveroient qu'ils ne ſont point novices dans cette langue que tous les Etres ſentans poſſedent plus ou moins, & dont les ſignes ne ſont preſque jamais équivoques. Nous verrions le Mâle ſolliciter long-temps par ſes jeux, par ſes careſſes, par ſa conſtance, des faveurs qu'on ne ſembleroit d'abord lui refuſer que pour exciter plus fortement ſes deſirs & ſa paſſion. Nous obſerverions la Reine-abeille ſe proſtituer aux Faux-bourdons, triompher de leur indolence par des agaceries redoublées, cauſer la

mort de celui qu'elle auroit ainſi vaincu, s'efforcer par ſes careſſes de le rendre à la vie, & lui demeurer fidele même après la mort (1). Les prévenances & les empreſſemens des Neutres pour cette Reine ſi néceſſaire à ſon Peuple, les eſpeces d'hommages qu'ils lui rendent, ne groſſiroient-ils pas encore le Dictionnaire des Inſectes?

QUAND on connoît un peu l'admirable compoſition de l'organe de la voix de l'Homme, & de celui de la voix des Quadrupedes & des Oiſeaux, l'on ne s'aviſe guere de mettre en queſtion ſi de tels organes leur ont été donnés pour rendre des ſons & pour les modifier. L'imagination ſuccombe preſque à la vue du nombre prodigieux de pieces, & de pieces différentes qui entrent dans la ſtructure de ces organes merveilleux, qui ſont à la fois des inſtrumens à cordes & à vent. Ces inſtrumens ſont ſi bien montés pour rendre les ſons propres à l'Eſpece, que ſi l'on ſouffle dans la trachée d'un Mouton ou d'un Coq morts, on croira entendre l'Animal lui-même (2). La

(1) †† J'abrégeois fort ici le long & curieux détail que le principal Hiſtorien des Abeilles nous a donné des amours d'une Reine-abeille qu'il avoit renfermée avec quelques Faux-bourdons. Conſultez ſur ces détails la Note 5 du Chap. VII de la Part. VIII.

(2) †† Voyez Part. VII, Chap. V, Note 2, diverſes parti-

Cigale pourroit nous offrir en ce genre des merveilles qu'on ne s'attendroit pas à rencontrer chez les Inſectes. Si l'on ne reſtreignoit point le mot de voix à cet air modifié par les fibres tendineuſes de la glotte & par les autres parties du larynx, la Cigale auroit une voix, & l'organe de cette voix nous paroîtroit preſque auſſi admirable que celui de la voix des Quadrupedes & des Oiſeaux. Ne réſiſtons point à la tentation de deſcendre dans un détail ſi propre à nous convaincre que les plus petites Productions de la Nature ſont l'ouvrage de cette INTELLIGENCE ADORABLE qui s'eſt peinte dans le petit comme dans le grand.

LA Cigale eſt une eſpece de *Ventriloque* : c'eſt dans ſon ventre qu'eſt placé l'organe de ſa voix (3). Le Mâle ſeul ſait chanter ; la Femelle eſt muette, & apparemment que le chant du Mâle ne lui déplaît pas. Sur le ventre de ce dernier ſont deux plaques écailleuſes, à-peu-près circulaires, attachées d'un côté par des

cularités anatomiques ſur la ſtructure ſi remarquable de l'organe de la voix dans l'Homme, dans quelques Quadrupedes & dans quelques Oiſeaux.

(3) †† C'eſt à Mr. de REAUMUR que nous ſommes redevables des curieux détails que j'expoſois ici d'après lui ſur l'inſtrument vocal de la Cigale.

ligamens & mobiles de l'autre. Elles peuvent être ſoulevées, & pour qu'elles ne le ſoient jamais trop, elles ſont retenues par deux petites chevilles. Si l'on enleve ces plaques, l'on ſera frappé de l'appareil qu'elles recouvrent, & l'on ne pourra s'empêcher d'y reconnoître un but déterminé, un but analogue à celui que nous découvrons ſi clairement dans un larynx ou dans une glotte. L'on voit d'abord une grande cavité agréablement rebordée dans ſon contour ſupérieur, & partagée en deux loges par une piece triangulaire. Au fond de chaque loge eſt une eſpece de miroir, du plus beau poli, & qui regarde obliquement, préſente toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il ſemble que ce ſoient deux fenêtres vitrées par leſquelles on peut voir dans l'intérieur de l'Animal. Mais ces fenêtres ont chacune un volet, qui les couvre ordinairement, & ce volet eſt une de ces plaques écailleuſes dont j'ai parlé. Au-deſſous de chaque volet, eſt un petit chevalet qui ſoutient le volet, & l'empêche de s'abaiſſer trop dans la cavité.

VOILA déja bien des pieces employées à faire chanter une Cigale, & pourtant ce ne ſont encore là que les dehors d'un organe dont nous allons entrevoir l'intérieur & les pieces vraiment eſſentielles. Outre les loges garnies de miroirs, il

y a dans la grande cavité deux petits réduits, tapiſſés d'une membrane très-élaſtique, ſillonnée réguliérement, & deſtinée à faire les fonctions de la peau des timbales. C'eſt ce qui a fait nommer ces réduits les timbales de la Cigale. Si l'on paſſe une plume ſur la peau de ces timbales, l'on fera chanter la Cigale, & cela arrivera dans une Cigale morte depuis long-temps, comme dans une Cigale vivante. Les ſillons ou les plis réguliers de la membrane élaſtique ſont autant de petits inſtrumens ſonores qui ont chacun leur ſon propre. L'air ébranlé & modifié par ces inſtrumens, va réſonner dans les loges, où il eſt encore modifié par les différentes pieces qu'elles renferment, comme il eſt modifié dans les Quadrupedes & dans l'Homme par les cavités de la bouche & du nez. Deux grands muſcles, formés de la réunion d'un nombre prodigieux de fibres droites, ſont chargés de mettre en jeu les ſillons ſonores, & telle eſt la cauſe immédiate d'un cri qui nous paroît ſi ennuyeux. Nous nous étonnons que la Nature ſe ſoit miſe en de ſi grands frais pour le produire; elle s'eſt miſe en plus grands frais encore pour opérer le braiement de l'Ane; & dans l'un & dans l'autre, elle n'a pas dû, je penſe, conſulter notre oreille. Mais l'organe de la voix ſuppoſe un organe relatif à celui de l'ouie: la Cigale

auroit-elle donc des oreilles? Le Mâle flatteroit-il agréablement celles de la Femelle? ou ſe plairoit-il lui-même à ſon chant ou au moins à l'exercice qu'il exige? Nous ne ſaurions rien dire de poſitif là-deſſus. Il n'eſt pas facile de découvrir dans les Inſectes le ſiege de l'ouie. Tous n'en ſont pas ſans doute dépourvus. Le Lézard & la Grenouille ont des oreilles, & ils ſont bien voiſins des Inſectes. Les organes ſemblables ou analogues ont été ſi diverſifiés dans le Regne animal, qu'il ne ſeroit pas étrange que nous euſſions vu cent fois les oreilles des Inſectes, ſans avoir pu les reconnoître (4). D'ailleurs n'oublions point que la Nature fait ſouvent ſervir le même inſtrument à pluſieurs

(4) †† Le Lézard, le Caméléon & la Tortue viennent à l'appui de la réflexion que je faiſois ici. On avoit cru que le Lézard & le Caméléon étoient privés de l'organe de l'ouie, parce qu'on ne le découvroit point ſur leur extérieur. On ne ſavoit pas, que pour le découvrir, il falloit ouvrir la bouche au petit Quadrupede. On apperçoit alors le conduit auditif, ſitué vers l'extrémité des mâchoires. Le ſon ne peut donc parvenir à l'organe principal de l'ouie de ces Animaux que par la bouche ou par les narines. On obſerve une ſingularité analogue dans la Tortue : elle n'a point d'oreille externe : l'endroit de la tête qui correſpond à l'organe de l'ouie eſt recouvert d'une peau écailleuſe comme le reſte du corps ; mais ſi on preſſe un peu la peau à cet endroit, on y ſentira une ſorte d'enfoncement qui indiquera la cavité qu'elle recouvre.

fins. La langue des Moules ne leur ſert-elle pas à la fois de bras, de jambes & de filiere (5) ?

Les Animaux qui naiſſent & vivent en ſociété, qui travaillent comme de concert aux mêmes ouvrages, ſont ceux auxquels un langage ſembloit être le plus néceſſaire. En effet, appellés à ne former qu'une même Famille, à ſe ſoulager mutuellement dans leurs beſoins, à s'entr'aider dans leurs travaux, quel moyen plus convenable que celui-là pour répondre à cette deſtination ? Auſſi a-t-on obſervé chez ces Animaux, des particularités qui paroiſſent prouver qu'ils s'entendent. Nous avons vu (6) les Marmottes en ſentinelle donner à leurs Compagnes, par un coup de ſifflet, le ſignal de la fuite. Les Caſtors ont un ſignal analogue : ils frappent ſur l'eau un grand coup de leur quèue, & chacun eſt averti de pourvoir à ſa ſûreté. Il y a mille traits de ce genre, qu'il ſeroit long & inutile d'indiquer. Mais en conclurons-nous que les ouvrages que ces Animaux conſtruiſent en commun ſont dirigés de même par un langage qui leur eſt particulier ? Il me ſemble qu'il n'eſt pas

(5) Chap. XIII & XXI de cette Partie.

(6) Chap. XXVI de cette Partie.

beſoin de recourir ici à un pareil moyen. Une comparaiſon éclaircira ma penſée.

CINQUANTE Architectes ſont raſſemblés dans le même lieu pour travailler à la conſtruction d'un édifice. Ils ne doivent point ſe parler ; tous ſont muets de naiſſance ; mais tous ont ſous leurs yeux un plan de l'édifice, & ont reçu les mêmes diſpoſitions & les mêmes inſtrumens pour l'exécuter. Tous ſont doués des mêmes talens & de la même meſure d'intelligence. Les mêmes idées qui ſont dans la tête de l'un, ſe trouvent pareillement dans la tête de l'autre. Ainſi tous jugent & agiſſent uniformément dans chaque cas particulier, & toujours dans un rapport déterminé à ce cas. Les matériaux que les uns ont amaſſés, les autres les mettent en œuvre. Ce que le premier a commencé, le ſecond le ſuit, un troiſieme l'acheve, un quatrieme le perfectionne. Nulle contradiction, nulle diverſité dans les ſentimens & dans la façon d'agir, nulle confuſion, parce que les idées, les volontés & les moyens ſont préciſément les mêmes chez tous. Ceci nous repréſenteroit-il ce qui ſe paſſe dans les Républiques des Fourmis, des Abeilles, des Caſtors, &c. ?

QUOI qu'il en ſoit, on ne ſauroit diſconvenir

que les Bêtes n'aient un langage naturel : cent & cent obſervations concourent à l'établir. Non-ſeulement elles donnent à connoître ce qu'elles éprouvent ; mais nous parvenons encore à les diriger à notre gré, par le ſeul ſecours de la voix. Certains ſons qui ont pluſieurs fois frappé leurs oreilles, & qui les ont toujours frappées dans des circonſtances propres à faire ſur le cerveau une forte impreſſion, s'y gravent profondément ; enſorte qu'à l'ouie de ces mêmes ſons, l'idée de la choſe ou de l'acte qui y a été attaché, ſe réveille à l'inſtant, &c. La maniere dont on dreſſe les Animaux domeſtiques, & celle dont on apprivoiſe les Animaux ſauvages, en fourniſſent des exemples ſans nombre.

Le Vulgaire croit qu'on enſeigne aux Bêtes à parler : il ne ſait pas que parler, c'eſt lier ſes idées à des ſignes arbitraires qui les repréſentent. Les phraſes que le Perroquet répete avec tant de préciſion, ne prouvent point qu'il ait les idées attachées aux mots qu'il prononce : il pourroit prononcer auſſi-bien les termes des Sciences les plus abſtraites. Qui ne voit que c'eſt ici un jeu purement automatique ? Si l'on eſt parvenu à enſeigner à quelques Animaux domeſtiques à diſtinguer les caracteres de l'alphabet, à les lier, à en compoſer des mots, à mêlanger les cou-

leurs & les assortir, &c., &c., tous ces faits & cent autres de même genre, qui étonnent le Vulgaire, prouvent simplement que le cerveau des Animaux est capable de former des associations d'idées sensibles (7).

(7) †† On montroit à Paris en 1760 un Serin âgé de quatre ans, qui assortissoit toutes les nuances des étoffes brochées qu'on lui présentoit, qui formoit de caracteres séparés tous les mots qu'on lui demandoit, indiquoit par des chiffres l'heure marquée à une montre, sans même oublier les minutes, & qui enfin, exécutoit avec autant de facilité que de promptitude différentes opérations arithmétiques. Le Maître de ce Serin merveilleux avoit passé plus de trois ans à perfectionner ses talens & son éducation.

La facilité du Perroquet à imiter la parole, suppose bien de l'analogie entre ses organes auditifs & vocaux & ceux de l'Homme. Il imite avec la même précision tous les bruits qu'il entend, le miaulement du Chat, l'aboiement du Chien, les cris des Oiseaux, ceux des Enfans, &c. Mais on sait que le Perroquet n'est pas le seul Oiseau qui soit doué du talent dont il s'agit: la Pie, le Merle, le Geai, le Sansonnet, &c. apprennent aussi à parler. La langue de tous ces Oiseaux est épaisse & arrondie à-peu-près comme celle du Perroquet.

Il est même un Quadrupede qui peut apprendre à parler: on lit dans l'Histoire de l'Académie des Sciences de Paris, des détails curieux sur un Chien qui avoit appris à prononcer une trentaine de mots allemands; mais qui ne parloit qu'après que son Maître avoit parlé; ensorte qu'il sembloit ne faire que répéter les mots que celui-ci lui faisoit entendre. Cette répétition paroissoit même coûter beaucoup au Chien, & il ne l'exécutoit que par force ou malgré lui.

Je reviendrai encore à le dire, car il faut bien que j'y revienne, puisqu'on s'y trompe si facilement: tous ces faits &

La choſe eſt de l'évidence la plus parfaite : en imprimant la mot de Dieu, l'Animal peut-il avoir les idées que ce mot réveille dans la tête d'un Imprimeur ? Les Bêtes n'ont & ne peuvent avoir que des idées particulieres ou purement ſenſibles. Il leur eſt impoſſible de s'élever à nos idées univerſelles ; c'eſt qu'elles ne ſont point douées de la parole. Elles ne généraliſent point leurs idées ; elles ne forment point des abſtractions intellectuelles. Le ſujet ſe confond pour elles avec ſes attributs, ou plutôt il n'eſt

bien d'autres de même genre & de genres différens, prouvent ſeulement que le cerveau des Animaux peut, comme le nôtre, former des aſſociations d'idées purement ſenſibles. Plus ces aſſociations ſont nombreuſes & variées, & plus les actions qui leur correſpondent & qui les repréſentent paroiſſent merveilleuſes. L'imagination du Spectateur échauffée par le merveilleux & la nouveauté des faits, a bientôt transformé l'Animal en Être intelligent. Cette capacité phyſique d'aſſocier des idées ſenſibles de divers genres, permet à l'Animal de lier les perceptions auditives ou viſuelles des mots ou des nombres à celles des caracteres ou des chiffres qui les repréſentent, &c. Sa mémoire retient fidelement une ſuite de ſons, & la correſpondance ſecrete qui eſt entre l'organe de l'ouie & celui de la voix, le met en état de répéter ces ſons. Tout ceci eſt bien plus méchanique qu'on ne le penſe communément. Mais on ſe preſſe d'admirer, & l'admiration qui n'eſt pas éclairée commet ici bien des mépriſes. Il y a, ſans doute, beaucoup à admirer dans ce jeu méchanique que nous ne faiſons encore qu'entrevoir ; mais cette ſorte d'admiration n'appartient qu'au Philoſophe, parce qu'elle eſt très-raiſonnée.

point

point pour elles de ſujet ni d'attribut. Les Etres ne leur ſont connus que par quelques qualités ſenſibles. Toutes leurs comparaiſons, tous leurs jugemens repoſent immédiatement ſur ces qualités.

Les Bêtes ne raiſonnent donc point, à parler exactement : elles n'ont point nos idées moyennes, parce qu'elles n'ont point nos ſignes (8). Lors donc qu'elles paroiſſent raiſonner, elles ne font que comparer ou ſe rappeller certaines idées ſenſibles, d'où réſultent tel ou tel mouvement, telle ou telle action. Plus les idées comparées ou rappellées ſeront nombreuſes, variées, & plus les Bêtes paroîtront raiſonner. Ce ne ſera pourtant jamais qu'une apparence qui ne trompera point ceux qui auront aſſez de philoſophie dans l'Eſprit pour analyſer ce mouvement ou cette action & remonter au principe (9).

(8) †† Le Lecteur voudra bien conſulter ici la Note 2 du Chap. I de la Part. XI : ceci exige quelqu'attention pour être bien ſaiſi.

(9) Il y a des actions des Animaux qui affectent un air de prudence ou de réflexion, qui ſéduiroit le Philoſophe lui-même, s'il pouvoit oublier un inſtant que la Brute, bornée aux pures ſenſations, ne ſauroit s'élever au rang des Êtres intelligens. Le Secrétaire ou le Meſſager, Oiſeau ſingulier qui ſemble tenir à la fois de l'Oiſeau de proie & de l'Oiſeau de rivage, s'y prend

DONNEZ aux Caſtors l'uſage de la parole ; penſez-vous qu'ils s'en tiendroient éternellement

d'une maniere bien remarquable pour ſe rendre maître des Serpens dont il fait ſa pâture. D'abord il étourdit à coup d'aîles le redoutable Reptile ; il le ſaiſit enſuite par la queue, l'éleve en l'air, le laiſſe retomber d'une aſſez grande hauteur, & ne ceſſe de répéter cette manœuvre qu'il ne lui ait ôté la vie.

J'ai vu un Perroquet vert qui, lorſqu'on lui préſentoit un morceau de pain fort ſec, le ſaiſiſſoit avec ſes doigts & alloit le tremper à pluſieurs repriſes dans l'eau de ſon auget pour le ramollir.

J'ai chez moi depuis plus de quatre ans un Maki femelle, de l'Eſpece des *Mongous*, dont j'ai eu occaſion bien des fois d'admirer l'inſtinct. Chaque Hiver ce petit Quadrumane eſt ſujet à un reſſerrement qui paroît l'affecter douloureuſement. La premiere fois qu'on s'en apperçut, on s'aviſa de lui adminiſtrer des lavemens, qui le ſoulagerent d'abord & le guérirent peu-à-peu. Dès-lors il n'a jamais éprouvé de reſſerrement, qu'il n'ait préſenté ſon derriere à la Perſonne qui faiſoit auprès de lui la fonction d'Apothicaire. Il ſe mettoit en poſture de la maniere la plus plaiſante, s'élevoit beaucoup ſur ſes jambes de derriere, relevoit ſa queue & la tenoit fort droite, comme pour faciliter l'opération. Dans tout autre temps il ne ſouffroit point qu'on lui donnât des lavemens, & fuyoit à l'approche de la ſeringue.

Cet intéreſſant Animal, fort privé, fort doux & même aſſez propre, ſe plaît à coucher avec ſon Apothicaire ; il ſe tapit contre lui ou ſe cramponne à ſa cuiſſe ou à ſa jambe, & demeure tranquille toute la nuit. Il ne fait point ſes ordures dans le lit, & en ſort lorſqu'il veut ſatisfaire à ſes beſoins. Il leche à pluſieurs repriſes & avec une vivacité qu'on diroit tenir de la reconnoiſſance, la main qui l'a gratté ou qui l'a careſſé : il aime ſurtout à lécher le viſage & le col de ſon Médecin, quand il eſt cramponné à ſon épaule. Sa langue paroît d'abord un peu rude comme celle du Chat ; mais la ſalive qui l'humecte bientôt, la

à leur groſſiere architecture ? Doués alors de la faculté de généraliſer leurs modeles, ils diverſi-

fait paroître fort douce. Souvent il continue long-temps cette ſorte de careſſe, & jamais il ne fait rougir la peau, ni jamais il ne finit par mordre cruellement, comme Mr. de BUFFON le raconte d'un Maki de même Eſpece, qu'il avoit nourri pendant pluſieurs années. Mon Maki eſt un Animal très-innocent, très-ſociable, & qui ne montre de l'humeur que lorſqu'on le contrarie. Il eſt ſeulement aſſez opiniâtre, & ne cede pas facilement aux corrections qu'on lui inflige. Ses petites volontés ſont toujours très-décidées, & il ne renonce que difficilement à ce qu'il appete. Quand il s'ennuie ou qu'il eſt ſeul, il fait entendre, comme le Maki de Mr. de BUFFON, un long croaſſement, fort ſemblable à celui de la Grenouille : il le fait entendre encore quand on parle trop haut ou qu'on rit avec éclat. Il ſe repoſe volontiers & ſouvent de préférence ſur la cuiſſe ou le bras des Perſonnes qui l'accueillent ; il s'y établit & y demeure pour l'ordinaire juſqu'à ce qu'on l'en chaſſe. Mais cet Animal ſi doux & ſi accueillant envers les Êtres de notre Eſpece, eſt de la plus grande cruauté envers les petits Oiſeaux. Il eſt très-adroit à les attraper, & dès qu'il les a ſaiſis, il leur ouvre le crâne & en mange la cervelle. Il eſt d'ailleurs de la plus grande ſobriété ; un petit morceau de volaille cuite, ou un petit morceau de biſcuit lui ſuffit pour toute la journée. Il redoute beaucoup le froid & ſe délecte à ſe chauffer. Il offre alors un petit ſpectacle très-attachant : il ſe dreſſe ſur ſes pieds, s'aſſied comme un Enfant ſur ſon derriere, étend ſes bras, préſente ſa poitrine & ſon ventre au feu, en même temps qu'il porte la tête à droite & à gauche pour regarder les aſſiſtans. Je ne ſaurois dire combien il a de graces dans cette attitude.

Ce Maki, de couleur brune, a le poil court, ſoyeux & friſé. Il eſt plus petit qu'une Fouine, avec laquelle il a quelque reſſemblance. Ses yeux ſont gros, prééminens & de couleur jaune. Il a du blanc ſur les joues & une bande noire ſur le devant

fieroient autant leurs manœuvres que leurs organes pourroient le permettre. Leur attention ſe déployant avec une nouvelle force, leur feroit découvrir des choſes qui échappent à la portée actuelle de leur connoiſſance. Ces découvertes en ameneroient d'autres, celles-ci d'autres encore, & au bout d'un certain nombre de générations, les Caſtors ſeroient ſur les pas de nos Architectes (10).

de la tête. Son muſeau, qui eſt de même couleur que cette bande, eſt aſſez pointu. Il s'amuſe ſouvent à ronger le bout de ſa queue; & c'eſt ici un autre trait de reſſemblance de ce Maki avec celui de Mr. de BUFFON. On ſait, au reſte, que les Makis ſont originaires de Madagaſcar.

(10) †† Je me ſuis aſſez expliqué ſur l'induſtrie des Caſtors dans le Chapitre XXX de la Partie XI, auquel je renvoie le Lecteur. Il voudra bien conſulter encore la Note 2 du même Chapitre.

En nous entretenant ſi agréablement des facultés, des prérogatives & de la domination des Habitans de l'air, leur éloquent Hiſtorien me paroît s'être trop prévenu en leur faveur, & je m'étonne que ſa prédilection pour eux l'ait porté à les placer immédiatement après l'Homme dans l'échelle des Êtres vivans. Mais il faut l'entendre lui-même dans ſon intéreſſant Diſcours ſur les Perroquets. „ Le coup-d'œil, dit-il, que nous venons de „ jetter rapidement ſur les facultés des Oiſeaux, ſuffit pour „ nous démontrer que dans la chaîne du grand ordre des Êtres, „ ils doivent être après l'Homme placés au premier rang. La „ Nature a raſſemblé, concentré dans le petit volume de leur „ corps, plus de forces qu'elle n'en a départi aux grandes maſſes „ des Animaux les plus puiſſans; elle leur a donné plus de „ légéreté ſans rien ôter à la ſolidité de leur organiſation; elle

Mais, ce n'eſt pas ici le lieu d'approfondir ce ſujet de métaphyſique, & de montrer comment

„ leur a cédé un empire plus étendu ſur les Habitans de l'air,
„ de la terre & des eaux. . . . Si nous ajoutons à toutes ces
„ prééminences de force & de vîteſſe, celles qui rapprochent
„ les Oiſeaux de la nature de l'Homme, la marche à deux
„ pieds, l'imitation de la parole, la mémoire muſicale, nous
„ les verrons plus près de nous que leur forme extérieure ne
„ paroît l'indiquer ; en même temps que par la prérogative
„ unique de l'attribut des aîles & par la prééminence du vol
„ ſur la courſe, nous reconnoîtrons leur ſupériorité ſur tous
„ les Animaux terreſtres ".

Ailleurs Mr. de Buffon aſſignoit la premiere place à l'Éléphant, & l'ôtoit au Singe. (Part. IV, Chap. III, Note 1.) Ici, ce ſont les Oiſeaux qu'il place au premier rang ou immédiatement après l'Homme. Mais, ſi lorſque l'on compare entr'eux des Êtres mixtes ou des Êtres formés de la réunion de deux ſubſtances différentes, on doit avoir égard à la fois aux rapports ou aux reſſemblances qui naiſſent des attributs réunis des deux ſubſtances, ne ſera-t-on pas dans l'obligation philoſophique de placer au premier rang l'Être qui, par ſa forme extérieure & intérieure, par ſes mœurs, par ſes inclinations, par ſes talens, par ſa perfectibilité enfin, ſe rapproche le plus du premier des Êtres terreſtres ? Or, combien l'Orang-outang eſt-il plus près de l'Homme à tous ces égards, que l'Aigle ou le Perroquet ! Il eſt vrai que l'Orang-outang ne parle pas, ou plutôt ne jaſe pas comme le Perroquet : & pourtant ſon inſtrument vocal eſt incomparablement plus parfait que celui de l'Oiſeau, puiſqu'il eſt parfaitement ſemblable à celui de l'Homme. Seroit-il donc impoſſible d'enſeigner à un jeune Orang-outang à parler ? On a bien fait parler le Chien ; (Note 7) dont l'inſtrument vocal paroiſſoit beaucoup moins propre à ſe ployer à ce genre d'exercice. Qui ne voit d'ailleurs, qu'on ne doit pas faire entrer ici en conſidération la force reſpective du corps, la légéreté jointe

la parole perfectionne toutes nos facultés. Il me ſuffit d'avoir indiqué la principale ſource des mépriſes que l'on commet ſi généralement ſur les opérations des Bêtes.

La mépriſe eſt bien plus grande encore, lorſqu'on leur prête toutes nos vues & toute notre prévoyance. Je ne diſſimulerai point néanmoins qu'il eſt en ce genre des faits qui étonnent, qui s'emparent violemment de notre admiration, & qui ſéduiroient le Philoſophe lui-même, s'il n'étoit continuellement ſur ſes gardes.

à la ſolidité de l'organiſation, la puiſſance de voler, la rapidité de la courſe, &c. car ſi l'on avoit égard aux qualités de ce genre, il ſe trouveroit que l'Oiſeau devroit être placé au-deſſus de l'Homme même. Un ſeul trait d'intelligence dit plus que toutes ces prérogatives phyſiques de l'Oiſeau. Quand l'Ame du Perroquet auroit la même capacité de connoître & d'agir que celle de l'Orang-outang, il ſuffiroit que les membres du Perroquet fuſſent dans l'impoſſibilité abſolue d'exécuter ces actions preſqu'humaines que l'Orang-outang exécute ſi bien, pour que l'Oiſeau ne pût obtenir la premiere place après l'Homme. Tout harmoniſe eſſentiellement dans l'Être mixte : l'Ame & le Corps y ſont entr'eux dans un rapport qui correſpond exactement au rôle que l'Être étoit appellé à jouer ſur le grand Théatre du Monde. Il me paroît donc que nous ne ſaurions mieux juger de la prééminence d'un Être mixte, que par le nombre, la diverſité & l'eſpece des rapports qu'il ſoutient avec l'Homme, le plus parfait de tous les Êtres mixtes. Mais, encore une fois, c'eſt l'enſemble de tous les rapports connus, ſoit anatomiques, ſoit pſychologiques, qu'il faut ſaiſir, comparer & apprécier.

J'en ai déja raconté pluſieurs : je vais en raſſembler d'autres, qui ne frapperont pas moins, & qui manqueroient à mon ouvrage ſi je les omettois.

CHAPITRE XXXIV.

La Chenille qui ſe conſtruit une coque en naſſe de Poiſſon.

Irrégularités dans le travail des Inſectes. Réflexions à ce ſujet.

DANS le Chapitre IV de cette Partie, nous avons pris une idée de la conſtruction des coques des Chenilles, & des variétés les plus remarquables de cette conſtruction chez différentes Eſpeces. Il s'en faut beaucoup que nous ayons épuiſé cet agréable ſujet ; nous ne devions pas même entreprendre de le faire ; mais nous pouvons y revenir avec plaiſir.

UNE grande Chenille (1) qui ſe fait aiſément

(1) †† On trouve cette Chenille en Été ſur le Poirier & le Prunier. Elle n'eſt pas moins remarquable par ſa grandeur & ſa groſſeur, que par les tubercules brillans dont ſes anneaux ſont ornés. J'ai eu bien des occaſions de la ſuivre dans ſon ingé-

remarquer par des boutons ou tubercules, ſemblables à de petites turquoiſes, dont ſes anneaux ſont ornés, ſe conſtruit une groſſe coque de pure ſoie fort luſtrée & très-épaiſſe. Cette coque enrichiroit nos Fabriques, ſi l'on ſavoit en tirer parti. Examinez attentivement celle que j'ai renfermée dans cette boîte. Un de ſes bouts eſt arrondi; l'autre ſe termine en pointe. Fixez vos regards ſur celui-ci: il eſt ouvert. Comment l'Inſecte, dans ſon état d'inaction, eſt-il à l'abri des inſultes des petits Animaux voraces, tandis qu'il demeure dans une coque ouverte à tout venant? Il eſt appellé à y paſſer ordinairement neuf à dix mois, & quelquefois il arrive par des circonſtances particulieres, à nous inconnues, qu'il y paſſe pluſieurs années.

Vous reprochez déja à la Chenille ſa négligence, & vous demandez pourquoi elle n'a pas la précaution de fermer exactement ſa coque,

nieux travail, & j'ai expoſé ailleurs fort en détail l'art avec lequel elle conſtruit ſa double naſſe. Sa maniere de la filer ne reſſemble point à celle dont elle file le reſte de la coque. Elle s'y renferme en Août & ſe transforme en Mai en cette belle & grande Eſpece de Papillon de nuit, qui a reçu le nom de *Papillon-paon*, parce que ſes aîles ſont parées de taches colorées en forme d'yeux, qui imitent celles qui brillent ſur la queue du Paon. Il n'eſt point dans nos Contrées de Papillon dont les aîles ſoient auſſi amples.

comme le Ver-à-ſoie & tant d'autres Chenilles? Suſpendez un moment vos reproches : le Papillon dans lequel cette Chenille ſe transforme n'a aucun inſtrument pour rompre ou couper les fils de la coque & pour s'y frayer une iſſue. Il reſteroit donc toute ſa vie priſonnier dans cette coque que vous voudriez qui fût ſi bien cloſe. La Chenille la laiſſe donc ouverte ; mais elle ſait en même temps en interdire l'entrée à tout Inſecte vorace.

Elle y pratique une eſpece de naſſe de Poiſſon : les fils qui compoſent cette naſſe ſont beaucoup plus forts que ceux du reſte de la coque : ils ont de la roideur, & ſont comme *guipés* ou frangés. Tous ſont couchés & dirigés dans le même ſens, & ſe terminent à l'ouverture. La naſſe ou l'entonnoir qu'ils forment par leur aſſemblage, a ſon embouchure tournée du côté de l'intérieur de la coque.

Ouvrons cette coque avec des ciſeaux : vous voyez diſtinctement tout l'artifice de la petite naſſe. Vos reproches ſe changent maintenant en éloges, & vous admirez l'adreſſe de la Chenille. La naſſe ſe préſente au Papillon qui veut ſortir, comme nos naſſes ſe préſentent aux Poiſſons qui veulent y entrer ; par conſéquent, elle

ſe préſente aux Inſectes voraces, comme nos naſſes, aux Poiſſons qui tentent d'en ſortir.

Je ne vous ai pas montré encore tout l'art de la Chenille. Une ſeule naſſe ne ſuffiroit pas ſans doute : il pourroit ſe trouver des Inſectes qui s'y introduiroient, & qui dévoreroient la Chryſalide Notre Chenille pratique donc une ſeconde naſſe au-deſſous ou dans l'intérieur de la premiere, & les fils de cette ſeconde naſſe ſont encore plus ſerrés que ceux de la naſſe extérieure.

Observez, je vous prie, avec quelle préciſion les deux naſſes ſont emboîtées l'une dans l'autre : vous vous écriez, qui pourroit méconnoître ici une fin déterminée ! Ne vous y méprenez pas : ce n'eſt point la Chenille qui s'eſt propoſé cette fin ; c'eſt l'Auteur de la Chenille. Analyſez un peu toutes les connoiſſances & tous les raiſonnemens que cette fin ſuppoſeroit dans la Chenille, & vous reconnoîtrez bientôt, qu'elle n'eſt qu'un inſtrument aveugle, qui exécute méchaniquement un travail néceſſaire à la conſervation de l'Individu.

Cet inſtrument peut ſe déranger dans ſes opérations, comme toute autre machine : il peut

même ſe déranger davantage, parce qu'il eſt moins ſimple, & qu'il n'eſt pas une pure machine. Auſſi a-t-on vu une coque d'une Chenille de cette Eſpece, qui étoit toute ronde, bien cloſe de toutes parts, ſans naſſes, & dont il ne ſortit point de Papillon (2).

On obſerve de pareils dérangemens dans le travail de divers Inſectes, & en particulier dans celui des Abeilles (3). Ce ne ſont pas proba-

(2) †† La groſſe coque que ſe file notre grande Chenille à tubercules, eſt toujours de couleur brune: la coque toute ronde dont je parlois ici & que j'envoyai à Mr. de Reaumur, étoit d'un beau blanc très-argenté, & un peu moins groſſe que les coques ordinaires.

(3) †† Les variétés & les irrégularités que l'œil attentif de l'Obſervateur découvre dans le travail des Abeilles ſont preſque innombrables, & il en eſt de bien des genres. Je n'ai jamais manqué de donner beaucoup d'attention à ces ſortes d'anomalies depuis environ quarante ans que j'obſerve ces Mouches induſtrieuſes: c'eſt que rien n'eſt plus propre que de telles anomalies à perſuader que les Bêtes ne ſont pas de pures Machines. Il m'eſt arrivé de renfermer ſucceſſivement bien des eſſaims dans la même ruche vitrée, & je puis aſſurer que je n'ai jamais vu deux eſſaims conduire leur travail préciſément de la même maniere, ſoit à l'égard de l'emplacement des gâteaux, ſoit à l'égard de leurs directions reſpectives, ſoit enfin relativement à leur figure ou à leurs proportions.

On n'obſerve pas moins d'anomalies dans la forme & dans les dimenſions des cellules. J'en ai vu dont l'ouverture étoit ellyptique; dans d'autres elle étoit à-peu-près circulaire, & dans les

blement des mépriſes de l'Animal, comme on le penſe communément. Des mépriſes ſuppoſent la poſſibilité d'un choix, & les Animaux choiſiſſent-ils à parler philoſophiquement? N'eſt-il pas plus vraiſemblable, que le jeu des organes, troublé ou modifié plus ou moins par des circonſtances particulieres, produit ces irré-

unes, comme dans les autres, cette ouverture ne retenoit aucun veſtige de la figure héxagone. Le fond des cellules ne m'a pas offert des irrégularités moins remarquables : aſſez ſouvent j'ai reconnu qu'au lieu d'être formé, comme à l'ordinaire, de trois petites pieces en loſange, égales & ſemblables, il étoit formé de quatre, cinq ou ſix pieces, de figure plus ou moins irréguliere, mais qui ſe rapprochoit plus de la quadrilatere que de toute autre. Je renvoie ici pour plus d'éclairciſſement à la Note 1 du Chap. XXVI de la Part. XI, & à la Note 11 du Chap. XXVII de la même Partie.

Les dimenſions des cellules communes m'ont paru varier plus encore que leur ouverture & leur fond. A l'ordinaire, la profondeur de ces cellules eſt d'environ cinq lignes ; & j'en ai obſervé fréquemment dont la profondeur étoit de dix-huit à vingt lignes. Ces cellules, ſi démeſurément profondes, rampent toujours par un de leurs côtés ſur le verre de la ruche, & ne ſervent jamais qu'à contenir du miel. Il en eſt qui ſont plus ou moins inclinées à l'horiſon ; au lieu que les cellules ordinaires lui ſont paralleles ou à-peu-près. Enfin on rencontre ſouvent des cellules qui, loin d'être des tubes droits, ſont, au contraire, des tubes courbés en divers ſens.

Je paſſe ſous ſilence bien d'autres anomalies dont il ne me ſeroit pas poſſible de donner une idée un peu nette ſans le ſecours de figures : mais j'en ai bien dit aſſez pour détromper ceux qui pourroient croire que le travail des Abeilles eſt toujours régulier & uniforme.

gularités qu'on interprete ſouvent d'une maniere trop favorable à la liberté de l'Inſecte? Il eſt vrai, qu'il réſulte quelquefois de ces irrégularités des avantages réels dont l'Inſecte profite; mais ces avantages il ne les a ni prévus ni cherchés: ils étoient des exceptions d'un ſyſtême phyſique, lié à d'autres ſyſtêmes phyſiques, par l'AUTEUR de l'enchaînement univerſel, qui a vu de toute étérnité les écarts de la Chenille ou de l'Abeille, comme IL a vu ceux des Corps céleſtes (4).

(4) †† Le grand Inſectologiſte, Mr. de GEER, parle de coques de Chenilles qui avoient la conſiſtance du parchemin, & dont la conſtruction offroit une particularité bien remarquable. Le bout antérieur étoit façonné de maniere qu'en le preſſant un peu avec ſa tête, le Papillon pouvoit le détacher facilement du reſte de la coque, & ſe mettre ainſi en liberté. On voyoit alors une ſorte de couvercle ou de calotte qui abandonnoit le corps de la coque. Une petite adreſſe de la Fileuſe avoit rendu cette ſéparation facile: elle n'avoit lié les bords de la calotte à ceux de la coque que par des fils aiſés à rompre; tandis que par-tout ailleurs elle avoit donné à l'ouvrage une grande ſolidité.

CHAPITRE XXXV.

La Chenille rouleuſe qui ſe conſtruit une coque en grain d'avoine.

NOUS avons fort admiré la méchanique ingénieuſe & preſque ſavante au moyen de laquelle diverſes Chenilles roulent les feuilles des Arbres (1). Nous nous ſommes aſſez arrêtés à conſidérer leurs différentes manœuvres, ſoit lorſqu'elles font prendre à la feuille la forme d'un tuyau, ſoit lorſqu'elles lui donnent celle d'un cornet, poſé ſur ſa baſe comme une pyramide.

VOYEZ ces feuilles de Frêne roulées ainſi en cornet : elles ſont habitées par une petite Chenille, qui s'y eſt conſtruit une coque de pure ſoie, aſſez ſemblable à un grain d'avoine. Nous ne ſaurions obſerver cette coque ſans ouvrir le cornet : ouvrons-le avec précaution : la coque eſt logée au centre. Vous appercevez de petites cannelures ſur ſon extérieur : elles ne ſont pas ce qui mérite le plus votre attention.

REMARQUEZ ſur-tout comment cette jolie coque eſt ſuſpendue au milieu du cornet, à l'aide

(1) Chap. VII de cette Partie.

d'un fil ou d'un petit axe de ſoie, dont une des extrémités tient au ſommet du cône, & l'autre à ſa baſe ou au plat de la feuille. Regardez de fort près l'endroit où le fil s'attache ſur le plat de la feuille : vous y appercevez une petite piece exactement circulaire, noyée dans l'épaiſſeur de la feuille, & qui vous paroît cacher quelque deſſein ſecret. Vous la retrouverez dans bien des cornets ; mais il arrivera ſouvent que vous verrez à la place un petit trou rond, bien terminé, & qui ſemblera avoir été fait par un emporte-piece.

La piece circulaire eſt l'ouvrage de la Chenille : elle a rongé adroitement la feuille à cet endroit ; elle en a coupé circulairement une petite portion, qu'elle a eu grand ſoin de laiſſer en place. Vous commencez à démêler le but de ce travail : il tend à ménager une iſſue ſecrete au Papillon, en même temps qu'il interdira l'entrée du cornet aux Inſectes malfaiſans. Notre induſtrieuſe Chenille pratique donc une petite porte à ſa cellule. Cette porte ne doit s'ouvrir qu'après la derniere métamorphoſe : ſes contours s'engrenant dans la feuille, elle y demeure comme encadrée. Au ſortir de la coque, le Papillon deſcend le long du fil qui la tient ſuſpendue ; il en ſuit la direction, arrive à la porte, & la fait

ſauter en la pouſſant avec ſa tête. Ces cornets que vous voyez percés, ont été abandonnés par les Papillons.

CHAPITRE XXXVI.

Procédés analogues de quelques autres Inſectes.

Nos grains ſont ſujets à être mangés par une très-petite Chenille qui ſe loge dans leur intérieur & s'y métamorphoſe. L'enveloppe du grain eſt une ſorte de boîte bien cloſe que la Chenille tapiſſe de ſoie. Mais le Papillon n'a point d'inſtrument pour percer cette boîte, & il y demeureroit captif, ſi la Chenille n'avoit été inſtruite à lui préparer une ſortie. Elle s'y prend comme la rouleuſe du Frêne : avec ſes dents, elle taille dans l'enveloppe du grain une petite piece ronde, qu'elle ſe donne bien de garde d'en détacher entiérement. Le Papillon n'a qu'à pouſſer cette piece pour ſe mettre en liberté (1).

(1) †† On n'imagine pas tous les ravages que cette très-petite Chenille peut faire dans nos greniers : elle peut convertir en des tas de ſon les plus grands amas de grains. Ses dévaſtations ne l'ont rendue que trop fameuſe en France : pendant plus de trente ans elle n'a ceſſé de déſoler deux cents Paroiſſes de l'Angoumois. Elle avoit été très-bien obſervée par Mr. de

Au centre de la tête du Chardon à bonnetier, eſt une grande cavité oblongue, habitée ordi-

REAUMUR ; mais Mr. DUHAMEL, appellé par le Gouvernement à ſe tranſporter dans l'Angoumois pour y approfondir davantage l'hiſtoire de cet Inſecte devenu ſi redoutable, nous en a donné un Traité auſſi utile que curieux, & dont je détacherai les particularités les plus dignes de l'attention de mon Lecteur.

Notre petite Chenille des grains n'a guere que deux lignes & demie de longueur. Elle eſt raſe, blanchâtre, & a ſeize jambes. Sa partie antérieure, beaucoup plus renflée qu'elle ne l'eſt ordinairement dans les Chenilles, offre une petite ſingularité aſſez remarquable ; ce ſont deux cornes en maniere d'antennes, placées l'une à droite, l'autre à gauche.

Le Papillon ne pond pas ſes œufs un à un, comme les autres Papillons : il les pond par paquets de ſoixante, quatre-vingts ou nonante œufs. Ils ſemblent dardés hors du corps du Papillon, & à chaque jet, il en ſort trois, quatre ou ſix à la fois. Ils ſont enduits d'une humeur viſqueuſe qui les colle au grain ſur lequel ils ſont dépoſés. Ils ſont oblongs, ſtriés & chagrinés, & leur petiteſſe eſt telle, qu'ils paſſent par le trou que la plus fine éguille a fait dans une feuille de papier. Le plus ſouvent le Papillon les colle à la baſe du grain ou près de ſon ſupport. Les Chenilles en éclоſent au bout de cinq à ſix jours. On peut juger de leur extrême petiteſſe par celle des œufs. Elles ſont rouges à leur naiſſance, & blanchiſſent bientôt. A peine ſont-elles écloſes, qu'elles s'efforcent de pénétrer dans l'intérieur du grain : elles y parviennent en le perçant près de ſa rainure. On ne trouve jamais ou preſque jamais qu'une ſeule Chenille dans chaque grain, ſans qu'on ſache préciſément comment celle qui s'y eſt introduite en défend la poſſeſſion contre tant d'autres qui pourroient également y pénétrer : (Chap. VI, Note 1.) mais il y a bien lieu de préſumer qu'il en eſt de cette petite Chenille comme de celle qui vit dans l'intérieur de la tête du Chardon à bonnetier. (*Ibid.* Note 2.)

nairement par une petite Chenille, qui s'y fait une sorte de coque où elle se transforme. L'é-

Un grain de bled qui renferme une Chenille parvenue à son parfait accroissement, ne differe point à l'extérieur d'un grain sain. La Chenille qui en a consumé toute la substance farineuse, a su en ménager l'écorce ou l'enveloppe. Et comme le Papillon n'a aucun instrument pour percer cette écorce, la Chenille y pratique une sorte de porte ou de petite trappe, que le Papillon n'aura qu'à soulever pour sortir de sa prison. Après avoir construit cette trappe, la Chenille se file dans le grain une coque de soie, où elle se transforme en Chrysalide. Lorsqu'on ouvre un grain habité par une de ces Chrysalides, on voit qu'il est partagé en deux logettes inégales: dans la plus grande est niché l'Insecte; dans l'autre sont les excrémens de la Chenille.

Quand les Papillons sont sur le point de venir au jour, leur apparition prochaine s'annonce par une chaleur vive qui se fait sentir dans les tas de grains, & qui éleve la liqueur du thermometre à 25 ou 30 degrés, tandis qu'au dehors elle n'est qu'à 15. Mr. Duhamel soupçonne, que cette augmentation de chaleur peut ne pas dépendre entiérement des Insectes; mais qu'elle est occasionée en partie par l'humidité qu'ils entretiennent dans les grains, & qui les fait fermenter. Cette chaleur favorise à son tour la propagation de l'Insecte.

Il y a au moins deux générations de ces Papillons chaque année: la premiere paroît en Mai & Juin, & va pondre sur les épis en pleine campagne: la seconde paroît à la fin de l'Été ou en Automne, & celle-ci pond sur les grains renfermés dans les greniers. Celle-ci passe l'Hiver sous la forme de Chenille, & donne la premiere génération de Papillons. Ici s'offre un fait bien digne de remarque; c'est que les Papillons qui éclosent en Juin dans les greniers, en sortent par un vol rapide, après le coucher du Soleil, pour se disperser dans les champs encore invêtus, & pondre sur les épis, au lieu que les Papillons qui éclosent dans les greniers après la moisson, y demeurent & ne

corce du Chardon eſt beaucoup plus dure que celle de nos grains : il ſeroit impoſſible au Papillon de s'y faire jour : il lui faudroit de fortes dents pour y parvenir ; & il n'a point d'inſtrumens ſemblables ou analogues. La Chenille, qui ſemble le ſavoir, pourvoit habilement aux beſoins du Papillon. Elle perce de part en part les parois de ſa cellule ; elle y pratique un petit trou rond, vis-à-vis le bout de ſa coque, par lequel le Papillon doit ſortir. Mais, ſi ce trou demeuroit ouvert, la Chryſalide ſeroit trop ex-

cherchent point à en ſortir. Il eſt encore prouvé, que les Chenilles logées dans les grains qui ont été ſemés en Automne, s'y conſervent, s'y métamorphoſent, & que les Papillons percent deux à trois pouces de terre pour venir au jour : mais diverſes circonſtances en font périr beaucoup, & les générations qui doivent leur origine à ces Papillons qui ont éclos ſous terre, ſont bien moins nombreuſes que celles qui proviennent des Eſſaims qui ſortent des greniers.

Ces Papillons, d'un jaune blanchâtre, appartiennent à la claſſe des Phalenes ou des Papillons de nuit. Le Mâle & la Femelle s'accouplent à pluſieurs repriſes ; ce qui n'eſt point ordinaire aux Papillons.

Notre célebre Obſervateur qui n'avoit approfondi l'hiſtoire de l'Inſecte deſtructeur que pour découvrir des moyens ſûrs de préſerver nos grains de ſes attaques, nous a appris qu'on peut y parvenir à l'aide des étuves. Il s'eſt aſſuré par une longue ſuite d'expériences, que l'Inſecte périt à un degré de chaleur inférieur à celui qui peut nuire au germe du grain. Du bled expoſé pendant vingt-quatre heures dans une étuve à une chaleur de nonante degrés, a très-bien levé, & il eſt bien conſtaté que l'Inſecte ne ſauroit ſoutenir une chaleur de 60 degrés.

poſée : la Chenille s'aviſe d'un moyen fort ſimple pour en boucher l'ouverture. Tout l'extérieur de la tête du Chardon eſt couvert des graines de la Plante : elles ſont implantées dans l'écorce, entre les piquans. Ce ſont de petits corps oblongs & cannelés, poſés les uns auprès des autres. La Chenille aſſujettit à l'extérieur du trou quelques-uns de ces petits corps : ils y font l'office des naſſes de la coque dont j'ai parlé dans le Chapitre précédent.

En parcourant les procédés des Teignes aquatiques (2), nous avons remarqué qu'elles ſe transforment dans leur fourreau. Il faut que l'eau puiſſe ſe renouveller ſans ceſſe dans ce fourreau : il faut auſſi qu'aucun Inſecte vorace ne puiſſe y avoir accès. Au lieu de mettre une porte pleine à chaque bout de ſon logement, la Teigne y met une porte grillée, & ce grillage ſatisfait à tout. Ne prêtons pas à cette Teigne notre maniere de raiſonner : ſait-elle que des Inſectes voraces en veulent à ſa vie ? ſait-elle qu'elle revêtira une forme ſous laquelle elle ne pourra fuir ? Non, elle ne ſait point tout cela, & elle n'a que faire de le ſavoir. Elle a été inſtruite à tendre des fils qui ſe croiſent ; elle les

(2) Chap. XI de cette Partie.

teud ; en les tendant, elle ſatisfait à un beſoin purement phyſique, & pourvoit machinalement à des inconvéniens qu'elle ne connoît point & ne peut connoître. Jugez ſur le même principe des autres faits de ce genre. C'eſt toujours l'AUTEUR de l'Inſecte qui eſt ſeul admirable.

CHAPITRE XXXVII.

La Teigne des feuilles : eſſai d'explication de ſes procédés.

NOUS nous ſommes promis de revenir aux Teignes champêtres (1) : en voici le lieu. Leurs procédés ſont ſi ſinguliers, & en apparence ſi réfléchis ; l'Inſecte ſait les varier ſi à propos, qu'ils exigent que nous entrions dans quelque détail, & que nous tâchions de nous en former des idées philoſophiques.

C'EST, comme nous l'avons vu (2), avec des membranes de feuilles, que notre Teigne s'habille. La forme de ſon fourreau eſt recherchée. Elle tient de la cylindrique ; mais les bouts

(1) Chap. XI de cette Partie.

(2) Ibid.

ſont différemment façonnés. L'antérieur, celui où ſe montre la tête de la Teigne, eſt arrondi, coudé & rebordé. Le poſtérieur eſt formé de trois pieces triangulaires, que leur reſſort naturel tend à réunir par leurs extrémités, & qui peuvent s'écarter pour laiſſer ſortir le derriere de l'Inſecte. Quelquefois le fourreau eſt orné du côté du dos, de dentelures qui imitent les ailerons ou pinnes des Carpes.

POUR conſtruire ce fourreau, la Teigne ſe gliſſe dans l'épaiſſeur d'une feuille verte; elle s'inſinue entre les deux membranes qui la compoſent. Elle en détache la pulpe ou le parenchyme qu'elles renferment. Ce parenchyme eſt la nourriture appropriée à la Teigne. Ainſi, en même temps qu'elle ſatisfait au beſoin de manger, elle prépare l'étoffe dont ſon habit doit être fait: les deux membranes ſont cette étoffe. Chacune d'elles eſt pour la Teigne, ce qu'une piece de drap eſt pour un Tailleur. Comme ce dernier, elle donne aux différentes pieces de l'habit les contours & les proportions qu'elles doivent avoir ſéparément, pour répondre à l'uſage auquel elles ſont deſtinées. L'habit que la Teigne veut ſe tailler, doit être formé de deux morceaux de feuille égaux & ſemblables, réunis ſur le dos & ſous le ventre. Elle coupe donc dans

chacune des membranes entre leſquelles elle eſt placée, une piece de telle figure & grandeur, qu'elle formera la moitié de l'habit. Notre Teigne exécute cela avec autant de juſteſſe & de préciſion, que ſi elle avoit un *patron* qui la guidât.

L'HABIT taillé, il reſte à le finir. La Teigne en aſſemble d'abord les pieces aſſez groſſiérement; elle ne fait, pour ainſi dire, que les *fauxfiler*: elle veut, avant que de les réunir plus exactement, s'aſſurer de leur juſteſſe, les eſſayer, & leur faire prendre le bon pli ſur ſon propre corps. C'eſt auſſi en ſe retournant, en ſe mettant dans toutes les poſitions où elle aura par la ſuite beſoin de ſe mettre, qu'elle les écarte l'une de l'autre autant qu'il eſt néceſſaire, & que de planes, elle les rend convexes. Elle les coud enſuite à points plus ſerrés, & elle le fait ſi bien & avec tant de propreté, qu'on a peine à démêler les endroits où les deux bords ont été ajuſtés l'un contre l'autre.

JE ſupprime à regret bien de petits détails qui releveroient beaucoup l'art merveilleux de notre habile Ouvriere. Je n'ai pas même dit aſſez combien les contours de chaque piece ſont variés. Ils le ſont preſque autant que ceux des pieces de nos habits. Je n'ai que peu inſiſté ſur

la maniere dont la Teigne prépare l'étoffe, dont elle la polit, l'amincit, la décharge de tout le parenchyme, & la rend auſſi ſouple que légere. Tous ces détails appartiennent à l'Hiſtoire particuliere des Teignes; je ne dois préſenter ici que les grands traits de cette Hiſtoire.

ENFIN, la Teigne ne ſe contente pas d'un ſimple fourreau de feuille : il ne ſeroit apparemment ni aſſez doux ni aſſez chaud. Elle le double de pure ſoie, & elle a ſoin de tenir la doublure plus épaiſſe dans les endroits où le frottement eſt le plus grand.

APRÈS avoir mis ainſi la derniere main à ſon habit, elle travaille à le dégager des parties de la feuille dans leſquelles il eſt demeuré comme encadré. Pour y parvenir, elle a moins beſoin d'adreſſe que de force. Elle fait ſortir ſa tête hors du fourreau; elle la porte en avant; elle ſe cramponne ſur la feuille avec ſes premieres jambes; elle fait effort pour avancer en ligne droite, en même temps qu'elle ſaiſit avec ſes dernieres jambes l'intérieur du fourreau, &c.

LA Teigne, qui vient de s'habiller ſous nos yeux, a taillé ſon habit dans le milieu d'une feuille; mais ſouvent elle le taille près des bords.

Alors elle n'a à couper les membranes que d'un côté ſeulement, de celui qui eſt oppoſé aux dentelures; car près du bord de la feuille ces membranes ſont réunies par la Nature bien mieux encore qu'elles ne ſauroient l'être par main d'Inſecte. Elles y ont de plus la courbure qu'exige la forme du fourreau. Le travail de la Teigne ſe réduit donc à vuider les dentelures, à en détacher le parenchyme qui chargeroit trop le fourreau, ou qui, en ſe deſſéchant, en altéreroit la conſtruction.

PENDANT qu'elle eſt occupée à ce travail, emportons avec des ciſeaux les dentelures : que fera la Teigne ? Achevera-t-elle de couper les pieces qui doivent former ſon habit ? Nous venons de les couper du côté des dentelures; il lui reſte à les couper du côté oppoſé : mais remarquez qu'elles ne tiennent plus à la feuille que par ce côté : ſi donc la Teigne va les tailler à cet endroit, elles n'auront plus de ſoutien, elles s'écarteront l'une de l'autre, & il lui ſera impoſſible de les réunir & de leur donner le pli convenable. Encore une fois, que fera la Teigne dans cette circonſtance difficile ? Comment s'y prendra-t-elle pour réparer le déſordre que nous venons d'occaſioner dans ſon travail ?

Comment ſe tirera-t-elle d'une ſituation auſſi nouvelle qu'imprévue ?

Les Inſectes vous ont accoutumé à compter beaucoup ſur les reſſources de leur génie, & vous vous attendez bien que notre Teigne ſaura ſe retourner & trouver quelqu'expédient que vous ne devinez point, & qui remédiera à tout. En effet, elle renonce ſur-le-champ à ſon premier projet : elle abandonne ſa manœuvre ordinaire ; elle change de méthode, préciſément parce qu'il faut en changer. Au lieu de ſe mettre à couper les pieces de ſon habit, elle travaille à réunir avec des fils de ſoie les deux membranes que les ciſeaux ont ſéparées. Enſuite, elle les double avant que de les couper. On voit ces membranes, d'abord fort tranſparentes, devenir de plus en plus opaques & changer de couleur. On reconnoît que cette opacité & ce changement de teinte ſont dûs à la doublure de ſoie que la Teigne a coutume de donner à ſon fourreau. A meſure qu'elle double les membranes, elle les rend plus convexes : elle tend à leur faire repréſenter un tuyau cylindrique, & déja elles le repréſentent aſſez bien. Il ne s'agit preſque plus que de les tailler du côté où elles tiennent à la feuille. Mais comment la Teigne parviendra-t-elle à les tailler à cet endroit ? La doublure eſt

proprement un fourreau de ſoie : en ſe renfermant dans ce fourreau, la Teigne ne s'eſt-elle pas ôtée toute communication avec les membranes qui le recouvrent ? S'aviſera-t-elle donc de fendre la doublure avec ſes dents, pour ſe faire jour au travers ? Point du tout ; elle a eu la précaution de s'y ménager de loin des ouvertures de diſtance en diſtance : elle a laiſſé çà & là des vuides dans la toile : elle fait paſſer ſa tête par ces ouvertures, & taille à ſon gré les membranes, les aſſemble, les unit étroitement, & finit par garnir tous les vuides de la doublure.

En vérité, en voilà, ce ſemble, bien aſſez pour donner une grande idée de l'induſtrie de notre Teigne. Je n'ai pourtant pas achevé d'indiquer tout ce que ſon ſavoir-faire offre d'admirable. Vous vous rappellez que les bouts du fourreau ſont façonnés fort différemment : l'antérieur eſt rond, rebordé & un peu coudé ; le poſtérieur eſt formé de trois pieces triangulaires, que leur reſſort naturel tient rapprochées. Si nous euſſions laiſſé la Teigne à elle-même, elle auroit coupé le bout antérieur de ſon fourreau dans la partie de la feuille la plus voiſine du pédicule ; le bout poſtérieur auroit donc été taillé dans la partie oppoſée. Mais le

retranchement que nous avons fait des dentelures a occaſioné un déſordre qui ne permet plus à la Teigne de ſuivre ſon premier plan. Nous avons ôté à la feuille les contours & les proportions ſur leſquels elle avoit droit de compter, & qui devoient déterminer le lieu & la forme des bouts du fourreau. Elle prend donc l'inverſe de ſa méthode ordinaire : elle va tailler le bout antérieur du côté de la pointe de la feuille, & le poſtérieur du côté qui avoiſine le pédicule.

Si notre Teigne étoit une pure Machine, l'on ne comprendroit pas trop, comment elle varieroit au beſoin ſes opérations. N'en concluons pas néanmoins qu'il n'y a rien du tout ici de machinal, & n'attribuons pas à l'intelligence, ce qui n'eſt que le produit de certaines ſenſations & de la ſtructure du corps. Au fond, la plus grande merveille, la merveille la plus embarraſſante eſt ici le changement de manœuvre de la Teigne. Quand elle taille ſon habit près du bord d'une feuille, elle n'a à couper les membranes que d'un côté ſeulement. Ce côté eſt celui qui couvrira le ventre de l'Inſecte. Le côté oppoſé eſt déja tout façonné des mains de la Nature ; il a tout ce que la Teigne deſire, relativement aux contours & à l'union des mem-

branes. Le dos du fourreau retiendra donc les dentelures de la feuille ; il en ſera orné, & la Teigne n'a autre choſe à faire que de les vuider exactement. Si pendant qu'elle s'occupe de ce travail, on emporte les dentelures par un coup de ciſeau, on ſépare les deux membranes que la Nature avoit étroitement unies ; & l'air a un libre accès dans la mine. Mais aucune Teigne ne s'accommode du contact immédiat de l'air : toutes paroiſſent s'habiller pour s'en mettre à l'abri. Notre Teigne, trop à découvert, travaillera donc d'abord à ſe couvrir. Elle tendra des fils de l'une à l'autre membrane. Elle a d'ailleurs à évacuer la matiere ſoyeuſe que la nourriture reproduit ſans ceſſe : elle vient de dévorer le parenchyme renfermé dans les dentelures, & cet aliment s'eſt converti en ſoie. Le beſoin de filer concourt avec la ſenſation incommode du contact de l'air. La Teigne ne ſe détermine pas ſur des réflexions dont elle eſt abſolument incapable : elle ne s'abſtient pas de couper les membranes, parce qu'elle juge qu'elles lui échapperoient faute d'appui. Ce jugement ſuppoſeroit des connoiſſances, des comparaiſons, des concluſions qui ſont très-évidemment au-deſſus de la portée de l'inſtinct. Qu'on prenne la peine d'approfondir un peu cela, & j'oſe préſumer qu'on ſe rangera à mon avis. Notre Teigne ne ſe met donc à

couper les membranes qu'après les avoir réunies du côté où elles avoient été séparées. Elle a doublé de soie ces membranes, elle a tapissé tout l'intérieur de la mine, & nous demandions comment cette doublure ne lui étoit point en obstacle lorsqu'il est question de couper les membranes? Nous avons remarqué qu'elle laissoit çà & là des vuides dans la doublure pour y faire passer sa tête, & nous avons admiré cette sorte de prudence. Un illustre Observateur (3) l'a sans doute trop exaltée, ainsi que les autres procédés de cet Insecte industrieux: peu s'en faut qu'il ne lui ait accordé une portion de cette intelligence qui brille avec tant d'éclat dans ses savantes recherches. Ces vuides, qui paroissent si habilement ménagés dans la doublure, ne seroient-ils point l'effet tout simple de la disette de soie? La Teigne doit s'en être fort épuisée en réuniſſant les membranes & en les doublant: il ne seroit donc pas merveilleux que la doublure ne fût pas par-tout continue; elle ne l'est pas effectivement, & nous nous plaisons à en faire honneur à la prudence de la Teigne.

(3) †† Mr. de Reaumur. Aucun Naturaliste n'avoit suivi avec autant de sagacité que lui le travail des Teignes, & cette partie de son grand Ouvrage est une des plus intéressantes branches de l'Histoire des Insectes.

Nous ignorons, ſi dans ce changement de manœuvres, le bout antérieur du fourreau prend toujours la place du poſtérieur, & réciproquement : mais le renverſement en queſtion ne prouveroit autre choſe, ſinon qu'en retranchant les dentelures, nous avons fait perdre à une des extrémités de la feuille les contours que requiert la façon du bout antérieur de l'habit. L'extrémité oppoſée de la mine préſente apparemment des conditions plus favorables à cette partie du travail, & il eſt aſſez naturel qu'elles déterminent la Teigne à y placer l'ouverture antérieure de ſon fourreau, &c.

Quoique la Teigne s'épargne du travail en faiſant entrer les dentelures dans la façon de ſon habit, il arrive pourtant aſſez ſouvent qu'elle préfere de le tailler en pleine feuille. Si l'on y prend garde, l'on reconnoîtra qu'elle en uſe ainſi lorſque les bords ont commencé à ſe deſſécher. Il eſt dans l'ordre de ſes ſenſations que certaines circonſtances influent ſur ſes manœuvres. Il n'eſt pas moins dans l'ordre de la méchanique de ſes organes, que certaines opérations qui nous étonnent, en réſultent comme de leur principe immédiat.

On inſiſte un peu trop ſur la coupe de l'habit :

on la repréſente comme plus recherchée qu'elle ne l'eſt en effet. Ce n'eſt pourtant, au fond, que celle d'un tuyau à-peu-près cylindrique, dont le corps alongé de l'Inſecte pourroit déterminer méchaniquement la forme & les dimenſions, ſans qu'il fût beſoin d'admettre ici la moindre ombre d'intelligence. Il eſt vrai, que les bouts de ce tuyau ſont façonnés différemment; mais les parties de la feuille dans leſquelles ces bouts ſont taillés, doivent influer plus ou moins ſur la façon de chaque bout, &c.

CHAPITRE XXXVIII.

Réflexions ſur l'induſtrie des Animaux.

JE n'ai fait qu'indiquer les ſources où je voudrois puiſer la ſolution de tous les petits problèmes que nous offre le travail de la Teigne des feuilles. Ce ſeroit dans des ſources analogues que je puiſerois la ſolution de tant d'autres problèmes que nous préſentent les Animaux dont l'induſtrie nous frappe le plus. Je ne ſuppoſerois pas qu'ils ſe propoſent, comme nous, un but dans leurs diverſes opérations : les idées de but, de fin, de moyen ſont beaucoup trop réfléchies pour entrer dans la tête d'un Animal, qui

qui ne ſauroit avoir des notions proprement dites, & qui eſt réduit à de pures ſenſations. Il nous eſt ſi naturel de réfléchir, parce qu'il nous eſt ſi naturel de lier nos idées à des ſignes, & d'en former des notions de tout genre, que nous imaginons ſans peine que l'Animal réfléchit auſſi. Nous le faiſons donc agir préciſément par les mêmes motifs qui nous détermineroient en cas pareil. Avons-nous à rendre raiſon de quelque procédé remarquable où nous croyons découvrir des vues fines? nous ſuppoſons auſſi-tôt de telles vues; nous y joignons de petits raiſonnemens implicites, & tout s'explique le plus heureuſement du monde; mais, c'eſt comme je l'ai dit ailleurs, en transformant, ſans y ſonger, l'Animal en Homme, de pures ſenſations en vraies notions. Si l'Animal pouvoit, ſans ceſſer d'être Animal, juger de nos propres opérations, il eſt à croire qu'il ne nous prêteroit point les motifs qui nous déterminent. Il nous feroit agir comme il agit lui-même; il nous transformeroit en purs Animaux (1).

(1) †† Nous amaſſons des proviſions pour l'Hiver, & divers Animaux en amaſſent auſſi. Nous en concluons auſſi-tôt que ces Animaux prévoient, comme nous, qu'il viendra un temps où ces proviſions leur deviendront néceſſaires: mais un Animal qui n'a jamais vu d'Hiver, peut-il en preſſentir au milieu de l'Été la futurition? Si donc il recueille avec beaucoup d'activité des grains de différentes Eſpeces, ce n'eſt point du tout qu'il veuille

Ce ne ſeroit donc pas du but que nous découvrons dans l'ouvrage d'un Animal induſ-

ſe précautionner contre un avenir fâcheux qu'il ne connoît point & ne peut connoître ; mais c'eſt uniquement parce qu'il aime ces grains, & qu'il goûte un certain plaiſir à les charier, à les amaſſer dans ſa retraite, à les y empiler : & tout cela dérive eſſentiellement de ſa conſtitution, qui eſt déterminée elle-même par la place qu'il devoit occuper dans le Syſtême de l'Animalité. A l'approche de l'Hiver, l'Animal ſe trouve ainſi bien approviſionné, ſans avoir ſongé ni pu ſonger un inſtant à faire des proviſions.

On obſerve, que les Mulots amaſſent plus ou moins de proviſions, ſuivant que le ſouterrein dans lequel ils ſe ſont logés eſt plus ou moins ſpacieux. Ce n'eſt donc pas à leurs beſoins qu'ils proportionnent les proviſions ; mais c'eſt uniquement à la capacité du lieu. Ces proviſions font ſur leurs ſens des impreſſions agréables ; ils en amaſſent autant que le lieu & la ſaiſon le leur permettent. (Chap. XXX, Note 2.)

Nous admirons le diſcernement du Moineau, qui ſe diſpenſe de donner une calotte à ſon nid lorſqu'il l'établit ſous un toit ou ſous quelqu'autre abri : (Chap. XXVIII, Note 6.) mais, ſi l'on y faiſoit bien attention, l'on reconnoîtroit, ſans doute, que ſi le Moineau ſe conduit ainſi dans ce cas, ce n'eſt point du tout qu'il juge que la calotte ſeroit alors ſuperflue : un tel jugement ſuppoſeroit évidemment une réflexion dont il eſt abſolument incapable, mais très-probablement l'Oiſeau ne ſe diſpenſe des frais de la calotte, que parce qu'il manque de place pour la conſtruire : il eſt apparemment gêné par le toit ou par l'abri.

Nous admirons encore le ſoin que les Femelles de divers Animaux prennent de leurs Petits, la maniere dont elles les élevent, le courage avec lequel elles les défendent, &c. (Part. XI, Chap. VI, VII, & les Notes.) Notre ſenſibilité s'émeut à la vue de tous ces faits, & nous nous complaiſons à oppoſer

trieux, que je voudrois partir pour rendre raiſon de cet ouvrage. Je ne dirois pas, l'Araignée tend une toile pour prendre des Mouches ; mais je dirois, l'Araignée prend des Mouches, parce qu'elle tend une toile, & elle tend une toile, parce qu'elle a beſoin de filer. Le but n'en eſt pas moins certain, moins évident ; ſeulement ce n'eſt pas l'Animal qui ſe l'eſt propoſé ; c'eſt l'AUTEUR de l'Animal. Par cette maniere philoſophique de raiſonner, que perdroit la Théo-

l Hirondelle ou la Taupe aux Meres barbares de notre Eſpece : mais nous ne ſongeons pas que l'attachement des Femelles des Animaux pour leurs Petits à une tout autre origine que celle que nous lui prêtons trop gratuitement : tout a été diſpoſé ici de maniere que les Petits ſont pour les Meres des ſources toujours fécondes de ſenſations agréables ou d'utilités directes. (Voyez Part. XI, Chap. VIII.)

Enfin, nous ſommes touchés à la vue d'un Animal qui leche à pluſieurs repriſes la main qui l'a gratté ou qui l'a careſſé, & nous ne manquons point d'enviſager ſon action comme une marque de ſa reconnoiſſance, tandis qu'elle pourroit n'être qu'une ſuite toute naturelle du plaiſir que l'Animal trouve à lécher, ou de l'habitude qu'il en a contracté.

Et combien d'autres actions des Animaux, que nous nous plaiſons à embellir des couleurs de la réflexion ou de celles du ſentiment, & qui ne tiennent ni à la réflexion ni au ſentiment ! Mais pour n'y être jamais trompé, il faut avoir plus de Pſychologie dans l'eſprit, que n'en a le commun des Spectateurs. En un mot, toute explication qui ſuppoſera quelque moralité dans l'Animal, choquera la bonne Philoſophie ; car la moralité ſuppoſe eſſentiellement des notions ou des idées *réfléchies*, & il eſt bien prouvé que l'Animal ne ſauroit former de telles idées.

logie Naturelle ? N'y gagneroit-elle pas, au contraire, plus d'exactitude, plus de préciſion ? Raiſonnons donc ſur les opérations des Animaux, comme ſur leur ſtructure. La même SAGESSE qui a conſtruit & arrangé avec tant d'art leurs divers organes, qui les a fait concourir à un but déterminé, a fait de même concourir à un but les diverſes opérations qui ſont les réſultats naturels de l'économie de l'Animal. Il eſt dirigé vers ſa fin par une MAIN inviſible : il exécute avec préciſion & du premier coup, des ouvrages que nous admirons ; il paroît agir comme s'il raiſonnoit, ſe retourner à propos, changer de manœuvre au beſoin, & dans tout cela il ne fait qu'obéir aux reſſorts ſecrets qui le pouſſent ; il n'eſt qu'un inſtrument aveugle qui ne ſauroit juger de ſa propre action, mais qui eſt monté par cette INTELLIGENCE ADORABLE qui a tracé à chaque Inſecte ſon petit cercle, comme elle a tracé à chaque Planete ſon orbite. Lors donc que je vois un Inſecte travailler à la conſtruction d'un nid, d'une coque ou d'un fourreau, je ſuis ſaiſi de reſpect, parce qu'il me ſemble que je ſuis à un ſpectacle où le SUPRÊME ARTISTE eſt caché derriere la toile.

LES Animaux qui ont un plus grand nombre

de ſens, ont un plus grand nombre de ſenſations & de ſenſations diverſes. Et comme ils les diſtinguent, ils les comparent à leur maniere. De là naiſſent des jugemens qui paroiſſent tenir de la réflexion, & qui ne ſont pourtant que de ſimples réſultats de la comparaiſon de certaines idées purement ſenſibles.

J'AI encore quelques traits frappans à raconter de l'induſtrie des Animaux. Je ne reviendrai pas à prémunir mon Lecteur contre les ſéductions de la ſurpriſe & de l'admiration : j'en ai dit aſſez pour qu'il ne puiſſe plus s'y méprendre (2). Je l'ai mis à portée de traduire en langage philoſophique les expreſſions peu exactes qui m'ont échappé ou qui pourroient m'échapper dans la ſuite. Il eſt permis de s'écarter un peu de la rigueur philoſophique, & d'accorder quelque choſe à l'intérêt de la narration, lorſqu'on a eu ſoin de fixer le ſens des mots, & de donner, pour ainſi dire, la clef du diſcours.

(2) Conſultez les Chapitres XIX, XXVII, XXX de la Partie XI, & le Chap. XXXIV de cette Partie.

CHAPITRE XXXIX.

L'Abeille qui conſtruit un nid avec une ſorte de glu.

EN parcourant rapidement les divers procédés des Inſectes relatifs à la maniere dont ils logent leurs œufs, j'ai parlé d'un nid admirable qu'une Abeille ſolitaire conſtruit avec des morceaux de feuille (1). J'ai dit qu'il eſt compoſé d'une ſuite de cellules, ſemblables à des dez à coudre, & emboîtées les unes dans les autres comme les dez le ſont dans les boutiques. J'ai indiqué l'art prodigieux qui brille dans la conſtruction de ce nid, dont chaque cellule eſt formée de pluſieurs fragmens de feuilles, coupés, roulés & aſſemblés avec autant de préciſion que de propreté, & capables comme un vaſe bien clos, de contenir une liqueur ſans la laiſſer jamais ſe répandre. Enfin, j'ai fait remarquer, que cet aſſemblage de cellules ſi régulièrement & ſi adroitement découpées, eſt recouvert d'une enveloppe générale, de même matiere que les cellules, & qui imite la forme d'un étui.

(1) Part. XI, Chap. V.

Ce nid, dont je viens de retracer l'idée, eſt caché ſous terre. L'Abeille y creuſe une cavité proportionnée à la grandeur de l'étui. C'eſt auſſi ſous terre qu'il faut aller chercher le nid d'une autre Abeille ſolitaire, dont l'induſtrie ne le cede guere à celle de la Coupeuſe de feuilles, & qui travaille à-peu-près ſur le même modele. Son nid eſt de même compoſé de pluſieurs cellules en forme de dez, enchâſſées habilement les unes dans les autres; mais qui ne ſont point recouvertes d'une enveloppe commune. Chaque cellule eſt faite de deux ou trois membranes, appliquées les unes ſur les autres, & dont la fineſſe eſt inexprimable.

Examinées au microſcope, elles ne préſentent rien qui puiſſe faire ſoupçonner qu'elles ont été priſes ſur des Plantes. On les diroit purement ſoyeuſes, & de la plus belle ſoie blanche. Mais aucune Abeille ne file : quelle eſt donc la matiere de ces membranes ſi fines, ſi luſtrées, ſi blanches ?

En obſervant attentivement la cavité où le nid eſt renfermé, on la trouve enduite d'une légere couche de matiere luſtrée, préciſément ſemblable à celle des cellules, & qu'on pourroit comparer à cette humeur viſqueuſe que les Li-

maçons répandent ſur leur route. Notre Abeille a, ſans doute, une ample proviſion de cette ſorte de glu qu'elle met en œuvre avec tant d'art : mais comme elle travaille ſous terre & dans une profonde obſcurité, l'on n'eſt point encore parvenu à la ſurprendre à l'ouvrage. Malgré l'extrême fineſſe de leurs membranes, les cellules ne laiſſent pas d'avoir aſſez de conſiſtance, & l'on peut les manier ſans altérer leur forme. La pâtée qu'elles renferment, ſoutient leurs parois & les empêche de céder.

CETTE pâtée eſt une eſpece de cire médiocrement détrempée, & qui quelquefois ne l'eſt point du tout. Un œuf eſt dépoſé au fond de chaque cellule. Après être éclos, le Ver ſe trouve au milieu d'une abondante proviſion de nourriture. Il la conſume avec une ſorte d'intelligence, & paroît ſe conduire comme s'il vouloit conſerver aux parois de ſa loge un appui néceſſaire : il ne creuſe pas la pâtée en tout ſens ; il la creuſe perpendiculairement de bas en haut : il s'y pratique ainſi un petit tuyau qui en occupe l'axe ou le centre. A meſure qu'il croît, il agrandit ce tuyau ; il l'étend en longueur & en largeur. Il arrive enfin aux parois ; alors il a conſumé toute la pâtée & n'a plus à croître.

CHAPITRE XL.

L'Abeille tapiſſiere.

DIVERSES Abeilles ſolitaires ſe bornent à percer la terre. Elles y creuſent des cavités cylindriques dont elles poliſſent les parois. Elles y pondent un œuf, & y amaſſent une quantité ſuffiſante de nourriture.

IL eſt une autre Eſpece de ces Mouches qui percent la terre, dont l'induſtrie eſt beaucoup plus remarquable. Elle ne ſe contente pas, comme les autres, d'une cavité toute nue. Quand on viſite l'intérieur du logement immédiatement après qu'il a été conſtruit, on eſt agréablement ſurpris de le voir tendu en entier d'une tapiſſerie du plus beau ſatin cramoiſi, appliquée ſur les parois comme nos tapiſſeries le ſont ſur les murs de nos appartemens, & avec plus de propreté encore. Non-ſeulement l'Abeille tapiſſe ainſi tout l'intérieur de ſon logement; mais elle étend encore de ſemblables tapis autour de l'entrée, à deux ou trois lignes de diſtance. Nous avons obſervé quantité de Chenilles qui tapiſſent de ſoie l'intérieur de leur coque ou de leur four-

reau (1) : notre Abeille eſt le ſeul Inſecte connu, qui, à proprement parler, tapiſſe ſon nid comme nous tapiſſons nos chambres. C'eſt donc à bon droit que cette Mouche induſtrieuſe a reçu le nom de tapiſſiere.

Vous êtes impatient de ſavoir où elle ſe pourvoit de la riche tapiſſerie : voyez ces fleurs de Coquelicot nouvellement épanouies : remarquez qu'elles ont été échancrées çà & là. Comparez-les avec la tapiſſerie dont vous cherchez à connoître le tiſſu ; vous ne pouvez vous y méprendre : cette tapiſſerie n'eſt autre choſe que des fragmens de fleurs de Coquelicot, & voilà l'origine ſecrete de ces échancrures que vous remarquez ſur les Coquelicots qui avoiſinent le nid. Votre curioſité n'eſt point ſatisfaite ; vous voulez que nous ſuivions un peu le travail de notre adroite tapiſſiere.

Le trou qu'elle creuſe perpendiculairement dans la terre, eſt d'environ trois pouces de profondeur. Il eſt exactement cylindrique juſqu'à ſept à huit lignes du fond. Là, il commence à s'évaſer, & s'évaſe de plus en plus. Lorſque l'Abeille a achevé de lui donner les

(1) Chap. IV & ſuivans de cette Partie.

proportions convenables, elle ſonge à le tapiſſer.

DANS cette vue, elle va couper avec beaucoup d'adreſſe ſur les fleurs du Coquelicot, des morceaux de pétales (2) de figure ovale, qu'elle ſaiſit avec ſes jambes & tranſporte dans ſon trou. Ces petites pieces de tapiſſerie y arrivent fort chiffonnées : mais la tapiſſiere ſait les étendre, les déployer & les appliquer ſur les parois avec un art étonnant.

ELLE applique au moins deux couches de pétales : elle tend donc deux tapiſſeries l'une ſur l'autre. Si elle va s'en pourvoir ſur les fleurs du Coquelicot plutôt que ſur celles de quantité d'autres Plantes, c'eſt que les fleurs du Coquelicot réuniſſent à un plus haut degré toutes les qualités qu'exige l'uſage auquel la Mouche les deſtine.

QUAND les pieces que l'Abeille a coupées & tranſportées ſe trouvent trop grandes pour la place qu'elles doivent occuper, elle en retranche tout le ſuperflu, & tranſporte les retailles hors du logement.

(2) C'eſt le nom que les Botaniſtes donnent aux feuilles des fleurs.

Après qne la tapiſſerie a été tendue, l'Abeille remplit le nid de pâtée juſqu'à ſept à huit lignes de hauteur. C'eſt tout ce qu'il en faut pour la nourriture du Ver. La tapiſſerie eſt deſtinée à prévenir le mêlange des grains de terre avec la pâtée.

Vous vous attendez, ſans doute, que la prudente Mouche ne manquera pas de fermer exactement l'ouverture du nid pour en interdire l'entrée à divers Inſectes friands de pâtée : elle n'y manque point en effet; & il vous eſt actuellement impoſſible de reconnoître ſur la ſurface du terrein le lieu où eſt le nid dont vous venez de contempler la conſtruction, tant l'Abeille a ſu adroitement le boucher. Cette petite pierre blanche étoit au bord du trou ou fort près; elle n'a pas changé de place; elle nous indique donc l'endroit au-deſſous duquel eſt le nid que nous cherchons. Il ſemble donc que nous n'ayions qu'à enlever une légere couche de terre pour mettre à découvert l'entrée de ce trou qui a été ſi bien rebouché. Rien de plus facile & de moins douteux. Quelle eſt votre ſurpriſe! vous avez déja enlevé plus de deux pouces de terre, & vous ne trouvez pas le moindre veſtige de trou ni de tapiſſerie. Que veut dire ceci? Qu'eſt devenu ce nid ſi artiſtement conſtruit, ſi proprement

tapiſſé, & qui avoit plus de trois pouces de profondeur? Il n'y a que quelques heures que vous en admiriez l'ingénieuſe ordonnance, & maintenant tout a diſparu, au point que vous n'en découvrez pas la plus légere trace. Quel eſt donc ce myſtere? Le voici.

LORSQUE l'Abeille a pondu & qu'elle a fini d'amaſſer la pâtée, elle détend la tapiſſerie, elle la replie ſur la pâtée, elle l'en enveloppe, à-peu-près comme nous replions ſur lui-même un cornet de papier à moitié plein. L'œuf & la pâtée ſe trouvent ainſi renfermés dans un petit ſac de fleurs. La Mouche n'a plus qu'à garnir de terre tout l'eſpace vuide qui eſt au-deſſus du ſac, & c'eſt ce qu'elle exécute avec une activité merveilleuſe, & ſi exactement qu'on ne reconnoît plus la place du nid.

CHAPITRE XLI.

La Guêpe-maçonne.

IL ne faut pas confondre cette Mouche avec l'Abeille maçonne dont j'ai parlé (1). Le travail de ces deux Mouches differe autant que leur forme. La Guêpe que je veux vous faire connoître, a reçu le ſurnom d'Ichneumon, de ſa reſſemblance avec les Mouches-ichneumons qui vont dépoſer leurs œufs dans le corps des Inſectes vivans (2). Elle vit ſolitaire, & quoique ſes procédés n'aient rien de commun avec ceux des Guêpes-républicaines (3), ils ne leur cedent guere en induſtrie. L'on ne ſera pas fâché que j'entre ici dans quelque détail.

NOTRE Guêpe-ichneumon creuſe dans un ſable dur un trou d'environ deux pouces de profondeur. Son travail ne ſe borne point à excaver ce trou, à lui donner une forme cylindrique, à en polir les parois, à tranſporter au

(1) Part. XI, Chap. V.

(2) Ibid.

(3) Part. XI, Chap. XXIII.

dehors le ſable qu'elle en tire : elle forme de ce ſable un tuyau qui a pour baſe l'ouverture du trou, & qui s'éleve au-deſſus à une hauteur à-peu-près égale à la profondeur de ce dernier. Ce tuyau paroît être un ouvrage important & qui doit durer. Il eſt fait avec art, en maniere de filagrammes ou de guillochis.

La Guêpe travaille dans un ſable fort dur, & que l'ongle auroit peine à entamer. Quoiqu'elle ſoit pourvue de très-bonnes dents, ce n'eſt point de ces dents qu'elle ſe ſert pour percer le ſable, & en détacher les grains comme de force : elle a un moyen très facile & très-ſimple d'en venir à bout. Elle ſait le ramollir, le réduire en une pâte molle, & qui ſe laiſſe manier comme elle veut. Elle y répand une liqueur pénétrante dont elle a proviſion.

Elle pêtrit avec ſes dents & ſes premieres jambes les molécules qu'elle a ramollies & détachées. Elle en compoſe une petite pelotte, un peu alongée. Elle poſe cette premiere pelotte ſur le bord du trou qu'elle a commencé à creuſer, & elle jette ainſi les premiers fondemens du tuyau qu'elle ſe propoſe d'élever. Il ſera tout compoſé de pareilles pelottes, arrangées circulairement les unes à côté des autres

& les unes ſur les autres. En mettant en place de nouvelles pelottes, la Guêpe les étend un peu avec ſes dents & ſes jambes.

ELLE interrompt fréquemment ſon travail, ſans doute, parce que la liqueur détrempante s'épuiſe aſſez promptement. Elle quitte ſon attelier, s'envole & revient quelques momens après ſe remettre à l'ouvrage. Elle a été ſe pourvoir de nouvelle liqueur.

L'OUVRAGE va très-vîte, & beaucoup plus vîte qu'on ne l'imagineroit. En peu d'heures, elle a creuſé un trou de deux à trois pouces de profondeur, & bâti au-deſſus un tuyau qui a autant d'élévation ou à-peu-près.

ELLE conſtruit ſucceſſivement pluſieurs de ces nids, qui ont tous la même forme eſſentielle & la même fin.

APRÈS s'être élevé perpendiculairement au-deſſus du trou, le tuyau ſe courbe un peu, & ſe courbe enſuite de plus en plus, en conſervant toujours ſa forme cylindrique.

LA Mouche ne proportionne pas conſtamment l'élévation du tuyau à la profondeur du trou :

trou : ſouvent il eſt moins élevé que celui-ci n'eſt profond. Ce n'eſt pas manque de pelottes ; on la voit continuer d'en pêtrir ; mais, au lieu de les mettre en place, elle les jette hors du tuyau.

Vous devinez aiſément que le trou que la Guêpe-maçonne creuſe perpendiculairement dans un maſſif de ſable, eſt un nid deſtiné à recevoir un œuf. Mais vous ne devinez point l'uſage du petit édifice en filagrammes, bâti au-deſſus, & qui ſuppoſe bien plus de travail & d'induſtrie que la ſimple opération d'excaver.

La ſuite des manœuvres de notre laborieuſe Ouvriere vous apprendra que ce tuyau, ſi artiſtement façonné, n'eſt qu'une eſpece d'échafaudage qui ne doit pas ſubſiſter. Les pelottes qui le compoſent ſont pour la Mouche ce qu'un aſſemblage de matériaux ou de moëllons eſt pour un Maçon. Notre Maçonne les a arrangées ainſi afin de les avoir plus à ſa portée. Elle s'en ſert pour reboucher ou combler le trou, après qu'elle y a dépoſé un œuf. Elle démolit donc le petit édifice, & bientôt il n'en reſte plus de veſtiges.

Cette eſpece de petite tour a encore un autre uſage bien important ; elle prévient les

entrepriſes des Ichneumons. On ſait que ces Mouches rodent ſans ceſſe autour des nids des Inſectes pour y dépoſer leurs œufs : la petite tour leur rend plus difficile l'accès du nid de la Maçonne ; elles n'oſent s'engager dans un défilé ſi long & ſi obſcur.

Un Ver doit éclorre de l'œuf que la Guêpe-maçonne a pondu au fond de ſon trou. La niche eſt bien murée : le Ver ne pourroit ni recevoir ni aller chercher ſa nourriture : la Mouche l'a approviſionné. Il repoſe au fond du trou : la Mouche a ſu réſerver un eſpace de ſept à huit lignes qu'elle n'a point muré, & qu'elle a rempli de proviſions de bouche.

Quelqu'un qui ignoreroit l'Hiſtoire des Inſectes n'imagineroit pas de quelle nature ſont ces proviſions, & le Naturaliſte qui le ſait, ne l'admire pas moins. Si l'on ouvre le nid avec précaution, on remarquera que la partie qui n'eſt point murée, a été remplie de petits Vers vivans, de couleur verte & ſans jambes, arrangés adroitement les uns ſur les autres, & contournés en maniere de cerceaux. Ces Vers rempliſſent toute la capacité de la petite caverne. L'on en compte ordinairement dix à douze dans chaque nid : c'eſt préciſément la quantité de

proviſion néceſſaire à l'accroiſſement du Petit de la Guêpe. Dès qu'il eſt éclos, il attaque le Ver le plus proche de lui; il lui perce le ventre, & le ſuce tout à ſon aiſe. Il vient enſuite à celui qui étoit poſé immédiatement au-deſſus, & quand il a achevé de conſumer ainſi toute la proviſion, il n'a plus à croître, il eſt ſur le point de ſe transformer. Le plus habile Pourvoyeur de vivres ne s'y prendroit pas mieux que le fait notre Mere-guêpe: elle a été inſtruite par CELUI qui pourvoit aux beſoins de toutes ſes Créatures.

LA Guêpe connoît les Vers qui ont été appropriés à la ſubſiſtance de ſa Famille. Elle va à la chaſſe de ces Vers; elle les ſaiſit délicatement, & les tranſporte dans ſon nid ſans les bleſſer. Tous ceux qu'elle y renferme ſont de la même Eſpece, & tous ſont dans l'âge où ils n'ont plus à croître. Si elle les renfermoit plus jeunes, ils périroient de faim dans la caverne, ſe corromproient enſuite, & feroient périr à ſon tour le Petit. Elle ne choiſit donc parmi les Vers d'une même Eſpece, que ceux qui ſont parvenus à l'âge où ils peuvent ſoutenir un aſſez long jeûne. Tous ne ſont pas néanmoins de la même grandeur. Quand la Guêpe approviſionne ſon Petit avec les plus grands Vers, elle lui en donne moins; elle lui en donne davantage s'ils ſont

de plus petite taille. On diroit qu'elle entend à compenſer la grandeur par le nombre & réciproquement (4).

(4) †† Nous venons de voir une Guêpe-ichneumon qui renferme dans ſon nid toute la proviſion d'alimens dont ſon Petit aura beſoin pendant le cours de ſa vie : mais il eſt une Guêpe de la même Famille, qui ne ſe conduit pas ainſi, & qui nourrit ſon Petit à pluſieurs repriſes. Après avoir renfermé dans ſon nid une Chenille vivante, elle le ferme ſoigneuſement, & au bout de quelques jours, lorſque la Chenille a été conſumée, elle rouvre le nid, y renferme une ſeconde Chenille vivante, le bouche encore, & continue de la ſorte à approviſionner ſa chere Progéniture.

C'eſt à la claſſe aſſez nombreuſe des Guêpes-ichneumons qu'appartiennent ces Mouches guerrieres qui vengent leurs ſemblables des inſultes des Araignées. Elles fondent hardiment dans leur toile, les ſaiſiſſent ſur le deſſus du corps, les percent de leur aiguillon, les étourdiſſent, les arrachent de leur filet, & les tranſportent dans leur nid, où elles les claquemurent pour ſervir de pâture à leur Famille.

D'autres Guêpes-ichneumons ne craignent point de confier leur Géniture aux Araignéees. Elles dépoſent leur œuf ſur le corps de celles-ci, & le Ver qui en éclot vit aux dépens de l'Inſecte redoutable, qu'il n'a pourtant point à redouter.

CHAPITRE XLII.

La Fourmilion.

Il n'eſt point d'Inſecte plus célebre par ſon induſtrie, que l'eſt celui-ci. Son nom eſt lié dans l'eſprit à l'idée de procédés très-ingénieux, dont on ne manque pas d'entretenir les Jeunes gens auxquels on ſouhaite d'inſpirer quelque admiration pour les merveilles de la Nature. Je connois un Naturaliſte, qui n'ayant pas encore dix-ſept ans, commença par douter de ces procédés, & n'eut aucun repos qu'il ne les eût vérifiés: il les vérifia, les admira, en découvrit de nouveaux, & devint bientôt le Diſciple & l'Ami du PLINE de la France (1). En crayonnant dans ſes ouvrages les découvertes de cet Homme illuſtre,

(1) †† Mr. de REAUMUR, mort en 1757, & avec leque l'Auteur avoit été en commerce de Lettres pendant plus de dix-neuf ans. Il communiquoit dans le plus grand détail à cet excellent Naturaliſte tout ce qu'il découvroit, & les réponſes amicales qu'il en recevoit, l'excitoient de plus en plus à pourſuivre ſes recherches. Il a publié en 1779 la ſuite des Obſervations qu'il avoit faites ſur les Inſectes dans ſa premiere jeuneſſe, & dont il avoit déja publié une partie en 1745. La plupart de ſes recherches étoient demeurées bien imparfaites; mais des Naturaliſtes plus habiles & plus heureux ont fait depuis en ce genre, beaucoup plus qu'il n'auroit pu faire.

il a jetté quelques fleurs ſur ſon tombeau, foibles expreſſions de ſes regrets & d'un ſouvenir qui lui ſera toujours cher.

Tout le monde ſait que le Fourmilion ſe creuſe dans un ſable ſec ou dans une terre fort pulvériſée, une foſſe en maniere de trémie ou d'entonnoir, au fond de laquelle il ſe tient en embuſcade. Comme il ne marche qu'à reculons, il ne peut pourſuivre ſa proie : il lui tend donc un piege, & c'eſt ſur-tout ſur la Fourmi qu'il fonde ſes eſpérances. Il eût été mieux nommé *Fourmi-renard*, ſi ce nom n'avoit paru trop long.

A l'ordinaire, il demeure caché ſous le ſable : ſoit qu'il repoſe au fond de ſon entonnoir ou qu'il change de place, il ne montre jamais que le bout de ſa tête. Elle eſt quarrée, platte, & armée de deux petites cornes mobiles, en forme de crochets ou de pinces très-fines, dont la ſinguliere ſtructure étonne l'Obſervateur, & lui montre à quel point la Nature eſt admirable juſques dans ſes moindres Productions. L'anatomie du Fourmilion n'eſt point notre objet actuel : vous êtes moins curieux de ſavoir comment il eſt fait, que ce qu'il fait. Vous ſavez en général, que ſa forme tient un peu de celle du Cloporte, & que ſon corps porté ſur ſix jambes,

& terminé en pointe, eſt compoſé d'une ſuite d'anneaux purement membraneux. C'eſt tout ce qu'il vous importe de connoître de ſa ſtructure; un plus grand détail ſeroit ſuperflu.

Pour creuſer ſon entonnoir, le Fourmilion commence par tracer dans le ſable un ſillon circulaire, dont l'enceinte déterminera l'ouverture de l'entonnoir. Il y a toujours un certain rapport entre cette ouverture & la profondeur de l'entonnoir : celle-ci eſt ordinairement de neuf lignes, quand celle-là eſt de douze. En général, la grandeur des entonnoirs varie beaucoup : les plus grands ont environ deux à trois pouces d'ouverture; les plus petits, deux à trois lignes. Ce n'eſt pas une regle que les plus grands Fourmilions creuſent les plus grandes foſſes : ſouvent un Fourmilion de grandeur médiocre ſe trouve logé dans une très-grande foſſe; & un très-grand Fourmilion dans une foſſe de grandeur médiocre : cela tient à des circonſtances particulieres, qu'il ſeroit inutile d'indiquer.

Après avoir déterminé l'ouverture de ſon entonnoir, ou tracé le premier ſillon circulaire, le Fourmilion en trace un ſecond concentrique au premier. Vous comprenez, que ſon travail doit aboutir à enlever tout le ſable renfermé

dans l'enceinte du premier ſillon. Imaginez donc un cône de ſable, dont le diametre ſoit égal à celui de l'enceinte, & dont la hauteur égale la profondeur que doit avoir l'entonnoir; c'eſt ce cône de ſable qu'il s'agit d'enlever.

C'EST avec ſa tête, comme avec une pelle, que l'Inſecte en vient à bout. Vous avez vu qu'elle eſt quarrée & platte; ſa forme répond donc très-bien à cette fonction. Il ſe ſert d'une de ſes premieres jambes pour la charger de ſable, & quand elle en eſt fort chargée, il le lance bruſquement hors de l'enceinte. Toute cette petite manœuvre s'exécute avec une promptitude & une adreſſe ſurprenantes: un Jardinier n'opere pas ſi vîte ni ſi bien avec ſa bèche & ſon pied, que le Fourmilion avec ſa tête & ſa jambe.

JE n'ai preſque pas beſoin de vous dire, que la ſuite des manœuvres de notre Inſecte ne ſera que la répétition de celle que je viens d'eſquiſſer. Il tracera de nouveaux ſillons, toujours concentriques aux premiers. Le diametre de l'enceinte diminuera auſſi graduellement, & le Fourmilion deſcendra de plus en plus dans le ſable.

MAIS, je ne dois pas négliger de vous faire remarquer, qu'il ne charge jamais ſa tête que

du ſable renfermé dans l'enceinte du ſillon qu'il trace actuellement. Il lui ſeroit pourtant tout auſſi facile de la charger du ſable qui eſt à l'extérieur de l'enceinte, puiſque la jambe qui répond à ce côté du ſillon, eſt capable des mêmes fonctions que la jambe correſpondante. Vous ne le voyez point s'y méprendre; il paroît ſavoir que pour parvenir à creuſer ſa trémie, il ne doit enlever que le ſable compris dans l'aire ou l'enceinte du ſillon. Il n'y a donc que la jambe qui eſt du côté de l'aire, qui ſoit en action; l'autre ſe repoſe: celle-ci travaillera à ſon tour, quand celle-là ſera fatiguée. L'on voit alors le Fourmilion ſe retourner bout par bout ou traverſer l'aire en ligne droite, & commencer un nouveau ſillon en ſens contraire. Par ce changement de ſituation, la jambe qui étoit d'abord placée à l'extérieur de l'aire, ſe trouve placée vers l'intérieur, & prête à manœuvrer.

Il arrive ſouvent qu'en creuſant ſa trémie, le Fourmilion rencontre de gros grains de ſable ou de petits grumeaux de terre ſeche: il n'a garde de les laiſſer dans la trémie; ils ſerviroient d'échelons aux petits Inſectes qui tenteroient d'en ſortir. Il en charge ſa tête, & par un mouvement ſubit & bien calculé, il les projette hors du trou.

Si au lieu de ces corps assez légers, il rencontre de petites pierres trop pesantes pour être lancées avec sa tête, il sait s'en débarrasser par un moyen nouveau & fort singulier. Il sort de terre, & se montre tout entier à découvert. Il va ainsi à reculons, jusqu'à ce que le bout de son derriere ait atteint la pierre : il semble alors la tâter ; il essaie de la pousser & de la soulever : il redouble ses efforts, parvient à la charger sur son dos, maintient habilement l'équilibre par des mouvemens prompts & alternatifs de ses anneaux, gagne avec sa charge le pied de la rampe, la gravit, porte la pierre à quelque distance du trou, revient dans le trou, & acheve de le creuser.

Cependant, malgré tout son savoir-faire en tours d'équilibre, la pierre lui échappe quelquefois au moment qu'il est sur le point d'arriver au haut de la rampe. Il ne se rebute pas, il descend, va chercher la pierre, la charge de nouveau sur son dos, regagne la rampe, remonte, se décharge, & retourne à son travail.

Sa patience est presque inépuisable : on l'a vu répéter six à sept fois de suite les mêmes manœuvres, parce que la charge lui avoit échappé autant de fois. Il offroit aux yeux du Specta-

teur étonné & preſque attendri, une image bien naturelle de l'infortuné SISIPHE.

ENFIN, le Fourmilion jouit du fruit de ſes travaux : il a tendu ſon piege, & le voilà à l'affût. Caché & immobile au fond de la foſſe, il attend en Chaſſeur ruſé & patient la proie qu'il ne ſauroit pourſuivre. Si quelque Fourmi vient à roder autour du précipice, il eſt rare qu'elle n'y tombe point. Les bords en ſont eſcarpés, & s'éboulent facilement. Ils entraînent avec eux l'imprudente Fourmi ; le Fourmilion la ſaiſit preſtement avec ſes cornes, la ſecoue pour l'étourdir, la tire ſous le ſable, & la ſuce à ſon aiſe. Il rejette enſuite le cadavre qui n'eſt plus qu'une peau ſeche & vuide, répare le déſordre ſurvenu à la foſſe, & ſe remet en embuſcade.

IL n'a pas toujours le bonheur de ſaiſir ſa proie au moment qu'elle tombe dans le piege. Souvent elle échappe à ſes pinces meurtrieres, & fait effort pour gagner le haut de l'entonnoir. Alors, le Fourmilion fait jouer ſa tête ; il lance ſur la proie des jets de ſable redoublés, qui la précipitent de nouveau au fond de la foſſe.

J'AI parlé (2) d'une Araignée qui eſt ſi atta-

(2) Part. XI, Chap. V.

chée à ſes œufs, qu'elle les porte par-tout avec elle. Elle les renferme dans un petit ſac de ſoie qu'elle lie à ſon derriere. On le prendroit pour le ventre de l'Araignée. Elle eſt très-farouche, très-agile, court avec rapidité, & ne ſe deſſaiſit jamais de ſes œufs. Une Araignée de cette Eſpece ayant été jettée dans la foſſe d'un Fourmilion, celui-ci ſaiſit d'abord le ſac aux œufs, & ſe mit en devoir de l'entraîner ſous le ſable. L'Araignée s'y laiſſoit entraîner avec lui; mais la ſoie, qui le tenoit collé à ſon derriere, rompit, & elle s'en vit ſéparée. Elle ſe retourna ſur-le-champ, ſaiſit le ſac avec ſes pinces, & fit les plus grands efforts pour l'arracher au Fourmilion. Ce fut en vain; il entraîna le ſac toujours plus avant ſous le ſable, & l'Araignée, plutôt que de lâcher priſe, ſe laiſſa enterrer toute vivante. On la déterra bientôt; elle étoit pleine de vie; le Fourmilion ne l'avoit point attaquée: cependant, quoiqu'on la touchât à pluſieurs repriſes avec un brin de bois, elle ne fuyoit point: cette Araignée ſi agile, ſi ſauvage, ſi farouche, ſembloit ne vouloir point abandonner le lieu où elle avoit perdu ce qu'elle avoit de plus cher.

Parvenu à ſon parfait accroiſſement, le Fourmilion quitte le métier de Chaſſeur qui lui eſt devenu inutile; il ne tend plus de piege; &

après s'être promené quelque temps près de la ſurface de la terre, il s'y enfonce & s'y conſtruit une petite coque de forme ſphérique, qu'il revêt intérieurement d'une tapiſſerie de ſatin du plus beau gris de perle, où il ſe transforme dans une de ces Mouches qu'on a nommées *Demoiſelles.*

On a découvert une nouvelle Eſpece de Fourmilion, qui eſt rare dans nos Contrées, & un peu plus grande que l'Eſpece commune (3). Elle eſt ſur-tout remarquable par ſes allures; elle marche en avant avec aſſez d'agilité, & c'eſt apparemment la raiſon pour laquelle il ne paroît pas lui avoir été donné de ſe faire un entonnoir. Elle ſe contente de ſe cacher à la ſurface de la terre, & de ſaiſir les Inſectes au paſſage. Probablement elle ſait avancer ſur eux quand il le faut.

Ces procédés ingénieux qui ont rendu célebre le Fourmilion, ne lui ſont point particuliers. On connoît aujourd'hui un Inſecte très-

(3) †† Cette nouvelle Eſpece de Fourmilion que l'Auteur découvrit autrefois aux environs de Geneve, differe de l'Eſpece commune par d'autres caracteres, que la grandeur. Il a détaillé ailleurs ces caracteres. Cette nouvelle Eſpece lui a paru rare, & il n'en a jamais eu qu'un très-petit nombre d'Individus.

différent, qui habite comme lui une terre pulvérisée & mobile, qui s'y creuse une fosse en entonnoir, & qui lance des jets de sable sur la proie qui tente d'en sortir. Cet Insecte est un Ver blanchâtre, mol & sans jambes, qui a reçu le nom de *Ver-lion*, par analogie à celui dont il imite les procédés. Son entonnoir est plus profond proportionnellement à l'ouverture, que ne l'est celui du Fourmilion. Pour creuser cette fosse profonde le Ver-lion s'y prend d'une maniere fort simple. Il ne commence point, comme le Fourmilion, par tracer un sillon circulaire qui en détermine l'ouverture : il n'est pas si Géometre : il se contente de jetter le sable obliquement de tous côtés. A mesure qu'il excave ainsi, il s'enfonce davantage, & il continue d'excaver & de projetter de la sorte, jusqu'à ce qu'il ait donné à sa fosse la profondeur qu'il lui veut (4).

(4) †† Mr. de REAUMUR est le premier qui nous ait donné en 1753 une bonne histoire du Ver-lion. Il étoit pourtant connu dès le commencement du siecle; mais ce qu'on en savoit n'étoit ni assez exact ni assez circonstancié. Le Ver-lion ressemble fort à ces Vers de la viande que tout le monde connoît : il en a même les caracteres les plus essentiels. Sa partie antérieure est très-effilée, & la postérieure est grosse & arrondie. Sa tête, de forme variable, est armée de deux crochets écailleux, & son derriere porte deux stigmates auxquels vont aboutir deux maîtresses trachées qu'on apperçoit au travers de la peau. Mais, le Ver-lion ne se métamorphose pas en *boule alongée* comme les

Vers de la viande. (Voyez Part. IX, Chap. VI.) Il ſe défait de ſa peau de Ver, comme tant d'autres Inſectes, & ſe montre ſous la forme de Nymphe, qui devient bientôt une Mouche à deux aîles, aſſez ſemblable à celle de certains Vers mangeurs de Pucerons, qui ſont du même genre que le Ver-lion.

Lorſque notre Chaſſeur a achevé de creuſer ſon entonnoir, il ſe met en embuſcade fort près du fond. Sa partie antérieure eſt alors tendue horiſontalement en ligne droite de l'une à l'autre paroi : on la prendroit à la vue ſimple pour un brin de bois, tant elle paroît roide & immobile : la partie poſtérieure, au contraire, cachée ſous le ſable, eſt recourbée en crochet du côté du dos, & nous allons voir que cette poſition eſt bien néceſſaire à l'Inſecte pour aſſurer ſa chaſſe. J'ajoute, que lorſqu'il eſt étendu en ligne droite, il a environ huit à neuf lignes de longueur.

Son piege eſt tendu à tous les petits Inſectes rodeurs, & malheur à celui que ſon imprudence entraîne dans le précipice. Le Ver-lion le ſaiſit à l'inſtant, s'entortille autour de lui comme un Serpent, le ſerre de plus en plus, le tranſperce avec ſes crochets, & le ſuce tout à ſon aiſe.

Mais il arrive ſouvent que la proie, trop vigoureuſe, fait les plus grands efforts pour s'échapper, & c'eſt alors qu'il importe beaucoup au Ver-lion que ſa partie poſtérieure, recourbée en crochet, ſoit bien cramponnée dans le ſable. Si pourtant la proie réuſſit à lui échapper, & qu'elle ſe mette à grimper le long des parois de l'entonnoir, le ruſé Chaſſeur lance au-deſſus d'elle, avec une merveilleuſe preſteſſe, des jets de ſable réitérés, qui l'étourdiſſent & la forcent à retomber au fond du précipice, où le petit Lion s'en reſſaiſit.

CHAPITRE XLIII.

Le Crapaud.

JE ne fais pas difficulté de produire ici cet Animal hideux. Sa conſtance dans ſes amours, ſa patience infatigable, ſa dextérité merveilleuſe lui mériteront bientôt les éloges de mes Lecteurs. Il appartient à la claſſe des Ovipares (1).

(1) †† Ce n'eſt qu'aſſez improprement qu'on peut dire que le Crapaud eſt *ovipare :* c'eſt que les petits corps qu'il met au jour en ſi grand nombre, ne ſont pas proprement des *œufs :* ils ſont, à parler exactement, les Tétards eux-mêmes, déja tout formés, & dont les tégumens propres ſont très-reconnoiſſables même avant la fécondation. Conſultez ſur ceci la Note 2 du Chap. X de la Part. VII. Si l'on joint cette découverte à celle qui démontre la préexiſtence du Poulet dans l'œuf, (Part. VII, Chap. X, & les Notes) & à celles qui démontrent plus rigoureuſement encore que la plantule préexiſte auſſi dans la graine, (Part. X, Chap. XXXIV, Note 5) on ne pourra ſe refuſer à admettre cette grande vérité ; que la préformation & l'évolution des Corps organiſés ſont une des loix les plus générales de la Nature.

A leur ſortie du ventre de la Mere, les très-petits Tétards ſont environnés d'une épaiſſe couche de glaire, que le ſperme du Mâle ne laiſſe pas de traverſer dans l'inſtant de la fécondation. Nous avons vu ailleurs quelle eſt l'étonnante énergie de cette liqueur fécondante, & combien eſt petite la doſe de ſperme qui ſuffit à opérer la fécondation. (Conſultez la Note 9 du Chap. XXIII de la Part. X.) Mr. SPALLANZANI s'eſt aſſuré

Ses

Ses œufs très-nombreux, & revêtus d'une membrane qui a de la consistance, sont liés les uns aux autres par une espece de cordon. Figurez-vous un long chapelet, dont les grains sont à-peu-près égaux. Il faut que la Femelle se décharge d'un pareil chapelet, roulé dans son ventre. C'est pour elle un grand travail que de mettre dehors le premier œuf; mais, quand une fois elle y est parvenue, tout le reste lui coûte peu, parce que le Mâle lui prête son secours. L'Accoucheur le plus expérimenté ne s'acquitte pas mieux de ses fonctions, que ce Mâle officieux & empressé s'acquitte des siennes. Cramponné depuis un temps plus ou moins long sur le dos de sa Femelle, il la tient étroitement embrassée avec ses pattes de devant, tandis qu'avec une de ses pattes de derriere il saisit le premier œuf & le bout du cordon. Il fait passer ce cordon entre ses doigts, alonge la patte & extrait le second œuf. Saisissant alors de l'autre

que la glaire qui enveloppe les Tétards à leur naissance est leur premiere nourriture; & il pense, que c'est la raison pourquoi les Tétards qu'on essaie de féconder artificiellement dans l'ovaire ou dans la partie supérieure des trompes, ne parviennent pas à se développer : ils y manquent de cette premiere nourriture qui leur est absolument nécessaire. Les Tétards qu'il avoit dépouillés entiérement de leur glaire, n'ont jamais pu être fécondés, tandis que ceux qui n'en avoient été dépouillés qu'en partie étoient presque tous rendus féconds.

patte une portion plus élevée du cordon, il amene le troiſieme œuf, qui eſt ſuivi de près par le quatrieme. C'eſt en réitérant cette adroite manœuvre, qu'il réuſſit à extraire enfin tout le chapelet (2).

(2) †† C'étoit d'après Mr. DEMOURS, de l'Académie des Sciences de Paris, que je crayonnois ici l'intéreſſante hiſtoire du Crapaud accoucheur. Les détails auſſi circonſtanciés que curieux dans leſquels ce ſavant Académicien étoit entré à ce ſujet, ne me permettoient pas de douter de l'exactitude de ſon obſervation. Il eſt pourtant bien ſingulier que RŒSEL, qui avoit tant obſervé les Crapauds & les Grenouilles, & qui nous en a donné une ſi magnifique hiſtoire, n'eût jamais ſurpris le Crapaud mâle dans ſa fonction d'accoucheur: il ne l'eſt pas moins aſſurément que Mr. SPALLANZANI n'y ſoit point parvenu non plus. Mais ces deux témoignages négatifs ne ſauroient infirmer le témoignage ſi affirmatif & ſi détaillé de Mr. DEMOURS. Mr. RŒSEL dit ſeulement: que le Crapaud aquatique retient les œufs entre ſes pattes de derriere juſqu'à ce qu'il les ait arroſés de ſa liqueur, & que le Crapaud terreſtre ſemble vouloir les extraire de force du ventre de la Femelle; qu'il ne le fait pourtant pas; mais qu'il les ramaſſe en monceau, comme s'il vouloit ainſi les arroſer plus facilement & plus promptement.

Les amours des Grenouilles ne different pas eſſentiellement de celles des Crapauds: mais les choſes ſe paſſent bien différemment chez les Salamandres aquatiques, & leurs amours ſont bien plus chaſtes. Le Mâle ne tient point ſa Femelle embraſſée, il ſe borne à lui faire de petites agaceries qui la préparent à la fécondation: enſuite il darde dans l'eau ſon ſperme, qui y forme un petit nuage blanchâtre, qui va envelopper l'anus ouvert & renflé de la Femelle; & c'eſt de la ſorte qu'elle eſt rendue féconde. La Fable n'avoit pas feint de plus chaſtes amours. Le ſperme des Salamandres, qui eſt très-épais, demandoit à être détrempé dans l'eau. Cela eſt même ſi vrai, qu'on ne réuſſit

point à féconder artificiellement leurs œufs, ſi l'on n'a pas ſoin auparavant de détremper la liqueur ſéminale, & d'imiter ainſi le procédé de la Nature, qui la répand dans l'eau avant que de l'employer.

Puiſque je viens de parler du Crapaud, je ne puis m'empêcher de dire quelque choſe d'un Animal de ce genre, qui nous offre des particularités extrêmement ſingulieres, & qu'on n'a encore rencontrées dans aucun autre Animal, ſoit de même genre, ſoit de genres différens. On devine qu'il s'agit du *Pipa* ou Crapaud de Surinam, qui ſurpaſſe en grandeur nos Crapauds d'Europe. Il en differe encore par beaucoup d'autres caracteres que je ne détaillerai pas dans cette Note, mais dont j'ai détaillé une partie dans un autre Écrit.

Le dos de la Femelle eſt une grande curioſité anatomique : on l'avoit révoquée en doute, parce qu'on ſe défioit trop du merveilleux ; mais elle eſt aujourd'hui ſi bien conſtatée, qu'on ne peut plus refuſer de l'admettre ; & il n'eſt pas même beſoin de l'œil de l'Obſervateur pour ſe convaincre de la réalité : les yeux les moins exercés à voir peuvent facilement la découvrir. Cette curioſité, unique en ſon genre, conſiſte dans un amas de cellules, d'environ cinq lignes de profondeur, ſur un peu plus de deux lignes d'ouverture, dont tout le dos de l'Animal eſt garni, & qui, placées les unes à côté des autres, paroiſſent diſtribuées irréguliérement. L'intérieur en eſt très-liſſe, & le fond exactement fermé. On ne leur découvre aucune communication directe ou indirecte avec les parties intérieures que recouvre la peau épaiſſe & chagrinée du dos. Cette peau a une ſorte de duplicature qui renferme les cellules. Toutes s'ouvrent ſur le dos ; mais il eſt un temps où chacune d'elles eſt fermée par un petit opercule, d'une peau mince & tranſparente, qui s'ajuſte très-proprement & très-exactement aux bords de l'ouverture circulaire ou ellyptique de la cellule.

Je ſupprime bien des détails, & me hâte d'en venir au principal uſage de ces cellules ſi ſingulieres & ſi artiſtement façonnées. Il vient un temps où chacune de ces cellules loge un Crapaud parfait, vraie miniature, qui offre dans un raccourci &

dans un fini admirables toutes les parties extérieures qui caractériſent l'Eſpece. Ces jolies miniatures ; je prie qu'on me paſſe une épithete que l'idée de l'Animal hideux dont je parle repouſſe ſi fortement, & qui pourtant convient au mieux à ſes Petits ; ces miniatures, dis-je, ſont ſi adroitement empaquetées & arrangées dans leurs cellules, comme dans autant d'étuis, qu'elles n'y occupent que le plus petit eſpace poſſible : elles les rempliſſent néanmoins en entier, en s'ajuſtant exactement à leurs parois. On peut les en retirer & les y replacer à volonté : elles n'adherent aux parois par aucun vaiſſeau ni par aucun ligament : elles ſont ſimplement emboîtées dans la cellule comme une Nymphe dans ſa coque, ou une Abeille dans ſon alvéole.

Mais, comment nos petits Pipas ſe trouvent-ils logés dans les cellules dont le dos de la Femelle eſt ſi bien pourvu ? comment y ſont-ils parvenus ? Car je viens de remarquer, qu'on ne découvre point de communication entre les cellules & l'intérieur du corps : c'eſt pourtant dans cet intérieur que les Embryons prennent leurs premiers accroiſſemens, puiſque c'eſt-là que ſe trouvent les ovaires, les trompes & la matrice. Un ingénieux Obſervateur (†), témoin oculaire des amours des Pipas, paroît avoir percé ce myſtere. Il nous aſſure, qu'il a vu le Mâle accourir après la ponte de la Femelle, prendre les œufs avec ſes pattes de derriere, & les placer ſur le dos de ſa Compagne ou dans les cellules deſtinées à les recevoir. Ces cellules ſeroient donc, en quelque ſorte, des matrices externes qui procureroient le développement ultérieur des Embryons. Ils y demeureroient renfermés juſqu'au temps où, parvenus à un certain accroiſſement, ils ouvriroient la porte de leur logette pour venir au jour une ſeconde fois & ſe mettre en liberté. Mais, l'hiſtoire déja ſi curieuſe du Pipa exigeroit des éclaireiſſemens que nous n'obtiendrons que des recherches très-approfondies des meilleurs Obſervateurs.

(†) Mr. FERMIN.

CHAPITRE XLIV.

Les ruſes du Lievre & celles du Cerf.

Si le Lievre ne poſſede pas, comme le Lapin, l'art de ſe creuſer un terrier (1), il ne manque pas néanmoins de ſagacité pour ſe conſerver & échapper à ſes Ennemis. Il ſait ſe choiſir un gîte, & ſe cacher entre des mottes de terre, qui imitent la couleur de ſon poil. En Hiver, il ſe loge au midi, & en Eté au nord. Lancé par les Chiens, il ſuit quelque temps un ſentier, revient ſur ſes pas, s'élance de côté, ſe jette dans un buiſſon & s'y tapit. Les Chiens ſuivent le ſentier, paſſent devant le Lievre, & le manquent. L'Animal ruſé, qui les voit paſſer & s'éloigner, ſort de ſa retraite, rentre dans le ſentier, confond ſes traces, & met la Meute en défaut. Sans ceſſe il varie ſes ruſes, & ſe conduit toujours relativement aux circonſtances. Tantôt à l'ouie des Chiens, il part du gîte, s'éloigne d'un quart de lieue, ſe jette dans un étang, & ſe cache entre des joncs. Tantôt il ſe mêle à un troupeau de Brebis qu'il n'abandonne point; tantôt il ſe cache ſous terre; tantôt il s'élance ſur une vieille mu-

(1) Chap. XXX de cette Partie.

raille, ſe tapit entre des lierres, & laiſſe paſſer les Chiens : d'autres fois il file le long d'un des côtés d'une haie, tandis que les Chiens filent de l'autre. Quelquefois il paſſe & repaſſe à pluſieurs repriſes une riviere à la nage : d'autres fois enfin il oblige un autre Lievre à quitter le gîte, pour ſe mettre à ſa place, &c.

Le Cerf, qui par l'élégance & la légéreté de ſa taille, par ce bois vivant dont ſa tête eſt parée plutôt qu'armée, par ſa grandeur, par ſa force, par ſon air noble, eſt un des grands ornemens des Forêts, ruſe plus ſavamment encore que le Lievre, & exerce bien plus la ſagacité du Chaſſeur.

Poursuivi par les Chiens, il paſſe & repaſſe pluſieurs fois ſur ſa voie ; il leur donne le change en ſe faiſant accompagner d'autres Bêtes, perce & s'éloigne auſſi-tôt, ſe jette à l'écart, ſe dérobe & ſe couche ſur le ventre. La terre le trahiſſant toujours, il ſe met à l'eau. La Biche qui nourrit, ſe préſente aux Chiens pour leur dérober ſon Faon : elle ſe laiſſe courir & revient à lui.

CHAPITRE XLV.

Le Renard.

Le Renard, fameux par ſes ruſes, & qui joue un ſi grand rôle dans ces Fables ingénieuſes où la Morale vit & reſpire; le Renard, dis-je, ſe conduit avec autant de prudence que d'eſprit. Non moins circonſpect qu'adroit, non moins vigilant que ruſé, il peſe ſes moindres démarches, étudie les circonſtances, épie ſans ceſſe, n'agit qu'à propos, & a toujours quelque moyen en réſerve pour ſubvenir aux occurrences. Son génie fécond en reſſources multiplie preſqu'à l'infini ſes tours, ſes ruſes & ſes ſtratagêmes.

Quoique très-vîte à la courſe, il ne ſe fie point à ſa légéreté naturelle: il juge qu'elle ne ſuffiroit pas toujours à ſa conſervation, il ſe ménage de bonne-heure un aſyle ſouterrein, où il ſe réfugie au beſoin, où il ſe loge & éleve ſa Famille.

Il établit ſon domicile au bord des bois & dans le voiſinage des métairies. Il prête de loin une oreille attentive au chant des Volailles,

dirige ſa marche en conſéquence, la couvre habilement, arrive par divers détours, ſe tapit, ſe traîne ſur le ventre, ſe met en embuſcade, & manque rarement ſon coup.

S'IL eſt aſſez heureux pour pénétrer dans l'enclos, il met à profit tous les momens, & égorge toutes les Volailles. Il fait retraite ſur-le-champ, emporte une Proie, la recele, revient en chercher une autre, la cache comme la premiere, & ne renonce à butiner que lorſqu'il s'apperçoit qu'il a été découvert.

IL entend à merveille à chaſſer les jeunes Levreaux, à ſurprendre les Lievres au gîte, à découvrir les nids des Perdrix, des Cailles, &c. & à ſaiſir la Mere ſur ſes œufs.

HARDI autant que fin, il oſe attaquer les Abeilles : il en veut à leur miel, dont il eſt friand. Il eſt bientôt aſſailli par ces Mouches guerrieres, & en peu de momens il en eſt couvert. Il ſe retire à quelques pas de diſtance, ſe roule ſur la terre, les écraſe, retourne à la charge, & force enfin le petit Peuple laborieux à lui abandonner le fruit de ſes longs travaux.

JE n'ajoute plus qu'un trait : ſi le Renard

reconnoît qu'on ait inquiété ſes Petits en ſon abſence, il les tranſporte tous les uns après les autres dans une autre retraite.

CHAPITRE XLVI.

L'Éléphant.

†† A voir cette maſſe de chair ſi énorme (1), ſi lourde, ſi informe, cette Montagne ambulante qui fait trembler la terre ſous ſes pas, & que l'œil du Spectateur ne parcourt point ſans étonnement, imagineroit-on qu'elle recele une Ame ſupérieure, douée de talens & de qualités rares, & qui ne peut guere être ſurpaſſée que par l'Ame tranſcendante du premier des Êtres terreſtres. A voir ce prodigieux Coloſſe, dont les membres maſſifs ſont ſi étrange-

(1) Les plus grands Éléphans ont quatorze à quinze pieds de hauteur, ſur autant ou à-peu-près de longueur. On calcule qu'un Éléphant de cette taille peſe autant que cinquante Hommes. C'eſt ſur les côtes orientales de l'Afrique & dans les parties méridionales de l'Aſie que ſe trouvent les plus grands Éléphans. On préſume que ceux qui demeurent en liberté peuvent vivre plus de deux cents ans; mais ceux qu'on réduit en ſervitude vivent beaucoup moins. Un grand Éléphant conſume par jour juſqu'à cent cinquante livres d'herbe.

ment configurés (2), ſoupçonneroit-on qu'il n'eſt peut-être ſur notre Planete aucun Animal plus adroit ni plus intelligent, ſi l'on en excepte le plus adroit & le plus intelligent de tous? Sagacité, prudence, ſens-froid, courage, docilité, modération, l'Eléphant tient de la Nature toutes ces éminentes qualités, & l'éducation qui les perfectionne, les ennoblit, les dirige, ſemble en faire un Être preſque raiſonnable.

A ces qualités, pour ainſi dire morales, qui s'emparent fortement de notre admiration, l'Eléphant joint des qualités phyſiques que nous ne ſommes pas ſi ſurpris de rencontrer dans le plus coloſſal des Animaux terreſtres. Sa force muſculaire nous étonne néanmoins: avec ſa trompe il déracine les Arbres, & d'un coup de ſon corps il renverſe les murs. Seul, il met en mouvement les plus grandes machines, tranſporte des fardeaux que pluſieurs Chevaux remueroient à peine, & porte ſans ſuccomber une

(2) Le corps de l'Éléphant eſt trop épais pour être ſouple. Son col trop court ne fléchit que fort peu. Sa tête eſt petite & difforme: ſon nez & ſes oreilles ſont démeſurément longs; ſes jambes droites & maſſives, comme de gros piliers, ſont terminées par un pied ſi court, ſi petit, qu'il ſe diſtingue à peine: ſa peau enfin eſt dure, épaiſſe & calleuſe. Voilà bien des difformités, & qui choquent d'autant plus qu'elles ſont plus exagérées dans l'Animal.

tour armée en guerre & chargée de nombre de Combattans (3). Que dirai-je enfin? De ſes fortes défenſes il peut percer le plus terrible des Animaux, & celui que les plus puiſſans redoutent le plus. L'Eléphant n'en redoute aucun, parce qu'il réſiſte autant par l'énormité de ſa maſſe & l'épaiſſeur de ſon cuir, que par les armes meurtrières dont il eſt pourvu (4).

Mais, ce ſont les qualités aimables de l'Eléphant qu'on ſe plaît à contempler. Cet Être qui, au premier coup-d'œil, ne paroît qu'un entaſſement monſtrueux de matiere, eſt pourtant un Être très-ſentimental: je demande grace pour cette expreſſion qui vient de m'échapper, & qui n'eſt pas dans la rigueur philoſophique. Très-mémoratif des bienfaits reçus, il ne méconnoît jamais ſon Bienfaiteur, lui témoigne ſa reconnoiſſance par les ſignes les plus expreſſifs, & lui demeure toujours attaché. Mais il conſerve

(3) Une charge de quatre à cinq milliers n'eſt pas trop forte pour un grand Éléphant. Il eſt même un Voyageur qui aſſure avoir vu un de ces Animaux porter l'eſpace de cinq cents pas deux pieces d'artillerie, ſuſpendues à ſes défenſes, & qui peſoient chacune trois milliers.

(4) On connoît les défenſes de l'Éléphant: elles groſſiſſent quelquefois au point d'acquérir chacune un poids d'environ cent vingt livres.

auſſi un long ſouvenir des offenſes, & ne perd point l'occaſion de s'en venger. Exigeroit-on d'un Animal une généroſité qu'on rencontre ſi rarement dans notre Eſpece? Domeſtique auſſi docile que fidele, & auſſi intelligent que docile, il ſemble prévenir les deſirs de ſon Maître, deviner ſa penſée, & lui obéir par inſpiration. Attentif aux divers tons du commandement, il les démêle tous, ne ſe méprend point ſur leur ſignification, exécute avec jugement, agit avec meſure, ne précipite rien, & fait tout à propos. Il ne ſe refuſe à aucun genre de ſervice, pas même aux plus longs & aux plus pénibles, pourſuit ſa tâche avec conſtance & ſans ſe rebuter, l'acheve comme il l'a commencée, & ſe croit toujours aſſez récompenſé de ſon travail quand on lui témoigne par quelques careſſes qu'on eſt ſatisfait de l'emploi de ſes forces. Plus il eſt ſenſible aux bons traitemens, & plus il s'irrite des châtimens qu'il n'a point mérités. Doux par tempérament, il n'emploie ſa force ou ſes armes que pour ſe défendre lui-même, ſecourir ſon Maître, ou protéger ſes ſemblables. Souple, complaiſant & careſſant, il rend avec ſa trompe careſſes pour careſſes, fléchit les genoux devant celui qui veut le monter, ſe ſoumet à ſa direction, aide lui-même à ſe charger, ſe laiſſe vêtir & parer, & paroît même prendre plaiſir à cette

parure. Enfin, ſes mœurs ſociales qui l'éloignent de la ſolitude & d'une vie errante, le portent à rechercher la compagnie de ſes ſemblables & à leur être utile; & les ſociétés que forment entr'eux ces Animaux demi-raiſonnables, ſont ſoumiſes à des loix qu'on aime à connoître, quoiqu'on ait toujours à ſe défier un peu du Code que les Naturaliſtes anciens & modernes en ont publié. Le plus vieux des Eléphans, comme le plus expérimenté, eſt à la tête de la troupe & la conduit: le plus âgé après lui ferme la marche: les jeunes & les foibles ſont au centre du bataillon; & les Meres qui allaitent encore, portent leurs Petits qu'elles embraſſent de leur trompe. Tel eſt l'ordre que les prudens Eléphans obſervent dans les marches périlleuſes, & qu'on croiroit ſuggéré par la raiſon elle-même. Mais, quand ils n'ont rien à redouter, ils relâchent beaucoup de leurs précautions, ſe promenent dans les forêts, dans les champs, dans les prairies, y pâturent à leur aiſe, mais ſans s'écarter aſſez les uns des autres pour ſe priver de leurs ſecours mutuels ou de leurs avertiſſemens (5).

(5) L'Éléphant n'eſt ni carnivore ni piſcivore, il n'eſt que frugivore; il vit de racines, d'herbes, de fruits & de grains. Lorſqu'il rencontre quelque pâturage abondant, il appelle les autres Éléphans & les invite à en venir prendre leur part.

Je n'ai pas achevé d'eſquiſſer le tableau de l'Eléphant : le plus éloquent de ſes Hiſtoriens m'en fournit encore quelques traits qui s'affoibliront en paſſant par ma plume. Ses yeux, petits à la vérité, mais vifs, brillans & ſpirituels, peignent avec fidélité toutes les nuances du ſentiment ; & quand il les tourne lentement vers ſon Maître chéri, ils ne réfléchiſſent que douceur, amitié & tendreſſe. Fixés ſur ſon Maître, ſes regards, pleins d'expreſſion, annoncent qu'il l'a écouté & ſaiſi, & que prêt à exécuter ſes ordres, il n'attend plus que le dernier ſigne qui les lui manifeſtera. Ses yeux, en un mot, ſont des miroirs qui rendent avec énergie toutes les affections que ſon Ame ſenſible éprouve tour-à-tour, & qui révelent au Spectateur étonné la ſupériorité de cet Être.

Doué d'une oreille muſicale, l'Eléphant ſe délecte à l'harmonie, mêle à propos ſa voix aux ſons des tambours & des trompettes, apprend à battre la meſure & à ſe mouvoir en cadence.

Il ne ſe plaît pas moins aux parfums qu'aux accords de la muſique : il aime ſur-tout le parfum des fleurs ; & cet Animal coloſſal entend à les choiſir, à les cueillir une à une, à en faire des bouquets, & ne ſe bornant pas à en ſavourer

l'odeur, il les porte encore à ſa bouche, comme pour les goûter.

Sa trompe, inſtrument admirable, réunit au ſens de l'odorat celui du toucher, & tous deux ſont exquis. Mobile en tout ſens & d'une merveilleuſe flexibilité, cette trompe ſe termine par un rebord qui peut s'alonger en maniere de doigt, & avec lequel l'Eléphant peut exécuter tout ce que nous exécutons avec les nôtres. C'eſt à l'aide de cette ſorte de main qu'il cueille les fleurs, ramaſſe les plus petites pieces de monnoie, dénoue les cordes, ouvre & ferme les portes en tournant les clefs ou pouſſant les verroux, & qu'il trace des caracteres réguliers avec un inſtrument auſſi fin qu'une plume.

En formant la trompe de l'Eléphant, & en y raſſemblant avec un art infini des organes très-divers, la Nature a concentré dans cet inſtrument unique des puiſſances qu'elle a diſtribuées ailleurs en différentes régions du corps animal. Cette trompe merveilleuſe n'eſt pas ſeulement un double & même un triple ſens, elle eſt encore un bras puiſſant & une main très-adroite (6).

(6) Cette trompe, au moyen de laquelle l'Éléphant exécute tant & de ſi grandes choſes, devoit être très-richement pourvue de nerfs : auſſi l'Anatomie prouve-t-elle que les nerfs qui s'y

Ainſi, en même temps que l'Eléphant flaire, goûte, touche par cet organe unique, il meſure les diſtances des corps, juge de leur réſiſtance, démêle leurs qualités tangibles, & toutes ces choſes ſe combinant à la fois dans le cerveau, il en naît des aſſociations d'autant plus fortes, que ces choſes dérivent d'un même organe, & qu'elles ſont, en quelque ſorte, contemporaines. De-là cette ſupériorité d'inſtinct, cette ſorte d'intelligence; je dirai mieux, cette imitation de la raiſon, qui ennoblit tant l'Eléphant & le rapproche ſi fort du premier & du plus parfait des Êtres de notre Globe, dont il eſt pourtant ſi éloigné par ſon étrange conformation & l'énormité de ſa maſſe (7).

diſtribuent, équivalent à tous ceux du reſte du corps. Mais elle nous apprend en même temps que le cerveau de cet Animal ſi intelligent, eſt néanmoins plus petit proportionnellement à la maſſe du corps que celui de la plupart des autres Animaux.

Comme l'Éléphant a le déſavantage de ne pouvoir rien ſaiſir à terre avec ſa bouche, parce que ſon col trop court ne peut ſe ployer aſſez, il faut qu'il prenne ſa nourriture & ſa boiſſon avec le nez, c'eſt-à-dire, avec ſa trompe. Il ne ſuffit pas même qu'il porte ſa nourriture à l'entrée de la bouche, il faut qu'il l'enfonce aſſez avant dans le goſier. Il eſt obligé d'en uſer à-peu-près de même à l'égard de l'eau dont il s'abreuve : il en remplit ſa trompe & la ſeringue avec force dans l'œſophage. Il ſe divertit auſſi à la ſeringuer ſur ceux qui lui déplaiſent ou qui lui ont fait quelqu'inſulte.

(7) Il n'eſt point d'Animal ſur lequel l'imagination des Voyageurs & des Naturaliſtes ſe ſoit plus échauffée que ſur l'Éléphant :

l'Éléphant : non-seulement on lui a attribué un instinct bien supérieur à celui du Castor, du Chien ou du Singe ; mais on a plus fait encore ; on l'a peint comme un Être moral & très-moral. De bons Esprits, & même des Philosophes, n'ont pu résister toujours à la sorte de séduction qui naît des grandes qualités de ce noble Animal, & ils ont inséré dans son histoire des faits étonnans qu'ils n'ont pas paru envisager d'un œil assez philosophique. Je n'en citerai qu'un seul exemple, que je tire de Mr. de BUFFON. Il le rapporte d'après Mr. de MONTMIRAIL, de l'Académie des Sciences de Paris, qui le tenoit lui-même de Mr. de BUSSY, qui a demeuré dix ans dans l'Inde, qui y possédoit plusieurs Éléphans, & qui avoit eu bien des occasions de les observer. Mr. de BUFFON ajoute, que le témoignage de Mr. de BUSSY mérite la confiance du Lecteur.

„ Le Conducteur de l'Éléphant, (c'est Mr. de MONTMI-„ RAIL qui parle d'après Mr. de BUSSY) veut-il lui faire faire „ quelque corvée pénible, il lui explique de quoi il est ques-„ tion, & lui détaille les raisons qui doivent l'engager à lui „ obéir ; si l'Éléphant marque de la répugnance à ce qu'il exige „ de lui, le *Cornac* (c'est ainsi qu'on appelle son Conducteur) „ promet de lui donner de l'arac ou quelque chose qu'il aime : „ alors l'Animal se prête à tout ; mais il est dangereux de lui „ manquer de parole ; plus d'un Cornac en a été la victime. „ Il s'est passé à ce sujet dans le Dekan, un trait qui mérite „ d'être rapporté, & qui, tout incroyable qu'il paroît, est „ cependant exactement vrai. Un Éléphant venoit de se venger „ de son Cornac en le tuant : sa Femme, témoin de ce specta-„ cle, prit ses deux Enfans & les jetta aux pieds de l'Animal „ encore tout furieux, en lui disant : *puisque tu as tué mon „ Mari, ôte-moi aussi la vie, ainsi qu'à mes Enfans.* L'Éléphant „ s'arrêta tout court, s'adoucit, & comme s'il eût été touché „ de regret, prit avec sa trompe le plus grand de ces deux „ Enfans, le mit sur son cou, l'adopta pour son Cornac, & n'en „ voulut point souffrir d'autres ".

Un Lecteur qui se plaît au merveilleux, aime fort à rencontrer de tels faits dans l'Histoire des Animaux ; & s'il est fort

ſenſible, il ſaura très-mauvais gré au Philoſophe un peu ſévere qui les dépouillera de leur moralité apparente, & les réduira à leur juſte valeur. Cet Éléphant furieux qui venoit d'exercer une ſi cruelle vengeance ſur ſon Conducteur, pouvoit-il juger du déſeſpoir de ſa Femme, ſaiſir la valeur des termes par leſquels elle exprimoit ſi énergiquement la douleur qui déchiroit ſon Ame? Les doux noms de Pere, de Mere, d'Enfans ſont-ils bien faits pour l'oreille d'un Animal qui n'a & ne peut avoir l'uſage de la parole, & qui eſt borné aux pures ſenſations? Mais, dira-t-on, *l'Éléphant s'arrêta tout court, s'adoucit, adopta ſur-le-champ pour ſon Conducteur le plus grand des deux Enfans, le plaça avec ſa trompe ſur ſon cou, & ne voulut point ſouffrir d'autre Conducteur?* Voilà comment les Ames ſenſibles interpretent à leur maniere les actions des Brutes qui affectent un air de ſentiment ou de réflexion: mais rien de mieux prouvé que l'attachement des Éléphans pour les Enfans; & cet attachement purement phyſique, tient à certaines qualités ſenſibles, qui affectent agréablement les ſens de l'Animal, & dont nous ne ſaurions juger. La préférence que l'Éléphant dont il s'agit donna au plus grand des deux Enfans de la Femme déſolée, tenoit, ſans doute, auſſi à quelqu'impreſſion ſecrete du même genre. (Conſultez le Chap. XXXIII & les Notes: conſultez encore le Chap. XXXVIII & la Note.) Quand nous prêtons ſi libéralement aux Animaux nos idées morales, nous ne ſongeons point qu'ils ne ſont pas pourvus, comme nous, de l'inſtrument néceſſaire à leur formation. Je ne révoque point en doute le trait que Mr. de MONTMIRAIL raconte ſi agréablement, & dont il dit que, *tout incroyable qu'il paroît, il eſt cependant exactement vrai;* je ne fais que le traduire en une autre langue.

Le Lecteur Philoſophe me pardonnera ſi je m'arrête encore quelques momens ſur un autre paſſage de la belle Hiſtoire de l'Éléphant de Mr. de BUFFON, que je n'ai pu lire ſans ſurpriſe. „ L'Éléphant, dit-il, comme le Caſtor, aime la ſociété de ſes „ ſemblables, il s'en fait entendre: on les voit ſouvent ſe raſ„ ſembler, ſe diſperſer, agir de concert, & s'ils n'édifient rien, „ s'ils ne travaillent point en commun, ce n'eſt peut-être que

„ faute d'aſſez d'eſpace & de tranquillité : car les Hommes ſe „ ſont très-anciennement multipliés dans toutes les terres qu'ha- „ bite l'Éléphant : il vit donc dans l'inquiétude, & n'eſt nulle „ part paiſible poſſeſſeur d'un eſpace aſſez grand, aſſez libre „ pour s'y établir à demeure. Nous avons vu qu'il faut toutes „ ces conditions & tous ces avantages, pour que les talens du „ Caſtor ſe manifeſtent, & que par-tout où les Hommes ſont „ habitués, il perd ſon induſtrie & celle d'édifier ".

Si les Caſtors inquiétés par les Hommes *ceſſent d'édifier*, ils peuvent néanmoins toujours le faire, parce qu'ils en ont toujours la capacité phyſique, & que leur cerveau a été organiſé dans un rapport déterminé aux beaux ouvrages qu'ils devoient exécuter dans certaines circonſtances données. (Conſultez le Chap. XXX de la Part. XI, & la Note correſpondante.) Des circonſtances différentes ſuſpendent l'exercice des admirables facultés de ces Animaux induſtrieux ; mais ils ne les détruiſent pas. Ce n'eſt donc pas *parce que les Hommes ſe ſont très-anciennement multipliés dans toutes les terres qu'habitent les Éléphans*, que ces grands Animaux ſi intelligens *n'édifient rien ;* c'eſt uniquement parce que leur cerveau n'a point été organiſé dans le rapport au genre de travail qui a rendu les Caſtors ſi célebres. Les Éléphans *n'édifient rien*, parce qu'ils n'ont pas les idées de la choſe ; & ils ne ſauroient avoir ces idées, préciſément parce qu'ils ne ſont pas doués des facultés qui brillent dans les Caſtors. Chaque Animal a reçu de la Nature ſes dons ou ſes talens particuliers, que l'éducation peut perfectionner dans les Individus de certaines Claſſes ; mais ce perfectionnement s'arrête toujours à l'Individu & ne paſſe jamais à l'Eſpece. Notre illuſtre Auteur fait lui-même une ſemblable remarque dans un autre endroi de ſes Écrits. L'Eſpece chez les Animaux n'eſt donc point perfectible. Chaque Eſpece eſt eſſentiellement circonſcrite dans les limites de ſon organiſme actuel, qu'il lui eſt impoſſible de franchir. Auſſi voyons-nous que les Animaux les plus induſtrieux ne perfectionnent rien, que les Inſectes & les Oiſeaux Architectes bâtiſſent de nos jours comme ils bâtiſſoient du temps d'ARISTOTE. Ainſi, quand il n'y auroit jamais eu d'Hommes dans

CHAPITRE XLVII.

L'Orang-outang.

†† Si l'Eléphant paroît ſe rapprocher de l'Homme par l'intelligence, l'Orang-outang paroît s'en rapprocher bien davantage par la conformation tant intérieure qu'extérieure, & par les inclinations, les habitudes & les talens qui en dérivent (1). L'Orang-outang eſt ſi ſemblable à l'Homme, que l'Anatomiſte qui les compare, croit comparer deux Individus de la même Eſpece, ou au moins du même Genre; & frappé des reſſemblances ſi marquées & ſi nombreuſes qu'il découvre entre ces deux Êtres, il n'héſite pas à placer l'Orang-outang immédiatement après le groſſier Hottentot (2).

Ce Singe, le premier & le plus grand de tous les Singes, paroît, en effet, poſſéder tous

les terres qu'habitent depuis ſi long-temps les Éléphans, je ne penſe pas qu'ils ſe fuſſent jamais réunis pour édifier en commun la moindre cabane.

(1) Conſultez la Note 1 du Chap. XXX de la Part. III, & la Note du Chap. III de la Part. IV.

L'Orang-outang habite ſur-tout les Contrées méridionales de l'Inde, & ne propage que dans ces Climats brûlans.

(2) Voyez la Note 4 du Chapitre X de la Partie IV.

les attributs de l'Humanité (3), ſi vous en exceptez ce grand attribut, le plus bel apanage de l'Homme, qu'il ne partage avec aucun autre Animal, & auquel il doit ſa prééminence; je veux dire, la parole ou la penſée. L'Orang-outang ne parle point; il ne penſe donc point; car pour penſer, il faut parler. Il a pourtant, comme l'Homme, tous les organes extérieurs de la parole; mais il eſt privé de l'organe intérieur, ou de cette partie du cerveau qui correſpond dans l'Homme à l'organe de la voix, & qui lui donne la capacité de lier ſes idées aux ſons articulés qui les repréſentent, de les aſſocier & de les combiner de mille & mille manieres (4).

MAIS, ſi l'Orang-outang n'eſt point un Homme, il en eſt au moins le Prototype le plus parfait qui ſoit ſur la Terre (5). Auſſi haut & un

(3) Cela va au point, que la Femelle de l'Orang-outang eſt ſujette, comme la Femme, à l'écoulement périodique. On obſerve la même choſe dans les Femelles des Singes, qui ſe rapprochent le plus de l'Orang-outang.

(4) Voyez le Chap. XXXIII & la Note 7.

(5) Après avoir énuméré les caracteres aſſez légers qui différencient l'Ourang-outang de l'Homme, & les caracteres nombreux & frappans qui l'en rapprochent, Mr. de BUFFON ajoute: „ Toutes les parties tant extérieures qu'intérieures de

peu plus gros que l'Homme, il marche, comme lui, ſur deux pieds, en ſe ſervant d'un bâton dont il s'eſt lui-même pourvu, & dont il ſait

„ l'Orang-outang, ſont ſi parfaitement ſemblables à celles de „ l'Homme, qu'on ne peut les comparer ſans admiration, & „ ſans être étonné que d'une conformation ſi pareille & d'une „ organiſation qui eſt abſolument la même, il n'en réſulte pas „ les mêmes effets. Par exemple, la langue & tous les organes „ de la voix ſont les mêmes que dans l'Homme, & cependant „ l'Orang-outang ne parle pas; le cerveau eſt abſolument de la „ même forme & de la même proportion, & il ne penſe pas: „ y a-t-il une preuve plus évidente que la matiere ſeule, quoi- „ que parfaitement organiſée, ne peut produire ni la penſée „ ni la parole qui en eſt le ſigne, à moins qu'elle ne ſoit ani- „ mée par un principe ſupérieur? . . . Enfin, l'Orang-outang „ reſſemble plus à l'Homme qu'à aucun autre Animal, plus „ même qu'aux Babouins & aux Guenons. . . Ainſi les Indiens „ ſont excuſables de l'avoir aſſocié à l'Eſpece humaine par le „ nom d'*Orang-outang*, Homme ſauvage, puiſqu'il reſſemble à „ l'Homme par le corps plus qu'il ne reſſemble aux autres „ Singes ou à aucun autre Animal ".

Je ferai ſur ce paſſage de notre illuſtre Naturaliſte une remarque qui s'offre d'abord à l'eſprit d'un Pſychologue. Il paroît attribuer uniquement au Principe immatériel la ſupériorité de l'Homme ſur l'Orang-outang, parce qu'il admet d'après la diſſection, que le cerveau de celui-ci eſt parfaitement ſemblable au cerveau de celui-là. Mais, combien eſt-il de raiſons de douter de cette parfaite ſimilitude des deux cerveaux! Ici, les plus légeres variétés dans le nombre, l'arrangement & la ſtructure des parties peuvent différencier beaucoup les opérations du Principe immatériel. Le cerveau eſt l'inſtrument de l'Ame; elle agit ſur lui & par lui, & nous ne connoiſſons guere de cet inſtrument admirable que le dehors: les pieces infiniment petites & profondément cachées auxquelles l'Ame eſt immédiatement

faire uſage pour ſe défendre ou pour attaquer. On le voit, avec étonnement, prendre ſa place à table, & s'aſſeoir parmi les Convives, déployer ſa ſerviette, ſe ſervir, comme nous, de fourchette, de cuiller & de couteau pour prendre & couper les morceaux qu'on met ſur ſon aſſiette, verſer lui-même ſa boiſſon dans un verre, le choquer, lorſqu'on l'y invite, s'eſſuyer de ſa ſerviette les levres, apporter ſur la table une taſſe avec ſa ſoucoupe, y mettre du ſucre, la remplir de thé, laiſſer refroidir la liqueur avant que de la boire; enfin, préſenter la main aux Convives pour les reconduire, & ſe promener gravement avec eux.

unie, ne ſont point de celles que le microſcope & le ſcalpel peuvent mettre à la portée de nos ſens; & toutes les comparaiſons que l'Anatomie inſtitue en ce genre, ne portent jamais que ſur les groſſes pieces de l'inſtrument. Je me crois donc bien fondé à penſer, que le cerveau de l'Homme eſt intérieurement d'une beaucoup plus grande compoſition que celui de l'Orang-outang, qu'il ſe trouve dans le premier des pieces qui ne ſe trouvent point dans le dernier, & que les pieces communes aux deux cerveaux different encore par leur arrangement, par leurs proportions & leur ſtructure. J'en juge par les produits relatifs des deux cerveaux qui different ſi prodigieuſement & à tant d'égards. Mais, parce que l'Orang-outang eſt de tous les Animaux celui qui reſſemble le plus à l'Homme, & que toutes les parties tant extérieures qu'intérieures du corps animal doivent être en rapport, j'admettrai en même temps, que le cerveau de l'Orang-outang eſt de tous les cerveaux celui qui ſe rapproche le plus du cerveau de l'Homme.

On n'eſt pas moins ſurpris de voir l'Orang-outang ſe coucher, comme nous, dans un lit qu'il a fait lui-même, poſer ſa tête ſur le chevet, la ceindre d'un mouchoir, ajuſter ſur lui les couvertures, & ſe faire ſoigner comme nous dans la maladie (6).

Très-susceptible d'éducation, l'Orang-outang devient un bon Domeſtique, qui obéit promptement aux ſignes & à la voix; au lieu que les autres Singes n'obéiſſent guere qu'au bâton. Dreſſé au ſervice de la maiſon, il s'acquitte avec autant d'adreſſe que d'exactitude des différentes fonctions qui lui ont été aſſignées; rince les verres, ſert à boire, tourne la broche, pile dans un mortier ce qu'on lui donne à piler, va chercher l'eau à la fontaine, en remplit une cruche, la place ſur ſa tête, l'apporte au logis, &c.

Les Orang-outangs vivent en ſociété dans

(6) Un Orang-outang avoit été ſaigné deux fois au bras droit dans une maladie: toutes les fois qu'il ſe trouva depuis incommodé, il montroit ſon bras, comme s'il eût voulu qu'on le ſoulageât par une nouvelle ſaignée. Ceci revient à ce que j'ai raconté ailleurs d'un Maki qui, dans une circonſtance analogue, préſentoit ſon derriere pour recevoir un lavement. (Chapitre XXXIII, Note 9.) Deux ſenſations s'étoient fortement aſſociées dans le cerveau du Maki & dans celui de l'Orang-outang, & l'une rappelloit l'autre.

les bois, & ſont aſſez forts & aſſez courageux pour en chaſſer les Eléphans à coups de bâton. Ils oſent même ſe mettre en défenſe contre des Hommes armés. Plus induſtrieux que les Eléphans, ils ſavent ſe conſtruire des cabanes de branches entrelacées, & aſſorties à leurs beſoins. Paſſionnés pour les Femmes, ils les pourſuivent avec ardeur, en jouiſſent s'ils peuvent les atteindre, les nourriſſent & en prennent grand ſoin.

Les Femelles, tendrement attachées à leur Nourriſſon, le portent dans leurs bras, lui donnent la mamelle, pourvoient à tous ſes beſoins & le défendent avec courage.

J'hésite à placer ici un dernier trait de l'inſtinct de l'Orang-outang, qui me ſemble plus fait pour figurer dans la Fable que dans l'Hiſtoire : nous le tenons pourtant d'un Voyageur célebre, & l'Hiſtorien de la Nature (7) n'a pas dédaigné d'en enrichir ſon Livre. Lorſque l'Orang-outang ne trouve plus de fruits ſur les montagnes ou dans les bois, il va ſur les bords de la Mer chercher une groſſe Eſpece d'Huître, du poids de pluſieurs livres, & qui eſt ſouvent béante ſur le rivage : mais le Singe circonſpect

(7) L'auteur de l'*Hiſtoire naturelle, générale & particuliere*.

qui craint que l'Huître en refermant preſtement ſa coquille ne lui ſaiſiſſe la main, jette adroitement dans la coquille une pierre qui l'empêche de ſe refermer, & qui lui permet de manger l'Huître tout à ſon aiſe (8).

(8) Le Babouin, le plus lubrique de tous les Singes & peut-être de tous les Animaux, eſt encore le plus ruſé fripon. Cette eſpece de Singe forme ſouvent de nombreuſes ſociétés qui pillent les jardins. Une partie de la troupe franchit l'enclos, une autre partie demeure en ſentinelle ſur la cloiſon, tandis que le reſte forme au-dehors une longue chaîne juſqu'au lieu du rendez-vous général. Les Babouins qui ont pénétré dans le jardin jettent les fruits à meſure qu'ils les cueillent, aux Babouins qui ſont ſur la cloiſon, ceux-ci les jettent à leur tour aux premiers Babouins de la chaîne, qui les font paſſer ainſi de main en main juſqu'à l'extrémité de la file. Ils ont le coup-d'œil ſi ſûr & ils ſont ſi adroits, qu'ils laiſſent rarement tomber les fruits qu'ils ſe jettent les uns aux autres dans un profond ſilence. Mais ſi au milieu de l'expédition les ſentinelles découvrent quelqu'un, elles pouſſent un cri, & toute la troupe des voleurs ſe diſperſe à l'inſtant & s'enfuit avec une vîteſſe ſurprenante.

Parmi les Singes *à queue*, du genre des *Guenons*, il y en a qui ſont auſſi de grands pillards, & qui, très-habiles à voler les fruits & les légumes, les emportent dans leurs mains ou ſous leurs bras : mais ils ne manquent pas de s'en débarraſſer quand ils ſont pourſuivis. Il en eſt encore qui, lorſqu'ils manquent de fruits ou de légumes, vont à la pêche des Crabes, qu'ils pêchent, pour ainſi dire, à la ligne d'une maniere aſſez adroite : ils mettent leur longue queue entre les pinces de ces grandes Écreviſſes, & dès que celles-ci la ſerrent fortement, les Singes les enlevent preſtement & vont les manger l'écart. D'autres Singes, du genre des *Sapajous* ou des Singes à *queue prenante*, ſe ſervent pareillement de leur queue avec beaucoup d'avantage pour pêcher le Poiſſon : ils le ſaiſiſſent avec leur queue, comme

CONCLUSION.

Je borne ici ma courſe : j'ai préſenté aſſez de faits & de faits intéreſſans, pour que mes Lecteurs puiſſent juger des plaiſirs attachés à la contemplation de la Nature. Mais cette contemplation ſeroit bien ſtérile, ſi elle ne nous conduiſoit point à l'Auteur de la Nature. C'eſt cet Être adorable qu'il faut chercher ſans ceſſe dans cette Chaîne immenſe de Productions diverſes, où ſa Puissance & ſa Sagesse ſe peignent avec tant de vérité & d'éclat. Il ne ſe révele pas à nous immédiatement ; le Plan qu'Il a choiſi ne le comportoit pas ; mais Il a chargé les Cieux & la Terre de nous annoncer ce qu'Il eſt. Il a proportionné nos Facultés à ce langage divin, & il a ſuſcité des Génies ſublimes qui en approfondiſſent les beautés & en deviennent les Interpretes. Relégués pour un temps dans une petite Planete aſſez obſcure, nous n'avons que la portion de lumiere qui convenoit à notre état préſent : recueillons précieuſement tous les

avec une main. Ils ont encore l'adreſſe de caſſer avec une pierre l'écaille des Huîtres pour les manger. Ces Singes ſavent ſe ſuſpendre les uns au bout des autres pour traverſer un ruiſſeau ou pour s'élancer d'un arbre à un autre.

traits de cette lumiere ; n'en laiſſons perdre aucun : marchons à ſa clarté. Un jour nous puiſerons dans la SOURCE ÉTERNELLE de toute lumiere, & au lieu de contempler l'OUVRIER dans l'Ouvrage, nous contemplerons l'Ouvrage dans l'OUVRIER. *Préſentement nous voyons les choſes confuſément, & comme par un verre obſcur ; mais alors nous verrons face à face.*

Fin du neuvieme Volume.

TABLE

DES CHAPITRES

Contenus dans ce neuvieme Volume.

ONZIEME PARTIE.

DE L'INDUSTRIE DES ANIMAUX.

INTRODUCTION. Page 1
CHAPITRE PREMIER. *Généralités sur l'instinct des Animaux.* 2
CHAP. II. *Sageſſe dans la conſervation des Eſpeces.* 7
CHAP. III. *La propagation de l'Eſpece.* 10
CHAP. IV. *Réflexions ſur la multiplication par le concours des ſexes.* 14
CHAP. V. *Le lieu & l'arrangement des œufs & le ſoin des Petits.* 17
CHAP. VI. *Continuation du même ſujet. Les Oiſeaux.* 34
CHAP. VII. *Continuation du même ſujet. Les Quadrupedes.* 40
CHAP. VIII. *Réflexion ſur l'amour des Animaux pour leurs Petits.* 42
CHAP. IX. *Du naturel des Animaux.* 51

CHAP. X. *Des ſociétés animales en général.* Page 55
CHAP. XI. *Les ſociétés improprement dites.* 56
CHAP. XII. *Réflexions.* 58
CHAP. XIII. *Les Oiſeaux de paſſage.* 62
CHAP. XIV. *Les Harengs.* 69
CHAP. XV. *Les Rats de paſſage.* 72
CHAP. XVI. *Les ſociétés proprement dites.* 74
CHAP. XVII. *Les Chenilles communes.* 75
CHAP. XVIII. *Les Chenilles proceſſionnaires.* 77
CHAP. XIX. *Procédé remarquable des Chenilles qui vivent en ſociété.* 80
CHAP. XX. *Queſtion.* 84
CHAP. XXI. *Les ſociétés qui ont pour fin principale l'éducation des Petits.* 87
CHAP. XXII. *Les Fourmis.* 89
CHAP. XXIII. *Les Guêpes ſouterreines.* 99
CHAP. XXIV. *Les Frélons & quelques autres Eſpeces de Guêpes.* 105
CHAP. XXV. *Les Guêpes cartonnieres.* 107
CHAP. XXVI. *Les Abeilles.* 111
CHAP. XXVII. *Continuation du même ſujet. Idées ſur la police des Abeilles.* 119
CHAP. XXVIII. *Les Bourdons.* 146
CHAP. XXIX. *Les Caſtors.* 150
CHAP. XXX. *Réflexions ſur les Caſtors.* 156
CHAP. XXXI. *Les Rats muſqués.* 165

DOUZIEME PARTIE.

SUITE DE L'INDUSTRIE DES ANIMAUX.

CHAPITRE PREMIER. *Précis des procédés industrieux de divers Insectes, relatifs à leurs métamorphoses.* 169
CHAP. II. *Les Chenilles qui se pendent par le derriere.* 171
CHAP. III. *Les Chenilles qui se lient avec une ceinture.* 173
CHAP. IV. *Les Chenilles qui se construisent des coques.* 174
CHAP. V. *Les fausses Chenilles qui se construisent des coques doubles.* 184
CHAP. VI. *Les Insectes qui vivent dans les fruits.* 185
CHAP. VII. *Les Insectes qui plient & roulent les feuilles.* 187
CHAP. VIII. *Les Insectes mineurs de feuilles des Plantes.* 192
CHAP. IX. *Les Fausses-teignes.* 198
CHAP. X. *Des Teignes en général. Les Teignes domestiques.* 201
CHAP. XI. *Les Teignes champêtres & les Teignes aquatiques.* 205
CHAP. XII. *Les Insectes qui se recouvrent des matieres qu'ils rejettent.* 211

CHAP. XIII. *Les Insectes qui habitent une sorte d'écume.* Page 215
CHAP. XIV. *L'Araignée qui se fait un logement de bulles d'air.* 218
CHAP. XV. *L'Araignée mineuse.* 222
CHAP. XVI. *Réflexions sur ces divers procédés des Insectes.* 227
CHAP. XVII. *Procédés des Coquillages. La Moule de riviere.* 231
CHAP. XVIII. *Autres Coquillages. La Telline.* 233
CHAP. XIX. *Le Coutelier.* 235
CHAP. XX. *Les Dails ou Pholas.* 237
CHAP. XXI. *Divers Insectes ou Animaux de Mer. Les Orties.* 241
CHAP. XXII. *Les Étoiles.* 252
CHAP. XXIII. *Les Hérissons.* 258
CHAP. XXIV. *Le Bernard l'hermite.* 262
CHAP. XXV. *Les Coquillages qui filent. Les Moules & les Pinnes marines.* 264
CHAP. XXVI. *Les Coquillages & autres Animaux de Mer qui s'attachent par une sorte de glu ou de suc pierreux.* 272
CHAP. XXVII. *Procédés des Poissons.* 279
CHAP. XXVIII. *Procédés des Oiseaux.* 294
CHAP. XXIX. *Continuation du même sujet.* 309
CHAP. XXX. *Procédés des Quadrupedes. Le Lapin.* 319
CHAP. XXXI. *La Marmotte.* 328
CHAP. XXXII. *Du langage des Bêtes.* 333
CHAP. XXXIII. *Continuation du même sujet.* 342
CHAP. XXXIV. *La Chenille qui se construit une coque en nasse de Poisson. Irrégularités dans le*

le travail des Insectes. Réflexions à ce sujet. Page 359
CHAP. XXXV. *La Chenille rouleuse qui se construit une coque en grain d'Avoine.* 366
CHAP. XXXVI. *Procédés analogues de quelques autres Insectes.* 368
CHAP. XXXVII. *La Teigne des feuilles. Essai d'explication de ses procédés.* 373
CHAP. XXXVIII. *Réflexions sur l'industrie des Animaux.* 384
CHAP. XXXIX. *L'Abeille qui construit un nid avec une sorte de glu.* 390
CHAP. XL. *L'Abeille tapissiere.* 393
CHAP. XLI. *La Guêpe maçonne.* 398
CHAP. XLII. *Le Fourmilion.* 405
CHAP. XLIII. *Le Crapaud.* 416
CHAP. XLIV. *Les ruses du Lievre & celles du Cerf.* 421
CHAP. XLV. *Le Renard.* 423
CHAP. XLVI. *L'Eléphant.* 425
CHAP. XLVII. *L'Orang-outang.* 436
Conclusion. 443

INDICATION

Des nouveaux Chapitres & des Notes principales ajoutées par l'Auteur à cette nouvelle Edition.

ONZIEME PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

NOTE 1. *PREUVE de l'immatérialité de l'Ame, tirée de la ſimplicité ou de l'unité du ſentiment du Moi.* Page 3

NOTE 2. *Sur le langage artificiel ou la parole conſidérée comme un caractere propre à diſtinguer l'Homme de la Brute. Ce que ſont les idées moyennes dans le raiſonnement.* 6

CHAPITRE II.

NOTE 1. *Sur la population du Globe. Balance entre la multiplication & la deſtruction dans les différentes Eſpeces.* 7

CHAPITRE III.

NOTE 2. *Hiſtoire de deux Perruches de Guinée. Exemple ſingulier de tendreſſe conjugale. Autre exemple. Le Kamichi.* 11

CHAPITRE IV.

NOTE 4. *Temps assignés à la copulation de différens Animaux.* Page 17

CHAPITRE V.

NOTE 1. *Pontes de la Sauterelle, du Lézard, de la Tortue, du Crocodile & de quelques Amphibies.* ibid.

NOTE 3. *Industrie remarquable d'un petit Insecte qui roule en cornet les feuilles des Plantes pour y déposer ses œufs.* 25

NOTE 4. *Remarques sur le discernement attribué à la Reine-abeille relativement à la ponte.* 26

NOTE 6. *Sur les tumeurs des Bêtes à corne & sur le Ver qui croît dans ces tumeurs.* 28

NOTE 8. *Des galles que la piquure de différens Insectes fait naître sur les Plantes.* 29

NOTE 9. *Sur la Mouche à scie & sur la Cigale.* 30

NOTE 10. *Procédés singuliers des Escarbots pilulaires qui renferment leurs œufs dans de petites boules d'excrémens. Autres procédés non moins singuliers des Escarbots enterreurs ou qui ensevelissent les cadavres de différens Animaux pour y déposer leurs œufs.* 31

CHAPITRE VI.

NOTE 1. *Amours & ménage des Oiseaux. Divers Oiseaux qui ne construisent pas des nids, & qui pondent dans des nids étrangers ou dans des masures, dans des creux d'arbres, &c. Procédés singuliers du Coucou. Oiseaux de basse-cour.* 34

NOTE 2. *Exemple de l'art avec lequel les Oiseaux savent asseoir leur nid. Le Loriot.* 37

NOTE 4. *Courage avec lequel les Oiſeaux défendent leurs Petits & les ſoins qu'ils en prennent. La Poule. Le Loriot. La Cigogne.* P. 38

NOTE 5. *Soins des Oiſeaux pour dreſſer leurs Petits au vol. La Cigogne. L'Aigle. L'Hirondelle.* 39

CHAPITRE VII.

NOTE 1. *Amours des Quadrupedes, bien différens de ceux des Oiſeaux. Exemple d'union conjugale chez les Quadrupedes : le Chevreuil. Divers ſoins des Quadrupedes pour leurs Petits : intrépidité à les défendre. La Louve. La Lionne. Souterreins & nid de la Taupe : éducation de ſes Petits. L'Ecureuil. L'Oppoſſum. La Marmoſe.* 41

CHAPITRE VIII.

NOTE 1. *Sur l'incubation de la Poule.* 48

NOTE 2. *Réſultats de diverſes expériences de M.* de MONTBEILLARD *ſur l'incubation des œufs étrangers.* 49

CHAPITRE IX.

NOTE 1. *Sur le Pareſſeux.* 52

NOTE 2. *Exemples d'Animaux féroces dont les uns s'apprivoiſent juſqu'à un certain point, & dont les autres ne fléchiſſent jamais ſous la main de l'Homme. Le Loup ; l'Ours ; le Tigre ; l'Ocelot ; la Panthere.* 53

CHAPITRE XII.

NOTE 1. *Exemple d'Animaux de claſſes différentes qui contractent entr'eux des liaiſons par l'habitude & la cohabitation : les Canards & les Dindons.* 59

CHAPITRE XIII.

NOTE 1. *Causes générales externes qui déterminent les Oiseaux à émigrer. Cause non moins générale, mais interne, qui influe sur ces émigrations.* Page 62

NOTE 2. *Variétés qu'on observe dans les migrations des différentes Especes d'Oiseaux. Migrations des Hirondelles. Erreurs sur ce sujet. Vol singulier des Etourneaux. Passage des Grues & leur discipline. Migrations irrégulieres de quelques Especes sédentaires.* 64

CHAPITRE XIV.

NOTE 1. *Etonnante fécondité des Harengs. Causes qui déterminent leurs migrations.* 70

CHAPITRE XV.

NOTE 2. *Sur les Rats de passage ou les Lémings.* 73

CHAPITRE XVIII.

NOTE 1. *Sur la qualité venimeuse des Chenilles processionnaires du Chêne, & en général des Chenilles velues.* 78

NOTE 2. *Sur les Chenilles processionnaires du Pin & leurs évolutions.* ibid.

CHAPITRE XIX.

NOTE 1. *Sur les Chenilles qui vivent en société dans des especes de hamacs de pure soie.* 80

NOTE 2. *Sur les Chenilles qui vivent en société sous des tentes de soie.* 81

CHAPITRE XX.

NOTE 1. *Sur la question, si l'état social dans lequel vivent différentes Especes de Chenilles dépend uniquement des circonstances qui ont présidé à leur naissance.* 85

CHAPITRE XXI.

NOTE 1. *Sur une Punaiſe qui conduit & défend ſes Petits comme une Poule ſes Pouſſins.* P. 88

CHAPITRE XXII.

NOTE 1. *Sur les trois ſortes d'Individus qu'on rencontre chez les Fourmis ; ſur leurs œufs, ſur leurs Vers & ſur les coques qu'ils ſe filent.* 89

NOTE 2. *Différentes obſervations ſur l'induſtrie & ſur la police des Fourmis.* 93

CHAPITRE XXIII.

NOTE 1. *Sur l'architecture des Guêpes ſouterreines.* 99

NOTE 2. *Sur la police des Guêpes ſouterreines & ſur les ſoins qu'elles prennent de leurs Petits.* 100

NOTE 3. *Sur la conſtruction du guêpier, ſur la matiere dont il eſt fait, & l'art avec lequel les Guêpes la recueillent, la préparent & l'emploient.* 103

CHAPITRE XXIV.

(Chapitre entiérement neuf.) *Les Frêlons & quelques autres Eſpeces de Guêpes.* 105

CHAPITRE XXV.

(Chapitre entiérement neuf.) *Les Guêpes cartonnieres.* 107

NOTE 2. *Papiers faits de bois ou d'écorces par M.* SCHÆFFER, *à l'imitation de ceux des Guêpes.* 110

CHAPITRE XXVI.

NOTE 1. *Sur la forme des cellules des Abeilles & leur arrangement reſpectif.* 112

NOTE 2. *Sur les trois ordres d'Individus qui composent la société des Abeilles, & sur les trois ordres de cellules que les Ouvrieres leur approprient. Observations de M.* RIEM *à ce sujet.* Page 113

NOTE 3. *Remarques importantes sur les essaims d'Abeilles qu'on partage à leur sortie de la mere-ruche, & qu'on place séparément dans une ruche vuide. Différence entre le procédé de ces essaims & les procédés de ceux qu'on partage après qu'ils ont déja travaillé.* 116

NOTE 5. *Sur le prétendu massacre des Mâles par les Abeilles-ouvrieres.* 118

NOTE 6. *Sur le nombre des cellules royales qui peuvent se rencontrer dans la même ruche.* ib.

CHAPITRE XXVII.

NOTE 1. *Que les Abeilles approprient la nourriture à l'âge & à la qualité des Vers.* 120

NOTE 3. *Improbabilité de l'opinion de quelques Cultivateurs Allemands qui prétendent que chez les Abeilles les Neutres engendrent, & même qu'ils n'engendrent que des Faux-bourdons. Petites Reines qu'on croit se trouver dans les ruches.* 121

NOTE 5. *Découverte de* M SCHIRACH *sur l'origine de la Reine-abeille. Objection. Réponse. Réflexions sur cette découverte.* 127

NOTE 7. *Que ce sont les Abeilles ouvrieres qui tuent les Reines surnuméraires. Observations à ce sujet.* 132

NOTE 8. *Découverte de Mr.* DEBRAW *sur la fécondation des œufs des Abeilles par le sperme*

que les Mâles répandent dans les cellules. Obſervations de l'Auteur ſur ce ſujet. Que le myſtere de cette fécondation n'eſt pas encore entiérement éclairci. Page 134

NOTE 9. *De la maniere dont les Abeilles recueillent le miel & la cire, & de l'art avec lequel elles mettent cette cire en œuvre. Fauſſe opinion d'un Naturaliſte célebre ſur la figure héxagone des cellules.* 137

NOTE 11. *Beau problême ſur les cellules des Abeilles, & ſa ſolution par* KOENIG. *Paſſage de Mr. de* MAIRAN *ſur ce ſujet.* 144

CHAPITRE XXVIII.

(Chapitre entiérement neuf.) *Les Bourdons.* 146

CHAPITRE XXX.

NOTE 2. *Petit éclairciſſement ſur les conjectures propoſées par l'Auteur pour eſſayer de rendre raiſon de l'induſtrie des Caſtors.* 162

CHAPITRE XXXI.

(Chapitre entiérement neuf.) *Les Rats muſqués.* 165

NOTE 2. *Particularités anatomiques ſur le Rat muſqué.* 168

DOUZIEME PARTIE.

CHAPITRE IV.

NOTE 1. *Sur une petite Chenille découverte par de* GEER, *qui conſtruit ſa coque par dehors & ſans y être d'abord renfermée.* Page 175
NOTE 7. *Induſtrie des Chenilles qui ſe conſtruiſent des coques de grains de ſable qu'elles lient avec de la ſoie.* 181

CHAPITRE VI.

NOTE 1. *Sur les Inſectes qui habitent dans l'intérieur des fruits, & la vie ſolitaire qu'ils y menent.* 185
NOTE 2. *Sur la petite Chenille qui vit dans la tête du Chardon à bonnetier.* 186

CHAPITRE VII.

NOTE 5. *Obſervation de Mr. de* GEER, *ſur la méchanique au moyen de laquelle diverſes Eſpeces de Chenilles parviennent à rouler les feuilles des Plantes.* 190

CHAPITRE VIII.

NOTE 2. *Sur les petits Inſectes qui minent les feuilles des Plantes. Procédé remarquable auquel recourent les Mineurs en grand pour ſe mettre plus à l'aiſe dans la mine.* 193
NOTE 3. *Sur les Mineurs de la Juſquiame.* ibid.

CHAPITRE IX.

NOTE 1. *Sur les Fauſſes-teignes & leurs Papillons.* 199

CHAPITRE X.

NOTE 3. *Procédés pour détruire les Teignes domestiques.* Page 204

CHAPITRE XI.

NOTE 1. *Divers procédés des Teignes aquatiques.* 208

NOTE 2. *Procédés relatifs à la derniere métamorphose des Teignes aquatiques.* 209

CHAPITRE XII.

(Chapitre entiérement neuf.) *Les Insectes qui se recouvrent des matieres qu'ils rejettent.* 211

CHAPITRE XIII.

(Chapitre entiérement neuf.) *Les Insectes qui habitent dans une sorte d'écume.* 215

CHAPITRE XIV.

(Chapitre entiérement neuf.) *L'Araignée qui se fait un logement de bulles d'air.* 218

NOTE 1. *Maniere dont s'opere la fécondation chez les Araignées.* 223

CHAPITRE XV.

(Chapitre entiérement neuf.) *L'Araignée mineuse.* 222

NOTE 4. *Remarques sur l'Araignée mineuse.* 226

CHAPITRE XVIII.

NOTE 1. *Sur divers Coquillages de Mer qui rejettent l'eau par des tuyaux, & sur les Cames en particulier.* 233

CHAPITRE XX.

NOTE 2. *Que les Dails peuvent percer les pierres les plus dures : maniere dont un Naturaliste croit qu'ils les percent. Phosphore de ce Coquillage. Les Dattes, genre de Coquillage*

dont les procédés imitent ceux des Dails. Page 240

CHAPITRE XXI.

NOTE 1. *Remarques sur les nomenclatures des Zoophytes, à l'occasion des Orties de Mer.* 242

NOTE 5. *Conjecture sur le Zoophyte nommé Gelée de Mer.* 251

CHAPITRE XXII.

NOTE 1. *Variétés des Etoiles de Mer.* 252

NOTE 2. *Erreurs que les Nomenclateurs peuvent avoir commises sur les Étoiles de Mer. Réflexion à ce sujet.* 256

CHAPITRE XXIII.

NOTE 2. *Variétés des Hérissons de Mer.* 258

NOTE 3. *Surprenante composition d'un Hérisson de Mer.* 260

CHAPITRE XXIV.

NOTE 2. *Sur le Bernard-l'hermite. Observation anatomique de* SWAMMERDAM *sur ce Crustacée. Remarque à ce sujet.* 263

CHAPITRE XXV.

NOTE 2. *Opinion de quelques Naturalistes qui prétendent que les Moules de Mer sont privées de la faculté loco-motive. Remarques à ce sujet.* 269

CHAPITRE XXVI.

NOTE 5. *Sur les Vers de Mer qui se logent dans des tuyaux crustacés. Erreur sur la construction de ce tuyau. Divers genres de ces Vers: leurs rapports avec les Polypes des Coraux, des Corallines, &c. Orgues de Mer.* 276

NOTE 6. *Variétés dans l'adhésion des Huitres: que*

les mêmes variétés ſe rencontrent dans les Huitres foſſiles. Réflexion à ce ſujet. Perles : leur origine. 277

CHAPITRE XXVII.

NOTE 1. *Sur les mouvemens des Poiſſons & leur maniere de nager.* 279

NOTE 2. *Particularités ſur la ſtructure de la Seche. Remarque ſur l'émiſſion de ſon encre.* 280

NOTE 3. *Animaux de Mer qui percent les coquilles pour ſe nourrir de la ſubſtance qu'elles renferment.* 283

NOTE 4. *Procédés de quelques Cétacées. L'Eſpadon. Le Narhwal. L'Empereur.* ibid.

NOTE 5. *Procédé du Poiſſon nommé Manta.* 286

NOTE 7. *Fécondation naturelle & artificielle des Poiſſons à écailles. Variétés dans la maniere dont les Poiſſons fraient. La Morue : ſes marches : ſa fécondité prodigieuſe. Le Saumon & la Truite : leurs procédés : leurs migrations : leur maniere de frayer. L'Anguille. Vrais Hermaphrodites chez les Poiſſons. Poiſſon de l'Iſle-de-Bourbon.* 287

NOTE 10. *Longue durée de la vie des Poiſſons. Exemples : la Carpe, la Baleine. Réflexion ſur l'hiſtoire des Poiſſons. Accroiſſement de la Carpe : ſa fécondité merveilleuſe.* 292

NOTE 11. *Poiſſons & Coquillages qui vivent dans une eau thermale très-chaude.* 293

CHAPITRE XXVIII.

NOTE 3. *Divers traits de l'hiſtoire des Oiſeaux. L'Aigle ; ſes rapports avec le Lion ; ſes chaſſes & ſon aire. Le Faucon. La Pie-grieche. Gé-*

néralités sur les Oiseaux aquatiques & sur les Oiseaux de rivage. Procédés de plusieurs. Le Cormoran. Le Martin-pêcheur. Les Oiseaux nocturnes & leurs chasses. Page 295

NOTE 4. *Le Pic; son genre de vie & ses procédés.* 301

NOTE 5. *Admirable construction du nid du Chardonneret & du Pinçon. Remarque sur le nid du Roitelet, du Pouillot & du Troglodyte. Particularités sur le nid d'une Mésange du Cap de Bonne-Espérance: procédé remarquable de l'Oiseau.* 304

NOTE 6. *Industrie de la Pie dans la construction de son nid, & sa tendresse pour ses petits. Particularité remarquable du nid du Moineau. Nids du Todier & du Moteux.* 307

CHAPITRE XXIX.

(Chapitre entiérement neuf.) *Continuation du même sujet. Procédés industrieux de quelques Oiseaux qui suspendent leur nid à quelques branches d'Arbres, tels que le Remiz, la Penduline, le Gros-bec d'Abyssinie. Particularités sur l'Oiseau-mouche & le Colibri.* 309

NOTE 1. *Indication de quelques Especes d'Oiseaux qui suspendent leur nid à des branches: le Troupiale, le Cassique, le Carouge, le Guit-guit.* ibid.

NOTE 4. *Quelques Perroquets qui suspendent aussi leurs nids.* 314

CHAPITRE XXX.

NOTE 2. *Procédés du Hamster ou Rat de bled: son terrier: ses mœurs: sa profonde léthargie*

pendant l'Hiver. Procédés du Mulot & ſes ſouterrains. Le Bléreau & le Renard : leurs terriers. La Loutre : ſon domicile. L'Ours & ſa retraite. Page 319

NOTE 3. *Remarque touchant les expériences par leſquelles M. de* BUFFON *croit s'être aſſuré que le Lapin & le Lievre ne propagent pas enſemble.* 324

NOTE 4. *Obſervation particuliere ſur les Lievres des Pyrénées.* 325

CHAPITRE XXXI.

NOTE 2. *Sur un procédé des Lions marins.* 330

NOTE 3. *Opinion de M. de* BUFFON *ſur la cauſe de l'engourdiſſement de certains Animaux pendant l'Hiver. Curieuſes expériences de M.* SPALLANZANI, *qui détruiſent cette opinion : ſentiment de ce Naturaliſte ſur ce ſujet.* 331

CHAPITRE XXXII.

NOTE 1. *Ébauche de quelques idées ſur l'origine du langage & de l'écriture.* 334

NOTE 3. *Sur la Fauvette.* 340

CHAPITRE XXXIII.

NOTE 4. *Poſition ſinguliere de l'oreille dans quelques petits Quadrupedes.* 347

NOTE 7. *Serin merveilleux. Talent du Perroquet à imiter la parole & divers cris. Chien qui articuloit des mots. Réflexions à ce ſujet.* 351

NOTE 9. *Exemples de quelques Animaux dont certaines actions ſemblent réfléchies. Premier exemple ; l'Oiſeau nommé Secrétaire ou Meſſager. Second exemple ; un Perroquet vert.*

Troiſieme exemple; un Maki de l'Eſpece des Mongous. Page 353

NOTE 10. *Remarques ſur la place que M. de* BUFFON *aſſigne aux Oiſeaux dans l'échelle des Etres vivans.* 356

CHAPITRE XXXIV.

NOTE 3. *Sur les variétés & les irrégularités du travail des Abeilles.* 363

NOTE 4. *Coque à calotte d'une Chenille obſervée par M. de* GEER. 365

CHAPITRE XXXVI.

NOTE 1. *Divers traits de l'hiſtoire de la petite Chenille qui vit dans l'intérieur des grains, & de ſon Papillon.* 368

CHAPITRE XXXVIII.

NOTE 1. *Réflexions philoſophiques ſur divers procédés des Animaux, qu'on ſe plaît trop à embellir.* 385

CHAPITRE XLI.

NOTE 4. *Guêpes-ichneumons qui ſe ſaiſiſſent des Araignées. Autres Guêpes de la même Famille, qui pondent ſur le corps des Araignées.* 404

CHAPITRE XLII.

NOTE 4. *Particularités ſur le Ver-lion.* 414

CHAPITRE XLIII.

NOTE 1. *Sur la ponte du Crapaud: vraie nature des petits corps qu'il met au jour. Principal uſage de la glaire dont ils ſont enveloppés.* 416

NOTE 2. *Remarques ſur le Crapaud accoucheur. Amours des Salamandres aquatiques. Le Pipa ou Crapaud de Surinam.* 418

CHAPITRE XLVI.

(Chapitre entiérement neuf.) *L'Éléphant.* P. 425
NOTE 1. *Généralités ſur l'Éléphant.* ibid.
NOTE 2. *Difformités de l'Éléphant.* 426
NOTE 3. *Force de l'Éléphant.* 427
NOTE 6. *Trompe de l'Éléphant, & l'uſage qu'il en fait.* 431
NOTE 7. *Trait ſingulier d'un Éléphant, rapporté par M. de* BUFFON. *Réflexions ſur ce trait & ſur un autre paſſage du même Auteur.* 432

CHAPITRE XLVII.

(Chapitre entiérement neuf.) *L'Orang-outang.* 436
NOTE 3. *Conformité particuliere de la Femelle Orang-outang avec la Femme.* 437
NOTE 5. *Remarques ſur un paſſage de l'hiſtoire de l'Orang-outang de M. de* BUFFON. ibid.
NOTE 8. *Ordre que les Babouins obſervent dans leurs pillages. Autres Singes pillards. Singes pêcheurs & mangeurs d'Huitres, &c.* 442

Fin de la Table.

Page 303, lig. 2 de la note, *ſbnt*; lif. font.
309, lig. 12, *Jc*; lif. Ici.
335, lig. 1, a; lif. la.
340, lig. derniere de la note, *anifeſte*; lif. manifeſte.
341, lig. 6 de la note, *lieur*; lif. lieu.
346, lig. 1, *féminale*; lif. ſéminale.
355, lig. 4, *l'xtérieur*; lif. l'extérieur.
356, lig. 5 de la note, *comment*; lif, comme.
Ibid. lig. derniere de la note, *retardan*; lif. retardant.
360, lig. 3, *le Conferve*; lif. la Conferve.
Ibid. lig. derniere de la note, *fongeuſe*; liſez fongueuſe.
366, lig. 26, *eomprend*; lif. comprend.
367, lig. 4. *des*; lif. de.
Ibid. lig. 17, *peut, être*; lif. peut-être.
377, lig. 4, *des jardins de prairies*; lif. des jardins des prairies.
389, lig. 11, *mais ce*; lif. mais ſi ce.
Ibid. lig. 12, après *pleinement* effacez *les*, & placez une virgule.
434, lig. derniere de la note, *enriaine*; liſez entraîne.
447, lig. derniere, ACHART; lif. ACHARD.
457, lig. 27 de la note, *d*; lif. à.
467, lig. 12, *Ecureil*; lif. Ecureuil.
476, lig. 8, *qu el Etre*; lif. que l'Etre.

TOME IX.

Page 3, lig. 4 de la note, *entende*; lif. entend.
82, lig. 24, *bu'elles*; lif. qu'elles.
101, lig. 25 de la note, *n'on*; lif. n'ont.
131, lig. 7 de la note, *recuillira*; lif. recueillera.
246, lig. 4, *ſens*; lif. ſans.
260, lig. 2 de la note, *rncore*; lif. encore.
281, lig. derniere, LECAT; lif. LE CAT.
314, lig. 19, *la ſaiſon*; lif. que la ſaiſon.
342, lig. 18, *ſembleroit*; lif. ſembloit.
345, lig. 13, *regarde*; lif. regardé.
401, lig. 1 de la note, *leque*; lif. lequel.
415, lig. 9, *paroi*; lif. parois.